

2024 年河北省临漳县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题王牌题库及答案【】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度重度贫血为

A: 120~160g / L

B: 60~90g / L

C: 30~60g / L

D: 90~120g / L

答案：C

2. 某患者，女，27 岁，多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁 3 个月。血 FT

A: 碳酸锂

B: 丙硫氧嘧啶

C: 左旋咪唑

D: 碘化钾

答案：B

3. 以高 TC 为主血症首选

A: 阿昔莫司

B: 氟伐他汀

C: 非诺贝特

D: 依折麦布

答案：B

4. 兴奋交感神经，引起高血压的药物是

- A: 咖啡因
- B: 重组人促红细胞生成素
- C: 糖皮质激素
- D: 伪麻黄碱

答案：A

5. 氯霉素可引起

- A: 再生障碍性贫血
- B: 锥体外系反应
- C: 癫痫发作
- D: 听神经障碍

答案：A

6. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

- A: 60 岁上的老人
- B: 慢性病患者及体弱多病者
- C: 3 岁以上儿童
- D: 医疗机构从业人员

答案：C

7. (妊娠的危险性分级)对人类胎儿的危险有肯定的证据，仅在对孕妇肯定有利时方予应用(如生命垂危或疾病严重而无法应用较安全的药物或药物无效)

- A: C 级

B: D 级

C: B 级

D: A 级

答案: B

8. 患者，女，48 岁，因急性气管一支气管炎发作，出现“咳嗽、咳黄痰、喘息”症状就诊。患者无其他基础疾病，不应出现在患者用药处方中的是

A: 阿莫西林胶囊

B: 氨溴索溶液

C: 美敏伪麻溶液

D: 沙丁胺醇气雾剂

答案: A

9. (2017 年真题) 根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数 (BMI) 判断为肥胖的标准是 ()

A: $BMI \geq 24.0$

B: $BMI < 21.5$

C: $BMI \leq 18.5$

D: $BMI \geq 28.0$

答案: D

10. 洋地黄中毒的特征性表现为

A: 快速房性心律失常伴传导阻滞

B: 恶心

C: 视力模糊

D: 黄视、绿视

答案: A

11. 患者，男，67 岁，患有糖尿病、冠心病、高血压，服用的药物包括二甲双胍、阿卡波糖、美托洛尔、阿司匹林、福辛普利。近期使用优维显（碘普罗胺注射液，一种碘化对比剂）做腹部增强 CT 扫描，须告知患者检查前数日应停用的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 美托洛尔
- C: 阿卡波糖
- D: 福辛普利

答案：A

12. 患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，导致患者隐形眼镜染色的药物是()

- A: 利福平
- B: 乙胺丁醇
- C: 异烟肼
- D: 吡嗪酰胺

答案：A

13. 起效快，可迅速缓解急性哮喘发作和支气管平滑肌痉挛的药品是

- A: 扎鲁司特
- B: 沙丁胺醇
- C: 羧甲司坦
- D: 布地奈德

答案：B

14. 穿孔（消化性溃疡并发症）

- A: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

B: 突发上腹剧痛，继而至全腹

C: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物

D: 规律性上腹痛

答案：B

15. 癫痫的药物治疗失神发作首选

A: 拉莫三嗪

B: 苯妥英钠

C: 丙戊酸钠

D: 卡马西平

答案：C

16. 中枢性降压药是

A: 可乐定

B: 胍苯哒嗪

C: 利血平

D: 拉贝洛尔

答案：A

17. 为查询妊娠及哺乳期妇女用药注意事项，可首选的书籍是

A: 《药物治疗学：病理生理学的方法》

B: 《注射药物手册》

C: 《新编药物学》

D: 《药物流行病学》

答案：A

18. 患者，女，45 岁，6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁，在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗，症状控制较好，近 3 个月服用西咪替丁，患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱，该患者各地求医，服用各种药物，具体药物品种不详。围绕该病例，医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

- A: 定期监测肝功能
- B: 有条件的应测定药物血液浓度
- C: 遵从联合治疗原则
- D: 长期规律用药

答案：C

19. 缓解视疲劳可选用的药物是()

- A: 色甘酸钠滴眼液
- B: 氧氟沙星滴眼液
- C: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- D: 酞丁安滴眼液

答案：C

20. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 X 级的药物是查看材料

- A: 万古霉素
- B: 沙利度胺
- C: 葡萄糖
- D: 阿莫西林

答案：B

21. 静滴、静注等给药途径的不良反应发生率较高，说明药源性疾病的药物因素是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 生理因素

B: 不良生活方式

C: 药物的使用

D: 药物制剂因素

答案: C

22. 患者，女，72 岁，近一个月出现入睡困难，多梦易醒，尝试非药物治疗效果不明显，推荐的药物治疗方案是

A: 氯硝西泮 2mgpoqn

B: 扎来普隆 5mgpoqn

C: 苯巴比妥 100mgpoqn

D: 地西泮 5mgpoqn

答案: B

23. 处方中"餐后给药"的外文缩写是

A: ac

B: po

C: qn

D: pc

答案: D

24. 在妊娠期可致颅骨和面部畸形、腭裂的药是

A: 叶酸拮抗剂

B: 沙立度胺

C: 雄激素

D: 孕激素

答案: A

25. 患者，男，72 岁，因“冠心病、高血压、2 型糖尿病”长期用药治疗，服用药物包括阿司匹林肠溶片、马来酸依那普利片、辛伐他汀片、富马酸比索洛尔片、盐酸二甲双胍缓释片、格列美脲片、硝酸甘油片。近日患者出现一些药物不良反应症状，前来药店咨询药师。

- A: 阿司匹林
- B: 富马酸比索洛尔
- C: 马来酸依那普利
- D: 盐酸二甲双胍

答案：C

26. （2017 年真题）伴有甲状腺功能亢进症的口腔溃疡患者应避免使用的药物是（）

- A: 西地碘含片
- B: 地塞米松粘贴片
- C: 替硝唑含漱液
- D: 氯己定含漱液

答案：A

27. 慎用奥美拉唑的原因是

- A: 致使定向力障碍
- B: 引起嗜睡
- C: 引起多尿或多汗
- D: 致使视力模糊

答案：B

28. 可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

- A: 随访了解效果，并建立档案
- B: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 形成答案并以口头形式提供给询问者

D: 对问题进行确定并归类

答案：A

29. (2021 年真题) 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 共济失调
- B: 便秘
- C: 口干
- D: 肾损害

答案：D

30. 静脉滴注阿昔洛韦的适宜溶媒是

- A: 50%葡萄糖注射液
- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 0.9%氯化钠注射液
- D: 复方氯化钠注射液

答案：C

31. 对服用抗蠕虫药后出现腹痛或口吐蛔虫的严重感染患者，应加服

- A: 甲苯咪唑
- B: 噻嘧啶
- C: 伊维菌素
- D: 枸橼酸哌嗪

答案：B

32. 适合餐前服用的是

- A: 奥利司他
- B: 氟伐他汀

C: 多潘立酮

D: 吲哚美辛

答案: C

33. 多晒太阳、防跌倒，最适合于

A: 高血压

B: 糖尿病

C: 骨质疏松

D: 焦虑障碍

答案: C

34. 属于润滑性泻药的是

A: 乳果糖

B: 开塞露

C: 硫酸镁

D: 番泻叶

答案: B

35. 与动脉硬化和冠心病的发生和发展呈负相关的是

A: LDH

B: HDL

C: CM

D: VLDL

答案: B

36. “以快速、准确地获得问询问题答案”的咨询服务方法步骤是

A: 形成答案并以口头形式提供给询问者

B: 对文献进行评价、分析和整理

C: 对问题进行确定并归类

D: 确立有效的检索方法、查阅文献

答案: B

37. 患者，男，70 岁，右手抖动和行走缓慢 3 个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病，既往前列腺肥大史 3 年，临床上对该患者不宜选用

:

A: 多巴丝肼

B: 苯海索

C: 司来吉兰

D: 左旋多巴

答案: B

38. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的药物是

A: 叶酸

B: 奥美拉唑

C: 克拉维酸钾

D: 苯丝肼

答案: B

39. 能诱发真菌或病毒感染、延缓创伤愈合、升高眼压和导致晶状体浑浊等风险，因此不应随意使用，除非患者是在眼病专科医师的密切监护下使用的结膜炎治疗药物是

A: 酞丁安滴眼液

B: 碘苷滴眼液

C: 利福平滴眼液

D: 醋酸氢化可的松滴眼液

答案: D

40. 柔道运动员使用后，可在短时间内急速降低体重，因此按兴奋剂管理的药物是

- A: 利血平
- B: 依那普利
- C: 阿替洛尔
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

41. 使用片、粒、袋、支等清晰易懂的计数单位，是针对

- A: 交代用药注意事项
- B: 交代药品贮存条件与方法
- C: 交代药物的用量
- D: 交代用药途径及用药方法

答案：C

42. 口服避孕药妇女所致心肌梗死，在吸烟人群中危险性加大

- A: 药物的使用
- B: 生活和饮食习惯
- C: 药物制剂因素
- D: 生理因素

答案：B

43. 患者，男，32 岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给予阿莫西林胶囊治疗。该 ADR 的因果关系评价结果是

- A: 肯定
- B: 可能

C: 很可能

D: 可能无关

答案: C

44. 荨麻疹患者常出现

A: 血小板计数增高

B: 嗜酸性粒细胞增多

C: 血红蛋白减少

D: 中性粒细胞增多

答案: B

45. 钙制剂属于

A: 激素替代剂

B: 骨吸收抑制剂

C: 促进骨矿化剂

D: 骨形成刺激剂

答案: C

46. 分为儿童卷、化学药品与生物制品卷的是

A: 《英国国家处方集》

B: 《医师案头参考》

C: 《国家基本药物处方集（2012 年版）》

D: 《中国国家处方集（2010 年版）》

答案: D

47. 药学服务的重要人群不包括

A: 新生儿患者

B: 流感患者

C: 慢性支气管哮喘患者

D: 合并患有心绞痛、高血压、糖尿病的患者

答案：B

48. 同时使用 5 种药物，药物不良事件的发生率为

A: 0.5

B: 0.38

C: 0.68

D: 0.13

答案：B

49. 下列情况的首选药物是高 TG 血症

A: 他汀类

B: 贝特类

C: 弹性酶

D: 胆酸螯合剂+贝特类

答案：B

50. 服用他汀类调节血脂药可能导致

A: 血白细胞计数降低

B: 血清白蛋白升高

C: 血清碱性磷酸酶升高

D: 血清总胆固醇升高

答案：C

51. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 过敏反应
- B: 血糖不降
- C: 血压升高
- D: 低血糖症状

答案：D

52. 可引起血清尿素氮降低的是

- A: 急性胰腺炎
- B: 慢性肾炎
- C: 中毒性肝炎
- D: 胃溃疡

答案：C

53. 口服补液盐(氯化钠 3.5g、碳酸氢钠 2.5g 和葡萄糖 20g，加水至 1000ml)用于中度脱水腹泻病人，成人给予 3400ml。问给予体重 10kg 的患儿口服补液盐多少克，应配制成多少毫升

- A: 12.69, 485ml
- B: 22.19, 850ml
- C: 24.79, 950ml
- D: 20.89, 800ml

答案：A

54. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、气稍促，心律 95bpm，律齐，体温 39.1℃，血压 110 / 70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

- A: 右美沙芬
- B: 氨溴索
- C: 可待因
- D: 苯丙哌林

答案：A

55. 查询药物质量检验标准可首选的书籍是

- A: 《中华人民共和国药典》
- B: 《药物治疗学》
- C: 《药物流行病学》
- D: 《新编药理学》

答案：A

56. 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

- A: 单硝酸异山梨酯缓释片与普通片均不适于心绞痛急性发作的治疗
- B: 规律使用硝酸酯类药物有助于预防心绞痛发作
- C: 单硝酸异山梨酯片每天早晚各服 1 片（20mg），应间隔 12 小时
- D: 使用西地那非 24 小时内不可应用单硝酸异山梨酯片，避免引起严重低血压

答案：C

57. 解救经口急性铅中毒的洗胃液是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 1%硫酸镁

B: 1%氯化钠

C: 3%过氧化氢

D: 1%硫酸铜

答案：A

58. 患者,男 58 岁,高血压病史 5 年,吸烟史 40 年,日均 40 支,6 小时前出现左侧肢体无力,并逐渐加重,不能站立,家属发现其说话迟钝含混,右侧嘴唇变浅,意识清楚,到某院急诊 BP190/120mmHg,血常规基本正常,行头部 MRI 检查后,诊断为急性脑梗死。

A: 氯吡格雷片 75mgqdp0

B: 阿司匹林肠溶片 100mgqdp0

C: 阿司匹林肠溶片 300mgqdp0

D: 华法林片 3mgqdp0

答案：B

59. 服药时进食高脂肪食物可促进药物吸收的是

A: 硫酸亚铁

B: 维生素 A

C: 格列本脲

D: 西咪替丁

答案：B

60. 胃食管反流病的患者应避免使用的药物是

A: 阿仑膦酸钠

B: 特拉唑嗪

C: 美托洛尔

D: 阿司匹林

答案：A

61. (有关物质中毒的特效解毒剂)，香豆素类灭鼠药中毒的特效解毒剂是

- A: 维生素 K
- B: 氯解磷定
- C: 烯丙吗啡
- D: 乙酰胺

答案：A

62. 吲哚美辛片剂和栓剂所表现的是()。

- A: 同一药物，剂型不同，其起效的快慢、作用强度和持续时间不同
- B: 同一药物，剂型不同，其副作用、毒性不同
- C: 同一药物，制成同一剂型，由于处方组成不同而表现不同
- D: 同一药物，制成同一剂型，由于制备工艺不同而表现不同

答案：B

63. 患者，男，23 岁，近日出现大便有鲜血、便后出血自行停止、肛门有坠胀感，无感染症状，诊断为痔疮。可用于患者的治疗药物是

- A: 10%樟脑软膏
- B: 复方片仔癀软膏
- C: 复方甲硝唑栓
- D: 地塞米松软膏

答案：B

64. 患者，男，54 岁，以“咳嗽、不适、呼吸困难和喘息、咳痰逾 3 日”就诊，患者无基础疾病，近 1 周内未服用药物，诊断为支气管炎。

对该患者的经验治疗应选择

- A: 美托洛尔片
- B: 复方甲氧那明胶囊

C: 头孢克洛颗粒剂

D: 阿奇霉素分散片

答案：B

65. 接种乙肝疫苗可产生哪种抗体()。

A: HBsAg

B: HBsAb

C: HBeAb

D: HBeAg

答案：B

66. (2018 年真题) 患者, 男 58 岁, 高血压病史 5 年, 吸烟史 40 年, 日均 40 支, 6 小时前出现左侧肢体无力, 并逐渐加重, 不能站立, 家属发现其说话迟钝含混, 右侧嘴唇变浅, 意识清楚, 到某院急诊 BP190/120mmHg, 血常规基本正常, 行头部 MRI 检查后, 诊断为急性脑梗死。

A: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv

B: 尼莫地平注射液 20mgqdiv

C: 呋塞米片 200mgqdp

D: 甘露醇注射液 250mlq6hiv

答案：D

67. 患者, 女, 45 岁, 1 年前临床诊断为室上性心动过速, 服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊, 胃镜检查诊断为胃溃疡, 幽门螺杆菌阳性。既往有膝关节疼痛, 长期服用非甾体抗炎药。医师处方: 奥美拉唑肠溶片 20mgqd, 甲硝唑片 0.4gtid, 克拉霉素片 50mgbid, 枸橼酸铋钾胶囊 220mg tid。患者溃疡治愈后, 因膝关节疼痛需要长期服用非甾体抗炎药。为降低溃疡复发风险, 首选的预防药物是

A: 奥美拉唑

B: 枸橼酸铋钾

C: 替普瑞酮

D: 多潘立酮

答案：A

68. 以下抗生素中，最适宜小儿使用的是

A: 青霉素

B: 米诺环素

C: 氯霉素

D: 链霉素

答案：A

69. 医师用药咨询的内容是

A: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

B: 抗菌药物的合理使用

C: 减肥、补钙、补充营养素

D: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

答案：B

70. 宜于餐中服用的药品是

A: 洛伐他汀

B: 甲氧氯普胺

C: 糖皮质激素

D: 阿卡波糖

答案：D

71. 治疗急迫性尿失禁的首选药物是

A: 选择性 α_1 激动剂

B: 5 α 还原酶抑制剂

C: 抗胆碱药物

D: α 1 阻断剂

答案：C

72. 与米诺环素合用会影响其吸收导致抗菌作用减弱的药物是()

A: 维生素 B

B: 铝碳酸镁

C: 阿司匹林

D: 伏立康唑

答案：B

73. 采用华法林进行抗凝治疗时，国际标准化比值（INR）的有效安全范围是

A: 3.0~4.0

B: 1.5~2.0

C: 0.8~1.5

D: 2.0~3.0

答案：D

74. （2015 年真题）氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是（）。

A: 肝病

B: 神经系统疾病

C: 胃肠类疾病

D: 血液系统疾病

答案：B

75. 需要长期使用肾上腺皮质激素的小儿应避免选用（）。

- A: 地塞米松
- B: 甲泼尼松
- C: 泼尼松
- D: 可的松

答案：A

76. 不能用于治疗缺铁性贫血的药物是

- A: 葡萄糖酸亚铁
- B: 硫酸亚铁
- C: 乳酸亚铁
- D: 去铁胺

答案：D

77. 作为预防用药错误策略，规范处方行为与操作流程，归属于

- A: 管理规范到位
- B: 环境与流程的优化与持续改进
- C: 科学发展
- D: 人员知识培训

答案：A

78. （2015 年真题）解救有机磷中毒过程中，如阿托品应用过量，应立刻给予（）。

- A: 麻黄碱
- B: 毛果芸香碱
- C: 山莨菪碱
- D: 东莨菪碱

答案：B

79. 患者,女,48 岁,因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药,药师应推荐的药品是()

- A: 多潘立酮片
- B: 甲氧氯普胺片
- C: 乳酶生片
- D: 酵母片

答案: C

80. 以下药物中,可引起粒细胞减少症的是()。

- A: 吲哚美辛
- B: 巯嘌呤
- C: 环磷酰胺
- D: 甲氨蝶呤

答案: A

81. 患者,女,49 岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下:

- A: 服药期间及停药一周内,避免饮用含酒精饮品
- B: 服药期间,可能会发生便秘
- C: 服药时避免与钙片同服,以免影响药物的作用
- D: 用牛奶服药,减少对胃肠道的刺激

答案: D

82. 为配制有效氯浓度为 500mg/L 的消毒剂 10L,需要次氯酸钠溶液(有效氯浓度为 6. 0%)和纯化水的量分别是()

- A: 150mL 和 9850mL
- B: 120mL 和 9880mL
- C: 83mL 和 9917mL

D: 830mL 和 9170mL

答案：C

83. 长期服用可加重消化道溃疡风险，不宜与非甾体抗炎药合用的药物是

A: 匹伐他汀

B: 美金刚

C: 铝碳酸镁

D: 多奈哌齐

答案：D

84. 沟通技能在药学服务工作中最重要的作用是

A: 应对投诉作用

B: 药品警戒作用

C: 用药教育作用

D: 双向交流作用

答案：D

85. 易引起冠脉痉挛、心肌缺血的药物是

A: 氟尿嘧啶

B: 紫杉醇

C: 阿霉素

D: 环磷酰胺

答案：A

86. 医师咨询"培氟沙星合用糖皮质激素抗感染"，属于

A: 药物相互作用

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 禁忌证

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/388061043045007022>