专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024甘肃省七里河区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题题库附参考答案（A卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.不属于抗乙型肝炎病毒的药品是

A：干扰素-α

B：拉米夫定

C：恩替卡韦

D：泛昔洛韦

答案：D

2.氟胞嘧啶为

A：抗病毒药

B：抗血吸虫病药

C：抗滴虫病药

D：抗真菌药

答案：D

3.仅适用于少数敏感菌，衣原体属，立克次体等不典型病原体所致感染的药物是

A：链霉素

B：甲硝唑

C：四环素

D：阿奇霉素

答案：C

4.阿托伐他汀用于原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症的初始剂量是

A：5mg

B：10mg

C：20～40mg

D：15mg

答案：B

5.（2020年真题）通过选择性抑制5-HT再摄取，增加突触间隙5-HT浓度，从而增强5-HT能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

A：吗氯贝胺

B：阿米替林

C：度洛西汀

D：舍曲林

答案：D

6.用药过程中需要监护甲状腺功能的是()

A：哌唑嚷

B：氯沙坦

C：胺碘酮

D：硝普钠

答案：C

7.下述不属于抗血小板类药物的是

A：血栓素A2（TXA2）抑制剂

B：二磷酸腺苷P2Y12受体激动剂

C：磷酸二酯酶抑制剂

D: 非特异性纤溶酶原激活剂

答案：D

8.多柔比星的异构体，适应证同多柔比星，疗效相等或略高，但对心脏毒性及脱发都明显低于多柔比星的药物是

A: 吡柔比星

B: 柔红霉素

C: 表柔比星

D: 多柔比星

答案：C

9.入睡困难患者首选哪种催眠药物

A: 艾司唑仑

B: 氯硝西泮

C: 劳拉西泮

D: 谷维素

答案：A

10.属于组胺H2受体阻断剂是

A: 奥美拉唑

B: 多潘立酮

C: 法莫替丁

D: 氯苯那敏

答案：C

11.钾离子竞争性酸抑制剂的作用机制是

A: 通过二硫键与质子泵的硫基呈不可逆性的结合

B: 通过竞争胃壁细胞膜腔面的钾离子来发挥作用

C：抑制乙酰胆碱M受体

D：竞争性拮抗组胺与胃壁细胞上的H?受体结合

答案：B

12.长期频繁使用可致眼部真菌感染

A：利巴韦林

B：氯霉素

C：更昔洛韦

D：四环素可的松

答案：D

13.选择性抑制COX-2的是

A：阿司匹林

B：吲哚美辛

C：塞来昔布

D：对乙酰氨基酚

答案：C

14.与长春新碱合用可增强第Ⅷ对脑神经障碍

A：铂类

B：替尼泊苷

C：异烟肼

D：非格司亭

答案：A

15.对抗香豆素类过量引起出血可选用

A：鱼精蛋白

B：维生素K

C：维生素

D：垂体后叶素

答案：B

16.大剂量应用下列哪种维生素时，可使尿液呈黄色

A：维生素B

B：维生素B

C：维生素B

D：维生素C

答案：C

17.由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别骨髓抑制较严重的是

A：奥沙利铂

B：卡铂

C：亚叶酸钙

D：顺铂

答案：B

18.对淋病、梅毒可作为首选的是

A：红霉素

B：氯霉素

C：土霉素

D：青霉素

答案：D

19.治疗MRSA感染首选药物是

A：克林霉素

B：林可霉素

C：红霉素

D：万古霉素

答案：D

20.用量过大可引起低血糖反应的药物是

A：胰岛素

B：甲状腺素

C：糖皮质激素

D：依替膦酸二钠

答案：A

21.多库酯钠作为泻药的作用机制是

A：一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便

B：通过激活CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内cGMP可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快

C：选择性、高亲和力的5-HT4受体激动剂，可通过5-HT4受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性

D：在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

答案：A

22.以下哪种心律失常禁用强心苷

A：心房颤动

B：心房扑动

C：室性心动过速

D：室上性心动过速

答案：C

23.厌氧菌引起的肺炎宜选用()

A：万古霉素

B：阿奇霉素

C：克林霉素

D：氟康唑

答案：C

24.抗菌谱较窄，对放疗有增敏作用

A：环磷酰胺

B：丝裂霉素

C：放线茵素D

D：阿霉素

答案：C

25.散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用

A：碘苷滴眼液

B：左氧氟沙星滴眼液

C：毛果芸香碱滴眼液

D：复方托吡卡胺滴眼液

答案：D

26.（2017年真题）属于中枢和外周多巴胺D2受体阻断剂,具有镇吐、刺激泌乳素释放的促胃肠动力药是（）

A：昂丹司琼

B: 甲氧氯普胺

C: 多潘立酮

D: 莫沙必利

答案：B

27.属于人体必需、人体不能合成或合成速度不能满足人体需要

A: 复方氨基酸注射液(3AA)

B: 赖氨酸

C: 复方氨基酸(18AA)

D: 精氨酸

答案：B

28.患者，女，54岁。患风湿性二尖瓣关闭不全多年，用地高辛和氢氯噻嗪维持治疗。但近日呼吸困难加重，夜间频繁发作，心慌，两肺满肺野湿性啰音，经检查左室舒张期充盈压明显升高。除上述药物外，该加用哪种药物进行治疗()

A: 多巴胺

B: 氨力农

C: 米力农

D: 硝普钠

答案：D

29.口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

A: 庆大霉素

B: 妥布霉素

C: 异烟肼

D: 新霉素

答案：A

30.复方左炔诺孕酮片、去氧孕烯炔雌醇片、复方孕二烯酮片均含有的成分是

A：炔雌醇

B：甲羟孕酮和炔雌醇

C：维生素B6

D：去氧孕烯

答案：A

31.可增加维生素B6经肾排出量的药物是

A：异烟肼

B：吡嗪酰胺

C：乙胺丁醇

D：红霉素

答案：A

32.用于耐甲氧西林的金葡菌引起的严重感染()

A：克林霉素

B：万古霉素

C：红霉素

D：克拉霉素

答案：B

33.大剂量可导致Q—T间期延长的是

A：莫沙必利

B：甲氧氯普胺

C：西沙必利

D：多潘立酮

答案：C

34.属于润滑性泻药的是

A：多库酯钠

B：利那洛肽

C：番泻叶

D：欧车前

答案：A

35.下列药物中，能促进食物消化的药物是

A：兰索拉唑

B：雷尼替丁

C：乳酶生

D：胶体果胶铋

答案：C

36.对浅部真菌和深部真菌均有抗菌作用的是()

A：咪康唑

B：庆大霉素

C：阿昔洛韦

D：红霉素

答案：A

37.与体内过氧化物和自由基结合,保护细胞中含疏基的蛋白质和酶,参与多种有毒物质解毒反应的药物是

A：多烯磷脂酸胆碱

B：葡醛内酯

C：甘草酸二铵

D: 还原型谷胱甘肽

答案：D

38.糖尿病和胰腺炎血症患者应慎用的药物是

A: 螺内酯

B: 呋塞米

C: 甘露醇

D: 氢氯噻嗪

答案：D

39.下列不属于胃肠解痉药的是

A: 山莨菪碱

B: 颠茄

C: 多潘立酮

D: 阿托品

答案：C

40.地高辛的t1/2=33小时，按每日给予治疗量，血药浓度何时可达到稳态

A: 6天

B: 12天

C: 3天

D: 9天

答案：A

41.具有抗炎作用的他汀类调血脂药是

A: 阿伐他汀

B: 普伐他汀

C: 藻酸双酯钠

D: 氟伐他汀

答案：B

42.特比萘芬临床上作为()的首选药

A: 孢子丝菌病

B: 曲霉病

C: 着色芽生菌病

D: 皮肤癣菌病

答案：D

43.阿昔洛韦的作用靶点是

A: 神经氨酸酶

B: HIV-1和HIV-2蛋白酶

C: 脱氧核糖核酸聚合酶

D: HIV-1反转录酶

答案：C

44.使用铁制品煎煮酸性食物

A: 锥体外系反应

B: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

C: 细胞缺氧、酸中毒、休克

D: 过敏反应

答案：C

45.监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是()。

A: 尿淀粉酶

B: 碱性磷酸酶

C：乳酸脱氢酶

D：肌酸激酶

答案：D

46.（2016年真题）患者，男，56岁。有高血压病史4年。体检：血压156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是

A：肌酸激酶

B：乳酸脱氢酶

C：碱性磷酸酶

D：尿淀粉酶

答案：A

47.糖尿病合并发热、感染者可选用()

A：格列吡嗪

B：胰岛素

C：格列喹酮

D：格列齐特

答案：B

48.酒精、镇静剂、镇痛药、阿片类或神经类药物急性中毒患者禁用()。

A：曲马多

B：吗啡

C：芬太尼

D：哌替啶

答案：A

49.患者，男，63岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0．5g，一日3次；阿卡波糖0．1g，一日3次；吡格列酮30mg，一日1次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能Ⅰ级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A：阿卡波糖

B：二甲双胍

C：贝那普利

D：罗格列酮

答案：D

50.氨力农常见的不良反应是

A：血小板计数减少

B：视物模糊

C：色觉异常

D：严重低血压

答案：A

51.复方地芬诺酯是

A：抗分泌药

B：抗动力药

C：微生态制剂

D：吸附剂

答案：B

52.ACEI与其联合应用时，可能影响后者的促红细胞生成作用的是()

A：噻嗪类利尿药

B：人促红素

C：留钾利尿药

D: β 受体阻断药

答案：B

53.属于ACEI类药，临床用于糖尿病肾病的是

A: 卡托普利

B: 普萘洛尔

C: 肼屈嗪

D: 硝苯地平

答案：A

54.替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

A: 纤维瘤

B: 脑瘤

C: 恶性淋巴瘤

D: 慢性淋巴细胞白血病

答案：B

55.抑制骨髓造血功能的是

A: 氯霉素

B: 庆大霉素

C: 红霉素

D: 四环素

答案：A

56.在常用剂量下，非那雄胺可使血清前列腺特异抗原(PSA)水平下降的幅度为

A: 0.6

B: 0.25

C：0.5

D：0.1

答案：C

57.用于治疗低磷血症的药物是()

A：二磷酸果糖

B：三磷酸腺苷

C：葡萄糖

D：碳酸钙

答案：A

58.在应用螺内酯后应用哪种氨基酸可出现严重并可致命的高钾血症

A：苯丙氨酸

B：谷氨酸

C：精氨酸

D：色氨酸

答案：C

59.对大多数肠杆菌科细菌和厌氧菌有活性，但对铜绿假单胞菌、不动杆菌及革兰阳性菌（尤其是肠球菌和耐青霉素肺炎球菌）的活性不及其他碳青霉烯类药物的是

A：厄他培南

B：西司他丁

C：美罗培南

D：亚胺培南

答案：A

60.（2020年真题）与多柔比星存在交叉耐药性的抗肿瘤药物是

A: 柔红霉素
B: 甲氨蝶呤
C: 右雷佐生
D: 阿糖胞苷
答案：A

61.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。
A: 功能性消化不良
B: 糖尿病胃轻瘫
C: 化疗所致的恶心、呕吐
D: 胃食管反流病
答案：C

62.患者,女75岁,既往有2型糖尿病史18年,有青霉素过敏史,因车祸导致左下肢开放性骨折,术后发生骨髓炎,给予克林霉素治疗10余天,临床应关注的典型不良反应是
A: 急性溶血性贫血
B: 抗生素相关性腹泻
C: 肌肉震颤
D: 红人综合征
答案：B

63.严格控制用药剂量和用药时间可以避免产生
A: 继发反应

B：毒性反应

C：副作用

D：变态反应

答案：B

64.（2021年真题）患者，女，45岁。因持续的烧心和反酸就诊，诊断为胃食管反流病，宜选用的抑酸药物是（）

A：乳酶生

B：吉法酯

C：米索前列醇

D：雷尼替丁

答案：D

65.维生素B1缺乏时出现

A：脚气病

B：成人佝偻病

C：夜盲症

D：糙皮病

答案：A

66.甲状腺危象选用()

A：胰岛素

B：丙硫氧嘧啶

C：二甲双胍

D：格列本脲

答案：B

67.患者，男，66岁。BMI24kg/m2，高血压病史15年，冠心病史3年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服1片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体:血压163/83mmHg，心率80次1分。临床诊断为:（1）心绞痛急性发作;（2）心功能不全、心功能III级;（3）高血压病3级;（4）高脂血症。

A: 硝酸甘油片已经过期

B: 硝酸甘油片单次剂量不足，次数不足

C: 贝那普利、阿托伐他汀等拮抗硝酸甘油的疗效

D: 硝酸甘油片被吞服，而不是舌下含服

答案：C

68.利福平可促进雌激素的代谢或减少其肠肝循环，降低口服避孕药的作用，导致月经不规则，月经间期出血和计划外妊娠。所以，患者服用利福平时，应改用其他避孕方法。

A: 药理作用拮抗

B: 后者血药浓度升高，不良反应增加

C: 不良反应叠加

D: 后者血药浓度下降，药效降低

答案：D

69.以上药物镇咳作用最强的是

A: 吗啡

B: 右美沙芬

C: 喷托维林

D: 可待因

答案：A

70.属于5-HT

A：阿瑞吡坦

B：甲氧氯普胺

C：甲地孕酮

D：格雷司琼

答案：D

71.留钾利尿药若每日服用1次，最宜的服用时间是

A：早餐时

B：早餐前1小时

C：午餐前1小时

D：午餐时

答案：A

72.关于达比加群酯的描述，错误的是

A：与阿司匹林联用不会增加出血风险

B：用药期间应监测凝血功能、肝功能

C：胺碘酮可使达比加群酯血浆浓度提高50%

D：应用期间不能口服奎尼丁类药物

答案：A

73.曲妥珠单抗的适应证是

A：转移性结直肠癌

B：人表皮生长因子受体-2（HER-2）过度表达的乳腺癌

C：晚期恶性黑色素瘤

D：表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌

答案：B

74.关于乙酰半胱氨酸的说法,错误的是()

A：乙酰半胱氨酸能裂解脓痰中糖蛋白多肽链中的二硫键,使浓痰易于咳出

B：乙酰半胱氨酸能减弱青霉素类、头孢菌素类四环素类药物的抗菌活性

C：乙酰半胱氨酸可用于对乙酰氨基酚中毒解救

D：对痰液较多的患者,乙酰半胱氨酸可与中枢性镇咳药合用增强疗效

答案：D

75.口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

A：喷昔洛韦

B：伐昔洛韦

C：泛昔洛韦

D：昔多福韦

答案：B

76.可用于防治泌尿系统结石的是

A：枸橼酸钾

B：氯化钾

C：氯化钙

D：氯化钠

答案：A

77.（2019年真题）可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物（）

A：氨基糖苷类

B：四环素类

C：氟喹诺酮类

D: 大环内酯类

答案：C

78.属于 β 受体激动剂的非强心苷类正性肌力药是

A: 依那普利

B: 地高辛

C: 米力农

D: 多巴酚丁胺

答案：D

79.对地高辛轻度中毒者可及时停药及使用

A: 利尿剂

B: 阿托品

C: 氯化钾、葡萄糖注射液

D: 苯妥英钠

答案：A

80.幼儿甲状腺素不足易患

A: 侏儒症

B: 呆小病

C: 单纯性甲状腺肿

D: 黏液性水肿

答案：B

81.以上药物镇咳作用最弱的是

A: 喷托维林

B: 吗啡

C: 右美沙芬

D: 可待因

答案：A

82.患者女性，30岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌内注射后，10分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

A: 利多卡因

B: 胺碘酮

C: 葡萄糖酸钙

D: 葡萄糖

答案：C

83.属于促血小板生成药的是

A: 甲萘氢醌

B: 氨甲环酸

C: 艾曲泊帕乙醇胺

D: 酚磺乙胺

答案：C

84.咳嗽伴有较多痰液时需要合用

A: 喷托维林

B: 噻托溴铵

C: 氨溴索

D: 沙丁胺醇

答案：C

85.乳酶生是

A: 胃肠解痉药

B: 抗酸药

C: 干燥活乳酸杆菌制剂

D: 生乳剂

答案：C

86.患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结1／18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

A: 用于局部晚期或转移性乳腺癌

B: 干扰微管蛋白功能，使细胞生长停滞于分裂中期

C: 基本结构与紫杉醇不相似

D: 属于半合成紫杉烷类抗肿瘤药物

答案：C

87.为克服服药初期的类早孕反应，双炔失碳酯肠溶片中含有

A: 炔雌醇

B: 去氧孕烯

C: 维生素B6

D: 雌二醇

答案：C

88.可引起听力减退或暂时耳聋的利尿药是

A: 乙酰唑胺

B: 氢氯噻嗪

C: 螺内酯

D: 呋塞米

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/388061063042007022