

黑龙江省静脉输液治疗专科护士培训班试卷

请各位学员仔细阅读题目，并选择相应的选项。100道选择题，每题1分。满分100分。

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：	_____
职称：	_____
工作单位：	_____

1.患者在采血前不宜改变饮食习惯，（ ）小时内不宜饮酒。 [单选题]*

A. 8 小时

B. 8-10 小时

C. 10-24 小时

D. 10 小时

E. 24 小时 (正确答案)

2、使用蝶翼针仅采集柠檬酸钠抗凝标本时，是否应该弃去第一支采血管（） [单选题]*

A. 是 (正确答案)

B. 否

3.颈外静脉穿刺时其正确的进针角度是持穿刺针与皮肤呈（）？ [单选题]*

A.45°进针，入皮后呈25°穿刺 (正确答案)

B.25°进针，入皮后呈45°穿刺

C.60°进针，入皮后呈15°穿刺

D.15°进针，入皮后呈60°穿刺

E.30°进针，入皮后呈30°穿刺

4.不属于头皮静脉特点的是（）？ [单选题]*

A.微蓝色

B.无搏动

C.管壁薄

D.不易压瘪 (正确答案)

E.不易滑动

5.促肾上腺皮质激素及皮质醇监测，常规采血时间点为（） [单选题]*

A.6点；16点；24点

B.8点；16点；24点 (正确答案)

C.8点；18点；24点

D.6点；16点；22点

E.6点；16点；24点

6.患者因输液左上肢引起条索状红线，红肿热痛，下列处理错误的是（）？ [单选题]

*

A.用抗生素

B.95%乙醇湿敷

C.超短波理疗

D.抬高肢体

E.增加患肢活动(正确答案)

7.采血时选择首选静脉血管是（） [单选题]*

A. 贵要静脉

B.前臂掌侧静脉

C.手臂肘前区静脉(正确答案)

D.正中静脉

E.头静脉

8.输入药液浓度过大可能引起（）？ [单选题]*

A.酸中毒、高血钾

B.碱中毒、高血钾

C.空气栓塞

D.肺水肿

E.静脉炎(正确答案)

9.发生空气栓塞时，应防止空气栓子进入（）？ [单选题]*

A.肺静脉入口

B. 主动脉入口

C. 肺动脉入口 (正确答案)

D. 腹主动脉入口

E. 上腔静脉入口

10. 禁止在输液侧采集血标本，但紧急情况下需要在输液侧肢体采集血标本，宜在输液结束后（）小时 [单选题]*

A. 3 小时 (正确答案)

B. 4 小时

C. 5 小时

D. 6 小时

E. 7 小时

11. 凝血功能与血小板功能相关监测，采血量大于 20ml 时，宜采用（）以下的采血针 [单选题]*

A. 20G

B. 21G (正确答案)

C. 22G

D. 23G

E. 24G

12. 静脉采血时，静脉绑扎时间不超过（） [单选题]*

A. 4 分钟

B.3 分钟

C.2 分钟

D.1 分钟 (正确答案)

E.持续

13.不同采血管的采集顺序 () [单选题]*

A.血培养瓶；柠檬酸钠抗凝采血管；含有或不含有分离胶的肝素抗凝采血管；血清采血管；含有或不含有分离胶的 EDTA 抗凝采血管；葡萄糖酵解抑制采血管

B.血培养瓶；柠檬酸钠抗凝采血管；血清采血管；葡萄糖酵解抑制采血管；含有或不含有分离胶的肝素抗凝采血管；含有或不含有分离胶的 EDTA 抗凝采血管

C.血培养瓶；柠檬酸钠抗凝采血管；血清采血管；含有或不含有分离胶的肝素抗凝采血管；含有或不含有分离胶的 EDTA 抗凝采血管；葡萄糖酵解抑制采血管 (正确答案)

D.血培养瓶；柠檬酸钠抗凝采血管；血清采血管；含有或不含有分离胶的 EDTA 抗凝采血管；含有或不含有分离胶的肝素抗凝采血管；葡萄糖酵解抑制采血管

E.柠檬酸钠抗凝采血管；血清采血管；含有或不含有分离胶的 EDTA 抗凝采血管；含有或不含有分离胶的肝素抗凝采血管；葡萄糖酵解抑制采血管，血培养瓶

14.对于一般患者，临床上用 20% 甘露醇降低颅内压的方法，下列描述正确的是 () ? [单选题]*

A.快速静推

B.缓慢静滴，防治高渗溶液产生静脉炎

C.1-2 小时内滴完 250ml

D.15-30 分钟内滴完 250ml (正确答案)

E.输液速度控制在 60-80 滴 / 分

15.输液引起静脉炎时早期局部湿敷宜用 () ? [单选题]*

A.70%乙醇

B.25%硫酸镁溶液

C.50%硫酸镁溶液 (正确答案)

D.生理盐水

E.20%乙醇

16.门诊患者采血应取体位 () [单选题]*

A.自由体位

B.站位

C.坐位 (正确答案)

D.卧位

E.半卧位

17.静脉炎的治疗,哪项是错误的 ()? [单选题]*

A.抬高患肢,并制动

B.初期局部用热湿敷

C.超短波治疗

D.中药治疗

E.以上都不对 (正确答案)

18.小儿静脉输液常选用的静脉是 ()? [单选题]*

A.大隐静脉

B. 饶静脉

C. 头皮静脉 (正确答案)

D. 颈静脉

E. 以上都不对

19. 小儿头皮静脉输液如误注入动脉，局部表现为（）？ [单选题] *

A. 局部无变化

B. 沿静脉走向呈条索状红线

C. 苍白，水肿

D. 呈树枝分布苍白 (正确答案)

E. 以上都不对

20. 同时静脉输注数种药物时，应特别注意药物的（）？ [单选题] *

A. 刺激性

B. 有无变质

C. 有效期

D. 配伍禁忌 (正确答案)

E. 以上都不对

21. 为避免损伤血管，应使用管径最小 10 毫升且产生压力不超过（）的注射器或预充式导管冲洗器进行冲、封管。 [单选题] *

A. 55 PSI

B.25 PSI(正确答案)

C.20 PSI

D.19 PSI

E.18 PSI

22.尿激酶需现配现用，有效时间为（）？ [单选题]*

A.4小时(正确答案)

B.3小时

C.2小时

D.1小时

E.5小时

23.下列哪一种化疗药属于发泡性化疗药（）？ [单选题]*

A.表阿霉素(正确答案)

B.足叶乙苷

C.环磷酰胺

D.甲氨蝶呤

E.顺铂

24.血管上的哪一层损伤最易发生静脉炎（）？ [单选题]*

A.内膜(正确答案)

B.中膜

C.外膜

D.基底膜

E.底膜

25.血管的神经分布在血管的（）？ [单选题]*

A.内膜

B.中膜 (正确答案)

C.外膜

D.基底膜

E.底膜

26.上腔静脉的血流量是多少（）？ [单选题]*

A.1500 毫升/分

B.2000-2500 毫升/分 (正确答案)

C.3000 毫升/分

D.3000-3500 毫升/分

E.1000 毫升/分

27.处理一个被污染的针头以下那种方法是正确的（）？ [单选题]*

A.套针帽，并放入防生物危险性的容器

B.在丢弃之前将针头与针筒分开

C.放入一次性的防穿刺利器收容器 (正确答案)

E.以上都不对

28.控制医院感染最简单、最有效、最方便、最经济的方法是（）？ [单选题]*

A.环境消毒

B.合理使用抗菌素

C.医护人员洗手 (正确答案)

D.隔离传染病人

E.以上都不对

29.病人教育对象是指（）？ [单选题]*

A.病人家属

B.住院病人

C.出院病人

D.病人及其家属 (正确答案)

E.门诊病人

30.研究证明渗透压大于（）的药物可能在24小时内造成化学性静脉炎。 [单选题]*

A.>600mOsm/L (正确答案)

B.>500mOsm/L

C.>400mOsm/L

300mOsm/L

E. >200mOsm/L

31.以下描述错误的是（）？ [单选题]*

A.外膜包含血管，提供静脉自身营养

B.外膜硬化时，静脉滚动，穿刺困难

C.中膜被穿刺时感疼痛

D.内膜有收缩与舒张功能(正确答案)

E.内皮细胞层损伤易导致静脉炎

32.某女，入院诊断后，拟进行3-5天输液治疗，你认为最适宜的穿刺工具是（）？

[单选题]*

A.头皮针

B.套管针(正确答案)

C.深静脉导管

D.中心静脉导管

E.外周中心静脉导管

33.锁骨下静脉的血流量为（）？ [单选题]*

A.95ml/min

B.100-300ml/min

C.1000-1500ml/min(正确答案)

E.2500 3000ml/min

34.头皮针的有效留置时间是（）？ [单选题]*

A.<4h (正确答案)

B.4-6h

C.8h

D.6-8h

E.10h

35.中心静脉导管尖端放于上腔静脉的位置（）？ [单选题]*

A.上 1/3到右心房的连接处

B.下 1/3到右心房的连接处 (正确答案)

C.上 1/3到左心房的连接处

D.下 1/3到左心房的连接处

E.以上都不对

36.输液治疗时冲管液的最小量应为导管和附加装置容量的几倍（）？ [单选题]*

A.1 倍

B.2 倍 (正确答案)

C.3 倍

D.4 倍

37.一般情况下 PICC 导管透明敷贴应多长时间更换（）？ [单选题] *

- A.每天
- B.2~3 天
- C.5~6 天
- D.7 天 (正确答案)
- E.8 天

38.为预防中心静脉导管引起的相关感染，哪项措施不正确（）？ [单选题] *

- A.置管部位铺大无菌单
- B.置管人员戴帽子、口罩、无菌手套、穿无菌手术衣
- C.成人中心静脉置管应首选颈静脉，尽量避免使用股静脉 (正确答案)
- D.置管过程中手套污染或破损应当立即更换
- E.置管过程要严格无菌操作

39.选择化疗静脉通路的原则不包括哪一项（）？ [单选题] *

- A.按照先远后近、左右交替使用的原则
- B.持续静脉给药、输入发泡性药物选择中心静脉通路
- C.不了解药物性质时选择中心静脉通路
- D.经外周静脉留置针给予化疗药物时，留置针不可留置
- E.乳腺癌术前必须选择健侧给药 (正确答案)

() ? [单选题] *

A.12

B.24

C.48 (正确答案)

D.36

E.72

41.脉冲冲管方式是指 () ? [单选题] *

A.推动注射器活塞时有节律地推一下停一下 (正确答案)

B.推动注射器活塞时匀速推注

C.推动注射器活塞时有节律地推一下停一下，最后5毫升匀速推注

D.推动注射器活塞时有节律地推一下停一下，最后5毫升边注射边撤出针头

E.以上都不是

42.PICC的最佳穿刺血管是 () ? [单选题] *

A.贵要静脉 (正确答案)

B.头静脉

C.正中静脉

D.尺静脉

E.以上都不对

43.PICC穿刺点的消毒范围是 () ? [单选题] *

15cm 两侧到臂缘

B. 穿刺点上下 10cm 两侧到臂缘

C. 穿刺点上下 5cm 两侧

D. 整个手臂 (正确答案)

E. 以上都不对

44. PICC 每次输液后，用什么型号的注射器抽吸生理盐水冲管（）？ [单选题] *

A. 2ml 以下

B. 5ml 以下

C. 10ml 以下

D. 10ml 以上 (正确答案)

E. 以上都不对

45. PICC 换药时的消毒方法是（）？ [单选题] *

A. 顺时针 逆时针 → 顺时针 (正确答案)

B. 逆时针 → 顺时针 → 逆时针

C. 一直顺时针消毒

D. 一直逆时针消毒

E. 以上都不对

46. PICC 接头应消毒多长时间（）？ [单选题] *

A. 8 秒

B.10 秒

C.15 秒 (正确答案)

D.20 秒

E.30 秒

47.PICC 有效留置时间为 () ? [单选题] *

A.1 月

B.3-6 月

C.6 月

D.6 月-1 年

E.7 天-1 年 (正确答案)

48.PICC 置管人员应是 () ? [单选题] *

A.医生

B.护士

C.静脉治疗专职护士 (正确答案)

D.护师

E.执业医师

49.以下不是 PICC 应用对象的是 () ? [单选题] *

A.肺炎患者 (正确答案)

B.早产儿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388105115074006133>