北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试试题》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：骨盆环由下列哪些结构构成（　）。A.髂骨与骶尾骨

B.耻骨与骶尾骨

C.髋骨与骶尾骨

D.髋骨与尾骨

E.耻骨、坐骨与骶骨

2、单项选择题：男性患者，20岁，半年前曾患左股骨急性化脓性骨髓炎，经治疗后好转，但局部有窦道形成，常有少许稀黄色脓汁流出，近4日窦道口闭合，但出现高热，局部压痛明显，并有红肿，X线片示有死骨存留，而且包壳形成充分，应立即（　）。A.瘘道切除，一期缝合

B.骨钻孔手术

C.死骨摘除，植骨术

D.切开引流

E.窦道搔刮术

3、单项选择题：诊断腰椎间盘突出症最重要的依据是（　）。A.X线平片

B.MRI

C.CT

D.电生理检查

E.病史、症状及体格检查

4、单项选择题：膝关节旋转挤压试验阳性是下列哪一种疾病的重要体征（　）。A.膝关节交叉韧带损伤

B.膝关节滑膜炎

C.膝关节半月板损伤

D.膝关节侧付韧带损伤

E.以上都不正确

5、单项选择题：受伤创口的处理原则是越早清创，感染机会越少，疗效越好，一般应争取在伤后几小时内进行缝合（　）。A.10～12小时

B.6～8小时

C.12～14小时

D.24～28小时

E.24小时

6、单项选择题：有关骨与关节结核的表现，下列哪项不正确（　）。A.常形成流注脓肿

B.常形成窦道

C.死骨可经窦道流出

D.寒性脓肿不会穿破肠管、膀胱等空腔脏器

E.关节结核可出现梭形肿胀

7、单项选择题：女性，20岁，高处坠落伤致双下肢不全瘫而急诊入院。X线及CT证实T12椎体爆裂骨折，碎骨片挤入椎管内并压迫脊髓，T12椎板骨折、轻度移位。下述哪个治疗方案最合理（　）。A.立即脱水、给予神经营养药物，3周后根据神经恢复情况再考虑是否手术

B.除给予脱水及营养神经药物外，立即行大重量复位牵引

C.行椎板切除并摘除挤入椎管内的碎骨片，脊柱植骨，内固定

D.经椎弓根外固定架复位及固定

E.行椎板前外侧减压，切除挤入椎管内的碎骨片，脊柱植骨、内固定

8、单项选择题：锁骨骨折复位固定后，拆除外固定的时间一般为（　）。A.1～2周

B.2～3周

C.3～4周

D.4～5周

E.5周以上

9、单项选择题：颈椎间盘突出手术治疗下列不正确的是（　）。A.非手术治疗无效反复发作者需手术治疗

B.脊髓型颈椎病常需手术治疗

C.伴椎管狭窄者一般行前路手术

D.后路手术以减压为主，一般不行髓核摘除

E.前路手术多同时行植骨融合稳定脊柱

10、单项选择题：初诊特发性脊柱侧弯最关键的诊断依据是（　）。A.X线片见脊柱弯曲，未见椎体异常

B.X线片上见到椎体破坏

C.X线片上见椎旁软组织影增厚

D.MRI见脊髓空洞

E.CT检查见椎间盘突出

11、单项选择题：指骨X线片示，骨干中心密度减低区骨皮质膨大，边缘整齐，阴影中心有钙化点。最大可能是（　）。A.骨囊肿

B.内生性软骨瘤

C.成软骨细胞瘤

D.成骨细胞瘤

E.嗜酸性肉芽肿

12、单项选择题：恶性肿瘤的诊断，最重要的依据是（　）。A.病程短、发展快

B.肿块质硬、固定

C.血清酶学及免疫学检查

D.X线、放射线核素或超声波检查

E.病理学检查

13、单项选择题：男，6岁。左侧斜颈，颈椎X线检查正常，适当的处理是（　）。A.石膏矫形

B.支具矫形

C.胸锁乳突肌全切除

D.物理疗法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/395122210023011201