



为学教育



为学教育

为学教育

为学教育

损伤中毒病人的护理

为学教育

为学教育

为学教育

为学教育

为学教育

为学教育



cqwxjyw

为学教育



为学教育

www.wxjyw.cn

• 考情分析

2023年考题数 12

近5年出题总数 60

本章节考察内容较繁杂，病种之间相互关系不大

在近4年的考试中，有48道考题出现，主要分布在烧伤病人护理、腹部损伤病人护理、常见四肢骨折病人护理、有机磷中毒病人护理

本章其他13节，出题可能性偏小



cqwxjyw

2023年护士资格考试



为学教育

www.wxjyw.cn



创伤病人的护理

损伤、中毒病人的护理

2023年1题 近5年共6题



cqwxjyw

为学教育



为学教育

www.wxjyw.cn

高频考点

闭合伤损伤：涉及扭伤、挫伤、挤压伤、爆震伤。

其中**挤压伤**可造成受压部位肌肉广泛缺血坏死，严重者可发生以肌红蛋白尿和高血钾为特征急性肾衰竭及休克，临床称为**挤压综合征**。

开放伤：皮肤、黏膜的完整性遭到破坏，其中**裂伤**周围组织破坏较重，易发坏死和感染。

例：患者，男性，20岁。因工程塌方被石板压迫4小时，伤肢严重肿胀，组织广泛坏死。该损伤属于

A. 扭伤

B. 挤压伤

C. 挫伤

D. 冲击伤

E. 撕裂伤

答案：B

诊疗：胸、腹腔**穿刺可证明**有无内脏破裂、出血；诊疗明确前应**慎用麻醉性止痛药**

处理原则：清创术争取在**伤后6~8小时内**施行，但对污染

复习时多种“6”：日光照射消毒暴晒6小时，洗胃在6小时内最有效。断肢再植应在6小时内进行，溶栓应在6小时内进行，腰麻后去枕平卧4~6小时，清创最佳在伤后6~8小时内实施。烧伤病人体液渗出6~8小时最快，产褥期为6周，急救病人时病例6小时内据实补记。



cqwxjyw

为学教育



为学教育

www.wxjyw.cn

高频考点

(三) 创伤急救

1. 急救生命 优先处理危及生命的紧急情况

如心跳骤停、窒息、活动性大出血、张力性或开放性气胸、休克、腹腔内脏脱出等。

2. 呼吸支持 立即清理口腔异物，使用通气道维持呼吸道通畅。

3. 迅速有效止血 使用止血带止血时，每隔1小时放松2~3分钟。

4. 转运 脊柱伤平卧于硬板床，胸部损伤重者，取伤侧向下的低斜坡位；转运途中病人的头部朝后，防止脑缺血忽然死亡。

高频考点

（四）软组织闭合性创伤的护理

1. 观察病情，对挤压伤病人应观察尿量、尿色、尿比重，注意是否发生急性肾功能衰竭。
2. 局部制动 抬高患肢 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，以减轻肿胀和疼痛。
3. 配合局部治疗 小范围软组织创伤后早期局部冷敷，以降低渗血和肿胀。24~48小时后热敷，增进吸收和炎症消退。

（三）软组织开放性创伤的护理

1. 伤口换药：**先清洁**伤口、**再污染**伤口、**最终重污染**伤口；

2. 浅表肉芽处理 **肉芽水肿**：**5%氯化钠**湿敷，

创面脓液稠厚且坏死，用**硼酸溶液**（优琐）湿敷

例：患者，男，35岁。右外踝**软组织损伤半天**，局部青紫，**肿胀**。目前采用的处理措施是

- A. 局部制动
- B. 冰袋冷敷
- C. 红外线照射
- D. 局部按摩
- E. 早期功能锻炼

答案：B



软组织闭合性损伤：早期冷敷，
二十四小时后可热敷和理疗

考题举例

例：患者女，25岁。右小腿有250px×125px的肉芽组织水肿创面。换药时应选用的湿敷药液是（2023）

A. 等渗盐水

B. 0.02%呋喃西林溶液

C. 0.1%依沙丫啶溶液

D. 含氯石灰硼酸溶液

E. 5%氯化钠溶液

答案：E

2023年护士资格考试



烧伤病人的护理

损伤、中毒病人的护理

23年6题， 近5年15题



cqwxjyw

为学教育



为学教育

www.wxjyw.cn

烧伤病理生理

1. 急性体液渗出期（休克期） 休克是烧伤后48小时内造成病人死亡的主要原因。大面积烧伤，毛细血管通透性增长，造成大量血浆外渗至组织间隙及创面，引起有效循环血量锐减。体液渗出在烧伤后2~3小时开始，6~8小时最快，至36~48小时达高峰。
2. 感染期
3. 修复期：组织烧伤后，在炎症反应的同步，创面开始了修复。



考题举例



例：例：患者女，38岁。大面积烧伤后5小时入院。心率120次 / 分、血压70/50mmHg, 尿少。发生上述情况最可能的原因是

- A. 大量红细胞丧失造成肺换气障碍
- B. 大量水分蒸发造成脱水
- C. 疼痛造成的生理反应
- D. 大量体液从血管内渗出引起低血容休克
- E. 创面细菌感染造成感染性休克

胀答案：C



cqwxjyw

www.wxjyw.cn

考题举例



为学教育

www.wxjyw.cn

例：大面积烧伤后2天，最主要的全身变化是

- A. 应激性溃疡
- B. 脓毒血症
- C. 低血容量性休克
- D. 急性肾功能衰竭
- E. 急性呼吸衰竭、肿胀

答案：C

休克是烧伤后48小时内造成病人死亡的主要原因
体液渗出自烧伤后2~3h开始，6~8h最快，至36~48h达高峰

烧伤面积

部 位	占成人体表	占儿童体表
头 颈 { <ul style="list-style-type: none"> 发 部 3 面 部 3 颈 部 3 	} 9	$9 + (12 - \text{年龄})$
双上肢 { <ul style="list-style-type: none"> 双上臂 7 双前臂 6 双 手 5 	} 9×2	9×2
躯 干 { <ul style="list-style-type: none"> 躯干前 13 躯干后 13 会 阴 1 	} 9×3	9×3
双下肢 { <ul style="list-style-type: none"> 双 臀 5* 双大腿 21 双小腿 13 双 足 7* 	} $9 \times 5 + 1$	$9 \times 5 + 1 - (12 - \text{年龄})$

烧伤新九分法：

三三三、五六七/

十三、十三、二十一/

双臀占五会阴一/

小腿十三双足七

烧伤深度

深度	组织学深度	临床特征	感觉	愈合
I度	表皮浅层	红肿、无水泡	烧灼感	不留瘢痕
浅II度	表皮生发层和真皮乳头层	肿胀、水泡大	剧烈疼痛	不留瘢痕
深II度	真皮深层	肿胀，水泡小	迟钝	留瘢痕
III度	全层	无水泡	消失	留瘢痕

I度：红斑、烧灼感；浅II度：水泡，疼痛剧烈；深II度：水泡，疼痛消失；III度：碳化、焦化



cqwxjyw

为学教育



为学教育

www.wxjyw.cn

烧伤严重程度

1. 轻度烧伤 II度烧伤面积 $<10\%$
2. 中度烧伤 II度烧伤面积 $10\% \sim 29\%$ ，或III度 $<10\%$
3. 重度烧伤 烧伤总面积 $30\% \sim 50\%$ ，或III度 $10\% \sim 20\%$ ，或面积不足，但并发休克、呼吸道烧伤等
4. 特种烧伤 总面积 $>50\%$ 或III度 $>20\%$



cqwxjyw

为学教育



为学教育

www.wxjyw.cn

考题举例

例：患者，男，22岁。因火灾致面部烧伤入院，体检发觉，病人声音嘶哑，口鼻处有黑色分泌物，鼻毛烧焦。

该患者目前主要危险是

- A. 呼吸衰竭
- B. 肺部感染
- C. 肺水肿
- D. 窒息
- E. 呼吸性碱中毒

呼吸道烧伤易发生
窒息和肺部感染

答案：D



cqwxjyw

为学教育

高频考点



为学教育

www.wxjyw.cn

护理措施：

- **现场急救：**急救生命是急救的原则。脱离热源，热液浸渍的衣裤，冷水冲淋剪开。**生石灰**烧伤去灰后冲洗。
- **预防休克：**补液是防治烧伤休克主要措施（尽量防止饮**白开水**）。合并呼吸道烧伤或颅脑损伤**禁用吗啡**
- **尽快转运：**上下楼时**头朝下防**，汽车转运时应横卧或**头后足前**，预防脑缺血。



cqwxjyw

为学教育

高频考点



为学教育
www.wxjyw.cn

(二) 静脉输液的护理

1. 早期补液方案 我国常用的烧伤补液量计算公式:

第一种二十四小时补液量 = 体重(kg) × 烧伤面积 (%) × 1.5ml, 另加每日生理需水量2000ml, 即为补液总量。

2. 液体的种类与安排 晶体液首选平衡盐液。胶体液首选血浆。因为烧伤后第1个8小时内渗液最快, 应在首个8小时内输入上述总量的1/2。

晶体和胶体溶液的百分比一般为2:1, 深度烧伤为1:

3. 观察指标 尿量是判断血容量是否充分的简便而可靠的指标。成人每小时尿量不小于30ml, 有血红蛋白尿时要维持在50ml以上。

(三) 创面的护理

- **暴露疗法**护理：合用于Ⅲ度烧伤、**特殊部位**(头面部、颈部或会阴部)及特殊感染(如铜绿假单胞菌、真菌)的创面、大面积创面。
- 烧伤肢体维持并固定于**功能位**：如颈部烧伤应取后伸位，四肢烧伤取伸直位，手部固定在半握拳的姿势且指间垫油纱以防粘连。



考题举例



例：患者，男性，50岁。因为严重烧伤造成急性体液大量丢失。医生开具下列医嘱，应首先为患者输入的是

- A. 5%NaHCO₃
- B. 平衡盐溶液
- C. 3%氯化钠溶液
- D. 5%葡萄糖溶液
- E. 10%葡萄糖溶液

答案：B

晶体液首选平衡盐溶液
次选等渗生理盐水
胶体液首选血浆

例：（102~107题共用题干）2023

患者女，16岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、
双上肢烧伤入院。查体：烧伤部位有大量水疱，
痛觉迟钝。

102. 采用中国新九分法估计该患者的烧伤面积约为

- A. 18% B. 21% C. 24%
D. 27% E. 54%

答案：C



cqwxjyw

为学教育



为学教育

www.wxjyw.cn

考题举例

103. 患者的烧伤严重程度是

A. 轻度

B. 中度

C. 中重度

D. 重度

E. 特重度

答案：B



cqwxjyw

为学教育

考题举例



为学教育

www.wxjyw.cn

104. 根据患者烧伤部位的特点，护士应重

点观察

A. 呼吸功能

B. 上肢血液循环

C. 意识

D. 疼痛程度

E. 血压

答案：A



cqwxjyw

考题举例



为学教育

www.wxjyw.cn

105. 不正确的补液方案是

A. 尽早开始

B. 见尿补钾

C. 先晶后胶

D. 先糖后盐

E. 先快后慢

答案：D



cqwxjyw

为学教育

考题举例



为学教育

www.wxjyw.cn

106. 患者入院第5天出现发烧，体温 39.2°C ，创面有黄绿色分泌物伴有恶臭味，引起感染的细菌考虑为

- A. 溶血性链球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 梭形芽胞杆菌

答案：D



考题举例



107. 患者经1个月的治疗拟于近日出院，因为烧伤部位瘢痕较严重，患者自觉不愿见人，不想离开医院。

对其采用护理措施不当的是

- A. 了解患者病倾听其诉说
- B. 动员尽快出院
- C. 简介后期整形美容治疗措施
- D. 鼓励自理，增强独立性
- E. 不回避问题，尽量稳定情绪

答案：B



cqwxjyw

为学教育



为学教育

www.wxjyw.cn

2023年护士资格考试



毒蛇咬伤病人的护理

损伤、中毒病人的护理

近5年出题总数：0




cqwxjyw

高频考点



➤ 毒蛇咬伤临床体现：局部疼痛，肢体肿胀

➤ **急救护理**：毒蛇咬伤病人切勿惊恐奔跑，以免加速蛇毒的吸收和扩散。立即在伤口的近心端10cm用止血带或布带等环形结扎。转送病人途中伤肢不宜抬高。胰蛋白酶有直接分解蛇毒作用。



2023年护士资格考试



腹部损伤病人的护理


损伤、中毒病人的护理

2023年3题 23年0题
近5年共7题



腹部损伤根据腹部有无伤口分为开放性和闭合性两类。

在闭合性腹部损伤中，常见受损依此是脾、肾、小肠、肝、肠系膜等。




考题举例

患者，男，45岁，外伤急诊入院。查体：面色苍白，意识模糊，腹部膨隆，右上腹有一刀刺开放性伤口不断流血，该患者最可能受伤的腹腔脏器是

- A. 肝
- B. 脾
- C. 胃
- D. 胰
- E. 结肠

• 答案 A





cqwxjyw

临床体现



为学教育

www.wxjyw.cn

- 1. 实质性脏器破裂和血管损伤：肝、脾、肾等实质性脏器和大血管破裂时，**主要体现为腹腔内出血。**
- 2. 空腔脏器破裂：**临床上以腹膜炎的体现为主，主要的体征是明显的腹膜刺激征。**



cqwxjyw

为学教育

辅助检验



为学教育

www.wxjyw.cn

B超检验：对实质性脏器损伤的诊疗率达90%，可作动态观察；

立位腹部平片：可观察到膈下游离气体，合用于空腔脏器，及某些脏器的大小、形态和位置变化，但处于休克状态病人，不宜此项检验；

诊疗性腹腔穿刺：判断腹腔内脏器有无损伤和哪一类脏器损伤，为确诊手段。



cqwxjyw

为学教育

辅助检验



为学教育

www.wxjyw.cn

1. 先急救威胁生命的伤情，如呼吸心搏骤停、窒息、

开放性气胸等应迅速予以处理。

2. 伤员应禁食、胃肠减压，及早应用抗生素、破伤风

抗毒素。对有内脏脱出者，一般不可回纳腹腔以免污染，

可用消毒或清洁碗盖住脱出之内脏，预防受压，外面再加以包扎。

3. 对疑有腹腔内脏损伤病人的护理

病人应绝对卧床，不随意搬动，尽量取半卧位；

并做到“四禁”，即**禁食禁饮、禁忌灌肠、禁用泻药、**

禁用吗啡等止痛药物。严密观察生命体征，腹痛范围、

程度及腹膜刺激症状。



cqwxjyw

辅助检验



为学教育

www.wxjyw.cn

手术后护理

流质术后**平卧6小时**，血压平稳者改为半卧位，术后**禁食2~3天**，做好胃肠减压的护理，肠蠕动恢复、肛门排气后停止胃肠减压，无腹胀拔胃管，进少许流质

拆线时间：头面颈部术后4~5天，下腹部及会阴部6~7天，胸、上腹部和背臀部7~9天，四肢10~12天，减张伤口14日



cqwxjyw

为学教育

考题举例



为学教育

www.wxjyw.cn

例：患者，女性，36岁。车祸造成腹部闭合性损伤，疼痛剧烈，诊疗明确后，护士遵医嘱予以镇痛剂，其目的是

- A. 便于手术
- B. 减轻伤痛刺激并预防神经源性休克
- C. 预防和控制感染
- D. 便于观察病情
- E. 有利于与患者的沟通

答案：B

例：患者被汽车撞伤，右上腹剧痛，呼吸36次/分，
脉搏100次/分，BP90/65mmHg，诊疗不明，禁用

- A. 非那根
- B. 安定
- C. 6-氨基己酸
- D. 吗啡
- E. 鲁米那

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/395343143203011323>