

卫生事业单位招聘考试（护理学专业知识）历年真题试卷汇编 1(题  
后含答案及解析)

题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 4. 判断题

单项选择题

1. 在责任制整体护理过程中，按照护理程序的要求，“制定护理措施”属于( )。

- A. 评估
- B. 计划
- C. 实施
- D. 评价

正确答案：B

解析：护理程序包括护理评估、护理诊断、护理计划、护理实施、护理评价等五个方面，其中制定护理措施属于计划阶段。

2. 患者，女，54岁，因慢性胆囊炎急性发作住院治疗两周后，病人自感身体恢复缓慢，害怕出院，时刻需要医护人员给予过多关注，该现象属于( )。

- A. 角色行为冲突
- B. 角色行为缺如
- C. 角色行为消退
- D. 角色行为强化

正确答案：D

解析：病人自觉病重或是恢复慢，害怕出院，这些都是患者过于强调自己病人身份的表现，属于角色行为强化。

3. 患者，男，72岁，脑出血入院，现处于昏迷状况，此时护患关系的模式应( )。

- A. 指导—合作型
- B. 主动—被动型
- C. 共同参与型
- D. 指挥服从型

正确答案：B

解析：昏迷患者，所有的生活自理能力完全丧失，要完全靠护士进行护理，所以属于主动—被动型的护患关系模式。

4. 为新住院患者或暂时离床患者准备床单位，正确的铺床操作是( )。

- A. 盖被三折于背门一侧

- B. 床中部或尾部铺中单
- C. 盖被扇形三折于床尾
- D. 据床头 15cm 反折盖被

正确答案：C

解析：新入院患者或是暂时离床患者，准备床单位的时候应是暂空床，将盖被三折扇形折叠于床尾。将盖被三折于背门一侧、铺橡胶中单属于麻醉床范畴，护理铺床中没有将床头反折盖被的措施。

5. 任何人在医院环境下，遭受病原体侵袭发生的诊断明确的感染，其中外源性感染最主要且最常见的传播途径是( )。

- A. 空气传播
- B. 接触传播
- C. 飞沫传播
- D. 血行传播

正确答案：B

解析：在医院内，外源性的感染最常见的传播途径是接触传播，主要发生存病人之间或是医务人员和病人之间。

6. 根据检查要求和病情状况，患者需采取合适卧位，下列不正确的是( )。

- A. 十二指肠引流术取头低足高位
- B. 预防脑水肿取头高足低位
- C. 胃镜检查取右侧卧位
- D. 休克患者取中凹卧位

正确答案：C

解析：根据消化器官的解剖特点，胃镜检查多采用左侧卧位。

7. 牛奶有助于睡眠是因为含有( )。

- A. A-色氨酸
- B. B-色氨酸
- C. F-色氨酸
- D. L-色氨酸

正确答案：D

8. 下列化疗药物配制时的防护操作过程，不规范的是( )。

- A. 稀释和抽取药液时应插入双针头
- B. 抽取药液后，在瓶外排气和排液
- C. 所抽药液不得超过注射器容量的 3 / 4
- D. 抽取药液后，放入垫有聚乙烯薄膜的无菌盘内备用

正确答案：B

解析：化疗药物的配制过程，应注意避免使药物颗粒进入空气中，所以抽取药液之后，应在瓶内排气和排液。稀释和抽取药液时插入双针头，可有效避免瓶内压力过大而使药液溢出。另外 C、D 选项都提示进行抽吸药物的时候注意无菌操作。

9. 患者，男，72 岁，支气管哮喘急性发作入院，由于呼吸极度困难采取端坐卧位，该患者采取的卧位属于( )。

- A. 主动卧位
- B. 被动卧位
- C. 被迫卧位
- D. 习惯卧位

正确答案：C

解析：该患者本身有能力自行调整体位，但是因为极度呼吸困难，病情需要不得不采取端坐卧位，这种情况属于被迫卧位。

10. 异常脉搏评估与护理时，需要两名护士同时进行测量的情况是( )。

- A. 同一单位时间脉率少于心率时
- B. 同一单位时间心率少于脉率时
- C. 成人心率超过 100 次 / 分时
- D. 成人心率低过 60 次 / 分时

正确答案：A

解析：同一单位时间内，脉率小于心率为脉搏短绌，此时因为脉率和心率不相等，需要两名护士同时进行测量，一人测脉率，一人测心率。

11. 从无菌包内取出部分物品的操作，不正确的是 ( )。

- A. 手接触包布四角内面依次揭开
- B. 用无菌持物钳夹取所需物品
- C. 按原折痕包盖未用无菌物品
- D. 注明开包日期和时间并签名

正确答案：A

解析：无菌操作时，打开无菌包之后，应注意手不可以接触包布内面。

12. 临床常用化学消毒法描述正确的是( )。

- A. 环氧乙烷可用于食品的消毒
- B. 过氧乙酸可用于金属类器械消毒
- C. 碘伏稀释后不稳定宜现用现配
- D. 苯扎溴铵对肥皂有促进作用

正确答案：C

解析：环氧乙烷主要用于一次性注射器、输液器、输血器等的消毒，过氧乙酸对金属类有腐蚀作用，一般不用于金属器械类消毒，苯扎溴铵不可接触肥皂，

否则消毒效果明显下降。

13. 半坐卧位患者发生压疮的诸多因素中，骨骼及肌肉向下滑行，而皮肤及表皮组织仍停留原位，从而两层组织间滑行而产生进行性相对移位的力是( )。

- A. 压力
- B. 摩擦力
- C. 剪切力
- D. 弹力

正确答案：C

14. 需鼻饲饮食的患者，每次的鼻饲量和间隔时间为( )。

- A. 不超过 100ml，不少于 2h
- B. 不超过 200ml，不少于 2h
- C. 不超过 300ml，不少于 3h
- D. 不超过 400ml，不少于 3h

正确答案：B

15. 临床护理中，护士处理及执行医嘱的行为，不正确的是( )。

- A. 患者对医嘱有异议，护士应再次核实医嘱
- B. 患者病情变化时，可暂停医嘱，并通知医生核准
- C. 紧急情况，医生的口头医嘱，护士需复述无误后执行
- D. 对于不清楚不完整的医嘱，护士有权不予执行

正确答案：B

解析：患者病情变化时，护士应及时通知医生，并准确的执行医嘱。护士没有处方权，不可私自停止医嘱。

16. 根据缺氧原因和血氧变化特征，通过氧疗改善缺氧状况最有效的缺氧类型是( )。

- A. 组织性缺 O<sub>2</sub>
- B. 循环性缺 O<sub>2</sub>
- C. 低张性缺 O<sub>2</sub>
- D. 血液型缺 O<sub>2</sub>

正确答案：C

解析：低张性缺氧是因为吸入气体氧分压过低，外呼吸功能障碍，静脉血分流如动脉血造成，而吸氧可提高吸入气体氧分压，所以吸氧疗效最好。组织性缺氧是因为组织细胞利用氧障碍所致，需要提高组织细胞利用氧的能力，才能使缺氧缓解。循环性缺氧是因为组织血流量减少而使组织供氧量减少所致，应提高血流量方可缓解缺氧。血液性缺氧是因为血红蛋白数量减少或性质改变，造成血氧含量降低或血红蛋白结合的氧不易释放所致，所以应该及时补充血红蛋白数量或

提高血红蛋白携带氧的能力方可提高血氧浓度。

17. 成分输血时，不需要进行交叉配血试验的制剂是( )。

- A. 白细胞浓缩悬液
- B. 血小板浓缩悬液
- C. 冷冻血浆
- D. 洗涤红细胞

正确答案：C

解析：输注成分血时，除了血浆和清蛋白制剂之外，其他各种成分血在输入前均需进行交叉配血试验。

18. 女性患者导尿时，初步消毒后戴无菌手套、铺洞巾，再次消毒的顺序为( )。

- A. 尿道口-小阴唇-大阴唇
- B. 尿道口-小阴唇-尿道口
- C. 大阴唇-小阴唇-尿道口
- D. 小阴唇-尿道口-小阴唇

正确答案：B

19. 护理实践中，护士尊重患者自主权，首要的是患者能够( )。

- A. 知情同意
- B. 避免伤害
- C. 公平合理
- D. 受益最大

正确答案：A

20. 患者，男，55岁，左侧胸痛，坐位叩诊左下胸部闻及鼓音，最有可能是( )。

- A. 肺气肿
- B. 左侧气胸
- C. 胃泡音
- D. 胸腔积液

正确答案：C

21. 维持呼吸节律的基本中枢位于( )。

- A. 大脑皮层
- B. 中脑
- C. 脑桥
- D. 延髓

正确答案：D

22. 常规痰标本采取的护理措施，正确的是( )。

- A. 怀疑真菌感染需留取痰液 > 10ml
- B. 晨起漱口后深咳第一口痰
- C. 更换抗生素后留取
- D. 等渗盐水雾化吸入导痰

正确答案：B

解析：留取时间一般为晨起漱口之后，用力咳出呼吸道深处的第一口痰。

23. 人体应激性生理反应不包括( )。

- A. 心率加快
- B. 血压升高
- C. 免疫力提高
- D. 胃液分泌增加

正确答案：D

解析：人体在应激状态下，生理反应可出现心率加快、血压升高、免疫力短暂提高，胃液分泌量减少。

24. 下列癌症患者疼痛治疗用药，符合 WHO 推荐“三阶梯疗法”的是( )。

- A. 布洛芬+阿司匹林
- B. 曲马多+吗啡
- C. 哌替啶+二氢埃托啡
- D. 地西洋+氨酚待因

正确答案：B

解析：针对癌症患者疼痛治疗用药中的“三阶梯疗法”是：第一阶段用非阿片类药物，第二阶段用弱阿片类药物，第三阶段用强阿片类药物，药物的药效从低到高。所以符合该方法的只有 B 项，曲马多为非阿片类药物，吗啡为强阿片类药物。

25. 传染病区别于其他疾病的基本特征不包括( )。

- A. 每一种传染病都是由特异性病原体引起
- B. 病原体由宿主体内排出，经一定途径传染给另一宿主
- C. 传染病流行过程在自然和社会因素下，表现出统一特征
- D. 人体感染病原体后均能产生针对性的特异性免疫

正确答案：D

解析：传染病的基本特征是：每个传染病都有特异的病原体；病原体从一个宿主经传播途径传给另一个宿主；传染病具有在人群中传播蔓延的特征；人体受病原体感染后，部分患者可以产生针对性特异性免疫。

26. 患者，男，87岁，因上呼吸道感染伴发热住院，给予抗生素治疗，下列护理措施不正确的是( )。

- A. 避免长期卧床，鼓励适当活动
- B. 提供易消化、有营养、清淡饮食
- C. 护理操作过程中，应有意识的减慢速度
- D. 加强用药监护，防止出现延迟药物反应

正确答案：C

解析：护士在进行护理操作过程中，应注意动作规范和速度，避免拖拉。

27. 某一慢性呼吸衰竭患者，动脉血气分析结果为 PaO<sub>2</sub>55mmHg，PaCO<sub>2</sub>75mmHg，该型呼吸衰竭给氧原则是( )。

- A. 低浓度(<35%)持续吸氧
- B. 高浓度(>35%)持续吸氧
- C. 低浓度(<35%)间断吸氧
- D. 高浓度(>35%)间断吸氧

正确答案：A

解析：通过该患者的氧分压和二氧化碳分压，可得知该患者为二型呼吸衰竭，所以应进行低流量、低浓度持续性吸氧。

28. 肺癌的病因和发病机制尚未明确，一般认为与多种因素有关，其中导致肺癌死亡率进行性增加的首要原因是( )。

- A. 吸烟
- B. 电离辐射
- C. 职业致癌因子
- D. 空气污染

正确答案：A

29. 下列临床表现，不属于左心衰竭的是 ( )。

- A. 呼吸困难
- B. 肺部湿啰音
- C. 舒张期奔马律
- D. 颈静脉充盈

正确答案：D

解析：左心衰的临床表现主要为肺淤血表现，如患者出现呼吸困难，咳嗽、咳痰，肺部湿啰音。心脏听诊有舒张期奔马律。颈静脉充盈为右心衰竭的临床表现。

30. 胃癌发生的多因素中，被 WHO 认可的生物性致癌原是( )。

- A. 蜡状芽孢杆菌
- B. 志贺氏杆菌

- C. 沙门氏杆菌
- D. 幽门螺杆菌

正确答案：D

31. 小儿被猫、狗咬伤后，2天内需注射狂犬疫苗，注射部位是( )。
- A. 上臂外侧
  - B. 大腿前外侧
  - C. 前臂内侧
  - D. 臀部

正确答案：B

解析：狂犬疫苗一般选择上臂三角肌肌内注射，儿童应在大腿前外侧区肌内注射。

32. 患者临床诊断为肺炎，咳铁锈色痰，最有可能的致病菌是( )。
- A. 肺炎球菌
  - B. 绿脓杆菌
  - C. 葡萄球菌
  - D. 克雷伯杆菌

正确答案：A

解析：铁锈色痰是肺炎球菌性肺炎的典型特点。绿脓杆菌可产生绿色脓液，葡萄球菌可有黄色浓稠痰液，克雷伯杆菌感染可使患者出现胶冻样痰液。

33. 我国引起肝硬化最常见的原因是( )。
- A. 病毒性肝炎
  - B. 慢性酒精中毒
  - C. 血吸虫病
  - D. 药物毒性作用

正确答案：A

解析：在我国，肝硬化的主要原因是病毒性肝炎，其中最主要的是乙型病毒性肝炎。

34. 在预防脑血管疾病可干预因素中，针对各种脑卒中最重要独立性危险因素是( )
- A. 糖尿病
  - B. 高血压
  - C. 吸烟
  - D. 酗酒

正确答案：B

解析：在预防脑血管疾病的可干预性危险因素系指可以控制或治疗的危险因



素中，高血压是公认的脑血管病最重要的独立危险因素。血压越高，卒中风险就越大。高血压病人群的脑卒中危险性远高于正常人群。

35. 患者，男，45岁，肥胖体型，某公司高级职员，3年前诊断为糖尿病，无烟酒嗜好，该患者最需要预防的感染性并发症是( )。

- A. 皮肤感染
- B. 肺炎
- C. 膀胱炎
- D. 肾盂肾炎

正确答案：A

解析：皮肤出现细菌、真菌等致病性微生物的感染是糖尿病较早、较多出现的并发症。

36. 某女士，有高血压病史20年，清晨外出散步时突然出现心前区疼痛，表情痛苦地站在原地，某护士途径现场，应该采取的措施是( )。

- A. 扶病人就地坐下，呼叫120急救电话
- B. 让病人原地站立不动，活动上肢
- C. 让病人轻微活动，做深呼吸运动
- D. 就地进行心肺复苏，呼叫120急救电话

正确答案：A

解析：通过病史初步判断该患者可能发生了急性心肌缺血，此时应立即让患者就地休息，并立即呼叫120急救电话，及时送往医院进行确诊和救治。

37. 某县调查上年度死亡人数3194人，总死亡率千分之6.9，婴儿死亡率千分之8.3，其中新生儿死亡率千分之13.2，占婴儿死亡率的百分之53.8。关于占婴儿死亡率的百分之53.8的含义是( )。

- A. 该县新生儿死亡率
- B. 该县新生儿病死率
- C. 新生儿死亡占的比重
- D. 婴儿死亡占的比重

正确答案：C

38. 患者血钾浓度 $6.1\text{mmol/L}$ ，给予10%的葡萄糖酸钙，首要治疗作用是( )

- A. 拮抗钾离子对心肌的作用
- B. 纠正代谢性酸中毒
- C. 促进钾离子进入细胞内
- D. 降低血钾纠正低血钙

正确答案：A

解析：血钾浓度较高时可抑制心肌，降低心肌收缩力。此时给予10%的葡

葡萄糖酸钙可抑制高钾对心肌的抑制作用。

39. 不适宜从周围静脉输入的肠外营养制剂是( )。
- A. 葡萄糖
  - B. LCT
  - C. 混合脂肪乳剂
  - D. TP-MCT

正确答案：D

40. 患者，男，29岁，烧伤面积45%，其中III度烧伤面积18%，该患者48h内最严重的问题是( )。
- A. 疼痛
  - B. 感染
  - C. 休克
  - D. 出血

正确答案：C

解析：烧伤病人48小时内，因为大量皮肤组织被破坏，所以血浆大量的从血管内渗出，造成患者血容量减少，容易引起低血容量性休克。

41. 下列关于浅表组织化脓性感染的描述，不正确的是( )。
- A. 挤压危险三角区的疖，可致病菌侵入颅内
  - B. 唇痈可引起颅内化脓性海绵状静脉窦炎
  - C. 急性蜂窝织炎发生在皮下组织和肌肉组织
  - D. 乙型溶血性链球菌可致急性淋巴管炎

正确答案：C

解析：急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下、肌间隙或深部疏松结缔组织的急性、弥漫性、化脓性感染，一般不发生在肌肉组织。

42. 患者骑自行车不慎摔倒，头部受到创伤，意识丧失，15分钟后清醒，感到头痛、头昏，记不起刚发生的事情，该患者最有可能发生了( )。
- A. 脑挫伤
  - B. 脑震荡
  - C. 脑水肿
  - D. 脑出血

正确答案：B

解析：该患者意识障碍的时间<30分钟，清醒后有逆行性遗忘，所以可判断该患者为脑震荡。

43. 患者创伤后急诊入院，经抢救仍处于昏迷状态。遵医嘱给予50%的葡萄糖溶液500ml静脉滴入，其首要目的是( )。

- A. 稀释血液，降低血液黏度
- B. 补充体液，供给热量
- C. 纠正酸中毒，补充营养
- D. 脱水利尿，防止脑水肿

正确答案：D

解析：50%的葡萄糖溶液为高渗性溶液，可有渗透性利尿的效果，对于可疑脑损伤的患者，可防止脑水肿。

44. 食管癌术后发生吻合口瘘，其中与解剖结构有关的因素是因为食管缺乏( )。

- A. 黏膜下层
- B. 黏膜层
- C. 外膜层
- D. 浆膜层

正确答案：D

解析：食管的解剖结构包括黏膜层、黏膜下层、肌层和外膜层。食管无浆膜层，是术后易发生吻合口瘘的因素之一。

45. 患者，女性，因急性阑尾炎入院，拟在硬脊膜外麻醉下行阑尾切除术。入院评估时，发现病人存在甲亢症状和体征，血 T3、T4 升高。该病人麻醉前用药，应避免使用( )。

- A. 苯巴比妥钠
- B. 阿托品
- C. 异丙嗪
- D. 地西洋

正确答案：B

解析：阿托品可抑制腺体分泌，并有加快心率的作用，而甲亢的患者体温较高，代谢速度较快，心率较快，所以不宜使用阿托品，以免引起心动过速。

46. 腹部手术病人，术后第二天不宜下床活动的是( )。

- A. 门静脉高压分流术后病人
- B. 肠粘连分离术后病人
- C. 腹腔镜胆囊切除术后病人
- D. 阑尾切除术后病人

正确答案：A

解析：腹部术后大多数的患者均应该及早下床活动，但是门静脉高压分流术的患者不可，防止患者出现大出血。

47. 患者，男，因外伤性肝破裂并失血性休克入院，以下护理措施不正确的是( )。

- A. 安置休克体位，给予氧气吸入
- B. 建立两条以上静脉通路
- C. 进行 cvp 监测
- D. 用热水袋给病人保暖

正确答案：D

解析：休克的患者禁止使用热水袋等局部加热的方法，防止外周皮肤血管扩张而致回心血量减少。加重休克。

48. 肛裂的临床表现不包括( )。

- A. 慢性便秘
- B. 大便表面带鲜血
- C. 排便时肛门疼痛
- D. 肛门脱出肿块

正确答案：D

解析：长期便秘、粪便干结引起排便时的机械性创伤是肛裂形成的直接原因，最主要的症状是排便时及排便后肛门部疼痛，粪便表面或手纸上可见少量鲜血。肛门脱出肿块多见于痔或直肠息肉等疾病。

49. 下列小脑幕切迹疝的临床表现，具有特征性意义的是( )。

- A. 患侧瞳孔先缩小再散大
- B. 持续颅内压升高
- C. 对侧肢体瘫痪
- D. 意识障碍进行性加重

正确答案：A

解析：小脑幕切迹疝典型的临床表现是在颅内压增高的基础上，出现进行性意识障碍，患侧瞳孔最初有短暂的缩小，但多不易被发现，以后逐渐散大，直接或间接对光反射消失。

50. 静脉注射过程中，注射部位皮肤肿胀、有痛感，试抽有回血，可能的原因是( )。

- A. 静脉痉挛
- B. 针头刺入皮下
- C. 针头斜面一半在血管外
- D. 针头斜面紧贴血管壁

正确答案：C

解析：静脉注射部位肿胀、有痛感，说明液体进入组织间隙，另一方面试抽有回血说明针头在血管内，综合两方面的因素可知，可能发生了针头斜面一半在血管内，一半在血管外。

多项选择题

51. 护患关系中造成积极还是消极影响取决于护理人员，主要影响源有( )。

- A. 语言
- B. 行为举止
- C. 情绪
- D. 理论知识

正确答案：A,B,C

52. 护士记录病人资料符合要求的有( )。

- A. 收集资料后需及时记录
- B. 描述资料的词语应确切
- C. 内容要正确反映病人的问题
- D. 客观资料应尽量用病人的语言

正确答案：A,B,C

解析：客观资料是指通过观察、会谈、体格检查和实验室检查等方法获得的有关服务对象健康状况的资料，如口唇发绀、外阴皮肤黏膜充血、血压升高、体重下降等。主观资料指的是服务对象对自己健康状况的认知和体验，包括其知觉、情感、价值、信念、态度、对个人健康状况和生活状况的感知，例如病人描述“头晕”、“胸闷”、“我感觉越来越疼”、“我有些害怕”等。所以，D选项病人的语言是主观资料。

53. 使用约束带时应注意( )。

- A. 带下需垫衬垫，松紧适宜
- B. 注意观察约束部位的末梢循环及温度
- C. 只宜短期使用
- D. 定时松解，必要时按摩

正确答案：A,B,C,D

54. 护理人员铺床时两腿前后分开稍屈膝、上身直立是为了( )。

- A. 扩大支撑面
- B. 增加身体稳定性
- C. 姿势优美
- D. 省力

正确答案：A,B,D

55. 下列选项中，促进病人休息的护理措施有( )。

- A. 尊重病人休息习惯
- B. 做好心理护理，解除病人焦虑
- C. 各种诊疗护理活动相对集中

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/396024100033010044>