

2024 年北京市延庆区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题内部题库带答案 (综合题)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 对于急性红斑、水疱可选择的剂型不包括

- A: 油剂
- B: 乳膏剂
- C: 洗剂
- D: 粉剂

答案: B

2. 患者，男，56 岁。有糖尿病病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl。

- A: 格列齐特
- B: 正规胰岛素
- C: 三碘甲状腺原氨酸
- D: 珠蛋白锌胰岛素

答案: B

3. 复方氨基酸注射液 (6AA) 与等量 10% 葡萄糖注射液稀释后缓慢静脉滴注，滴速为

- A: 滴速 20~30 滴 / 分
- B: 不超过 40 滴 / 分
- C: 不超过 15 滴 / 分

D: 滴速 80~100 滴 / 分

答案: B

4. 下述质子泵抑制剂中对氯吡格雷疗效影响最小的是

A: 泮托拉唑

B: 奥美拉唑

C: 右兰索拉唑

D: 埃索美拉唑

答案: C

5. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是

A: 多索茶碱

B: 泼尼松龙

C: 羧甲司坦

D: 左氧氟沙星

答案: C

6. 主要降三酰甘油的药物的是

A: 胍乙啶

B: 普萘洛尔

C: 硝酸甘油

D: 阿昔莫司

答案: D

7. (2017 年真题) 可能引起中性粒细胞减少的药物 ()

A: 鲨肝醇

B: 丙硫氧嘧啶

C: 左甲状腺素

D: 碘，碘化物

答案：B

8. 仅用于绝经后妇女，不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是

A: 阿仑膦酸钠

B: 骨化三醇

C: 雷洛昔芬

D: 降钙素

答案：C

9. 属于润滑性泻药的是

A: 酚酞

B: 聚乙二醇 4000

C: 甘油（开塞露）

D: 乳果糖

答案：C

10. 长期大量使用林旦后可导致下列哪种不良反应

A: 眼部水肿

B: 中枢神经系统毒性

C: 白细胞增高

D: 白细胞减少

答案：B

11. 低剂量可提供接近全效的降压作用的是

A: 氨苯蝶啶

B: 螺内酯

C: 氢氯噻嗪

D: 阿米洛利

答案: C

12. 放线菌素 D 的主要作用环节在

A: G0 期

B: M 期

C: G1 期

D: S 期

答案: C

13. 阻断白三烯受体,起效缓慢,作用较弱,仅适用于轻、中度哮喘和哮喘稳定控制的药物是 ()

A: 氟替卡松

B: 茶碱

C: 沙美特罗

D: 孟鲁司特

答案: D

14. 关于丙硫氧嘧啶的描述, 正确的是

A: 作用较甲巯咪唑弱

B: 长期应用反馈抑制 TSH 分泌

C: 使血循环中甲状腺刺激性免疫球蛋白升高

D: 可抑制外周组织的 T

答案: A

15. 以下使用雌激素类药物的方法错误的是

A: 女性子宫切除后患者采用周期性治疗, 即用药 3 周后停药 1 周

- B: 应用最低有效量，时间尽可能缩短，以减少可能发生的不良反应
- C: 男性患者采用周期性治疗。即用药 3 周后停药 1 周
- D: 有子宫的女性在周期的最后 5~7 日加用孕激素

答案：D

16. 患者首次使用西妥昔单抗，为减轻其不良反应常规预处理使用的药物是（）

- A: 抗组胺类药物
- B: 维生素类药物
- C: 质子泵抑制剂
- D: 化疗止吐类药物

答案：A

17. 患者。女，43 岁，左乳浸润性导管癌术后放、化疗 3 年后复发左肺门、左锁骨上、左腋窝淋巴结转移现采用卡培他滨+多西他赛行复发后第一周期化疗化疗后第 2 日，患者出现重度恶心、呕吐，根据化疗药物致吐分级，宜选用的对症洽疗药物是（）

- A: 奥美拉唑
- B: 地塞米松
- C: 昂丹司琼
- D: 甲氧氯普胺

答案：C

18. 糖尿病选用

- A: 格列齐特
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 大剂量碘剂
- D: 放射性碘

答案：A

19. 青霉素()

- A: 特别对铜绿假单胞菌有效
- B: 对 G
- C: 抗菌作用强，对厌氧菌有效
- D: 对 G

答案：D

20. 在抗血小板药中，阿司匹林属于()。

- A: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: 环氧酶抑制剂
- D: 整合素受体阻断剂

答案：C

21. 患者，男，58 岁。最近出现多饮、多尿和体重下降等不正常身体状况就诊，检查发现血糖高，诊断为 2 型糖尿病，轻度心功能不全，医嘱选择磺酰脲类促胰岛素分泌药治疗。

- A: 格列本脲
- B: 格列喹酮
- C: 格列齐特
- D: 格列美脲

答案：A

22. 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而引起抗抑郁作用的药物是()

- A: 度洛西汀
- B: 帕罗西汀

C: 吗氯贝胺

D: 马普替林

答案: B

23. 可直接中和胃酸，发挥快速、持久的抗酸作用，且有平衡肠动力作用，不易导致便秘和腹泻不良反应的是

A: 碳酸钙

B: 三硅酸镁

C: 氢氧化铝

D: 铝碳酸镁

答案: D

24. 患者，女，54 岁。患风湿性二尖瓣关闭不全多年，用地高辛和氢氯噻嗪维持治疗。但近日呼吸困难加重，夜间频繁发作，心慌，两肺满肺野湿性啰音，经检查左室舒张期充盈压明显升高。除上述药物外，该加用哪种药物进行治疗()

A: 多巴胺

B: 米力农

C: 硝普钠

D: 氨力农

答案: C

25. (2016 年真题) 某些慢性疾病使用泼尼松长期治疗，为减少外源性激素对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制，推荐的给药时间是

A: 晚餐前

B: 下午 4 时左右

C: 中午 12 时左右

D: 上午 8 时左右

答案：D

26. 治疗各种类型的癫痫选用

- A: 多奈哌齐
- B: 丙戊酸钠
- C: 佐匹克隆
- D: 布桂嗪

答案：B

27. 痛风缓解期，抑制内源性尿酸生成的药物是

- A: 苯溴马隆
- B: 秋水仙碱
- C: 碳酸氢钠
- D: 非布司他

答案：D

28. （2017 年真题）属于抗孕激素类药,用于终止早孕的药物是（）

- A: 左炔诺孕酮
- B: 甲地孕酮
- C: 黄体酮
- D: 米非司酮

答案：D

29. 属于头孢一代的是

- A: 头孢曲松
- B: 拉氧头孢
- C: 头孢唑林
- D: 头孢呋辛

答案：C

30. 关于肝素和低分子肝素作用特点的说法，错误的是

- A: 皮下给药，低分子肝素的生物利用度接近 100%
- B: 肝素与低分子肝素相比，起效快失效也快德收育
- C: 肝素与低分子肝素均可使用硫酸鱼精蛋白迅速逆转抗凝作用
- D: 低分子肝素抗凝作用维持时间较长，可以一日 1 次或 2 次给药

答案：C

31. 糖皮质激素诱发或加重感染的主要原因是()

- A: 抑制机体的免疫功能
- B: 激素用量不足，无法控制症状
- C: 患者对激素不敏感，未反映出相应的疗效
- D: 激素促使许多病原微生物繁殖

答案：A

32. 磷酸二酯酶抑制剂的机制

- A: 抑制纤维蛋白原与血小板膜表面糖蛋白受体的结合
- B: 抑制血小板表面的 ADP 受体
- C: 抑制葡萄糖脱氢酶
- D: 使血小板内 cAMP 浓度增高而产生抗血小板作用

答案：D

33. 可用于治疗肝性脑病的药物是

- A: 欧车前
- B: 番泻叶
- C: 多库酯钠
- D: 利那洛肽

答案：D

34. 福莫特罗的平喘作用维持时间是

- A: 3~5 分钟
- B: 4~6 小时
- C: 10~12 小时
- D: 10~20 分钟

答案：C

35. 复方左炔诺孕酮片、去氧孕烯炔雌醇片、复方孕二烯酮片均含有的成分是

- A: 甲羟孕酮和炔雌醇
- B: 去氧孕烯
- C: 维生素 B6
- D: 炔雌醇

答案：D

36. (2019 年真题) 注射用奥沙利铂的溶媒选择要求是 ()

- A: 先用乳酸钠注射液溶解，再用氯化钠注射液或 5%葡萄糖注射液进一步稀释
- B: 先用氯化钠注射液溶解，再用 5%葡萄糖注射液进一步稀释
- C: 氯化钠注射液稀释
- D: 5%葡萄糖注射液稀释

答案：D

37. 可致细胞膜通透性增加，细菌膨胀、溶解死亡的药物是

- A: 环丙沙星
- B: 多黏菌素

C: 替加环素

D: 庆大霉素

答案: B

38. 很少单独缺乏，常伴其他维生素缺乏，大量服用可使尿液变黄，该物质是

A: 维生素 AD

B: 维生素 B₂

C: 精氨酸

D: 维生素 C

答案: B

39. 属于还原酶抑制剂的是()

A: 坦洛新

B: 他达拉非

C: 西地那非

D: 度他雄胺

答案: D

40. (2016 年真题) 可用于习惯性流产的药品是

A: 依普黄酮

B: 他莫昔芬

C: 戊酸雌二醇

D: 地屈孕酮

答案: D

41. 具有耳毒性的是()

A: 氨基蝶啶

- B: 螺内酯
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋塞米

答案：D

42. 因抑制 P-糖蛋白使地高辛浓度增加 70%~100%的是

- A: 胺碘酮
- B: 克拉霉素
- C: 呋塞米
- D: 硫酸镁

答案：A

43. 不作为高血压治疗的首选药，临床适用于伴前列腺增生症的高血压患者或与其他药物联合用于顽固性高血压治疗的药物是()

- A: 特拉唑嗪
- B: 甲基多巴
- C: 肾素抑制剂
- D: 可乐定

答案：A

44. 全身性红斑狼疮宜用

- A: 地塞米松
- B: 氢化可的松
- C: 泼尼松
- D: 倍他米松

答案：C

45. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，口服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 埃索美拉唑
- B: 硝苯地平缓释片
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 克拉霉素

答案：A

46. 单纯疱疹病毒感染的首选药是

- A: 干扰素
- B: 碘苷
- C: 阿昔洛韦
- D: 金刚烷胺

答案：C

47. （2021 年真题）常与 ACEI 联用，在协同降压的同时，兼具防治高钾血症的中效利尿剂是（）

- A: 氢氯噻嗪
- B: 螺内酯
- C: 甘油果糖
- D: 乙酰唑胺

答案：A

48.（2019 年真题）服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险，为降低此风险，应采取的措施是（）

- A: 不推荐 65 岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防
- B: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用
- C: 使用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染
- D: 应长期合用质子泵抑制剂

答案：C

49.（2018 年真题）可导致视神经炎和血尿酸升高的药物是（）

- A: 乙胺丁醇
- B: 对氨基水杨酸
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

答案：A

50. 下列关于 5α -还原酶抑制剂的描述，错误的是（）

- A: 作用是不可逆的
- B: 与 $\alpha 1$ 受体阻断药相比，更易引起性功能障碍
- C: 对膀胱颈和平滑肌没有作用
- D: 可引起前列腺上皮细胞萎缩

答案：A

51. 抑制磷酸二酯酶而加强心肌收缩力的药物是（）

- A: 米力农
- B: 地高辛
- C: 毛花苷丙

D: 螺内酯

答案：A

52. 丙烯胺类抗真菌药()

A: 特比萘芬

B: 两性霉素

C: 氟康唑

D: 阿莫罗芬

答案：A

53. 氨曲南的作用特点不包括

A: 血浆半衰期较短

B: 低毒，与青霉素类及头孢菌素类无交叉过敏

C: 时间依赖性抗菌药物

D: 可用于治疗脑膜炎

答案：D

54. 下列不属于凝血因子 X 抑制剂的是

A: 利伐沙班

B: 磺达肝癸钠

C: 华法林

D: 阿哌沙班

答案：C

55. 不属于升白细胞药物的是

A: 非格司亭

B: 重组人促红素

C: 肌苷

D: 粒细胞集落刺激因子

答案：B

56. 患者，女 52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片每日 1 次，每次 2mg。

A: 白带增多

B: 突破性出血

C: 体重增加

D: 乳房触痛或增大

答案：B

57. 抑制胃酸分泌作用最强的药物是

A: 西咪替丁

B: 雷尼替丁

C: 尼扎替丁

D: 奥美拉唑

答案：D

58. 长期大量服用维生素 K

A: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

B: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

C: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

D: 视物模糊、疲乏、乳腺肿大

答案：D

59. 甲氧苄啶与磺胺合用是因为

- A: 双重阻断细菌的叶酸代谢
- B: 相互对抗不良反应
- C: 减少泌尿道损害
- D: 抗菌谱相似

答案：A

60. 阿托品对眼部的作用特点是()

- A: 扩瞳，降低眼压
- B: 缩瞳，降低眼压
- C: 缩瞳，调节麻痹
- D: 扩瞳，调节麻痹

答案：D

61. 与瑞格列奈无药物相互作用的是

- A: 克拉霉素
- B: 伊曲康唑
- C: 环孢素
- D: 吉非贝齐

答案：A

62. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

- A: 胺碘酮
- B: 普萘洛尔
- C: 地尔硫革
- D: 美西律

答案：B

63. 属于 PDE5 抑制剂的禁忌人群的是

- A: 高血压未得到控制者
- B: 中度的充血性心力衰竭
- C: 2 周前发生过心肌梗死或脑卒中
- D: 轻度、稳定型心绞痛

答案：A

64. 长期大量服用维生素 A 会出现

- A: 视物模糊、疲乏、乳腺肿大
- B: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- C: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- D: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

答案：D

65. 服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险为降低此风险,应采取的措施是 ()

- A: 不推荐 65 岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防
- B: 应长期合用质子泵抑制剂
- C: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用
- D: 用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染

答案：D

66. 仅对浅表真菌感染有效的药物 ()

- A: 伊曲康唑
- B: 灰黄霉素
- C: 两性霉素 B
- D: 氟康唑

答案：B

67. (2019 年真题) 选择性沉积在牙齿和骨骼中，不可用于 8 岁以下患儿的药物是 ()

- A: 四环素类
- B: 氟喹诺酮类
- C: 氨基糖苷类
- D: 大环内酯类

答案：A

68. 阿片类药物可影响患者驾驶能力属于

- A: 便秘、恶心、镇静功能受损
- B: 身体和精神依耐性
- C: 尿频、尿急、尿潴留
- D: 认知障碍

答案：D

69. 煤焦油治疗银屑病的作用机制是

- A: 与维 A 酸细胞核受体有较高亲和力
- B: 可抑制表皮细胞的有丝分裂，使皮肤增生速率恢复正常
- C: 通过角蛋白表达正常化，促进角朊细胞末端分化
- D: 能抑制皮肤角质形成细胞的过度增生和诱导其分化，从而使银屑病表皮细胞的增生和分化得到纠正

答案：B

70. 用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的 2 型糖尿病的降糖药物是

- A: 罗格列酮
- B: 阿卡波糖

C: 格列本脲

D: 二甲双胍

答案: D

71. 可降低同型半胱氨酸水平的维生素是

A: 维生素 B

B: 泛酸钙

C: 烟酸

D: 叶酸

答案: D

72. 患者，男，25 岁。上腹灼痛、反酸，疼痛多出现在早上 10 点及下午 4 点左右，有时夜间痛醒，进食后缓解。X 线钡餐检查：十二指肠溃疡。

A: 哌仑西平和西咪替丁

B: 阿莫西林和四环素

C: 米索前列醇和四环素

D: 兰索拉唑和阿莫西林

答案: D

73. 哌唑嗪常见的不良反应是

A: 钠水潴留

B: 降压效应减弱

C: 首剂量低血压反应

D: 口干、便秘、发热

答案: C

74. 服用抗帕金森病药恩他卡朋的患者，其尿液可变成

- A: 淡绿色
- B: 深蓝色
- C: 蓝绿色
- D: 红棕色

答案：D

75. 仅在体内有凝血作用的药物是

- A: 噻氯匹啶
- B: 华法林
- C: 肝素
- D: 尿激酶

答案：B

76. (2021 年真题) 可用于治疗蛔虫病、蛲虫病、钩虫病和鞭虫病的广谱驱虫药物是 ()

- A: 乙胺嗪
- B: 甲硝唑
- C: 甲苯咪唑
- D: 氯硝柳胺

答案：C

77. 下列药物组合有协同作用的是

- A: 青霉素+螺旋霉素
- B: 青霉素+庆大霉素
- C: 青霉素+氯霉素
- D: 青霉素+四环素

答案：B

78. 多柔比星

- A: 影响蛋白质合成和功能
- B: 直接破坏 DNA 结构和功能
- C: 干扰 RNA 转录
- D: 干扰核酸生物合成

答案：C

79. (2015 年真题) 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是 ()。

- A: 血管内皮生长因子
- B: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原
- C: 表皮生长因子受体
- D: 人表皮生长因子受体-2

答案：D

80. 使用铁制品煎煮酸性食物

- A: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退
- B: 细胞缺氧、酸中毒、休克
- C: 过敏反应
- D: 锥体外系反应

答案：B

81. 氯吡格雷临床应用

- A: 缺铁性贫血
- B: 失去药效
- C: 缺血性脑卒中
- D: 急性中性粒细胞减少症

答案：C

82. 患者，男，5 岁，体重 25kg，有癫痫病史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗。查体和实验室检查：白细胞计数 $15.8 \times 10^9 / L$ ，体温 $39.5^\circ C$ ，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次 $20mg / kg$)

- A: 地西泮
- B: 乙琥胺
- C: 左乙拉西坦
- D: 丙戊酸钠

答案：D

83. 属于黏痰溶解剂，适用于大量痰液堵塞气管导致呼吸困难的祛痰药物是

- A: 溴己新
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 氨溴索
- D: 糜蛋白酶

答案：B

84. 主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

- A: 吲哚美辛
- B: 阿司匹林
- C: 塞来昔布
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

85. 用于治疗鼓膜未穿孔的急性中耳炎、外耳道炎的药品是()。

- A: 苯酚溶液

- B: 过氧乙酸溶液
- C: 高锰酸钾溶液
- D: 酚甘油滴耳液

答案：D

86. 下列氟喹诺酮类抗菌药物中，原形从肾脏排泄率最高的是

- A: 氧氟沙星
- B: 诺氟沙星
- C: 氟罗沙星
- D: 环丙沙星

答案：A

87. 可导致凝血酶原时间延长的是

- A: 替硝唑+苯巴比妥
- B: 奥硝唑+乙醇
- C: 甲硝唑+乙醇
- D: 替硝唑+华法林

答案：D

88. (2019 年真题) 依托泊苷注射液的溶媒选择要求是 ()

- A: 氯化钠注射液稀释
- B: 5%葡萄糖注射液稀释
- C: 先用乳酸钠注射液溶解，再用氯化钠注射液或 5%葡萄糖注射液进一步稀释
- D: 先用氯化钠注射液溶解，再用 5%葡萄糖注射液进一步稀释

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

89. 司来吉兰用于

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/396052205102011030>