

2024 年河北省临漳县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库大全 a4 版可打印

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2015 年真题）易导致血糖异常的药品是（ ）。

- A: 头孢哌酮
- B: 加替沙星
- C: 庆大霉素
- D: 多西环素

答案：B

2. （2015 年真题）可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是（ ）。

- A: 复方碘口服液
- B: 甲巯咪唑片
- C: 卡比马唑片
- D: 甲状腺片

答案：B

3. 抗酸作用较弱而慢，但持久，对溃疡面有保护作用

- A: 碳酸钙
- B: 氢氧化镁
- C: 三硅酸镁
- D: 氢氧化铝

答案：C

4. 每 1mg 硫酸鱼精蛋白可中和肝素约

A: 1000U

B: 1U

C: 10U

D: 100U

答案：D

5. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

A: 惊厥

B: 血压下降

C: 支气管痉挛

D: 心律失常

答案：D

6. 与氢氯噻嗪不存在交叉过敏反应的是

A: 依他尼酸

B: 呋塞米

C: 磺胺类药

D: 布美他尼

答案：A

7. 以上属于阿片类药物轻度戒断症状的是

A: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐

B: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏

C: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗

D: 惊厥、震颤、反射加速、发热

答案：C

8. 避免同时使用“蜡质”脱毛方法的药物()

- A: 维 A 酸
- B: 阿达帕林
- C: 壬二酸
- D: 异维 A 酸

答案：B

9. 肾病综合征采用

- A: 糖皮质激素一般剂量长期疗法
- B: 糖皮质激素大剂量冲击疗法
- C: 糖皮质激素小剂量代替疗法
- D: 抗结核病药与糖皮质激素合用

答案：A

10. 治疗良性前列腺增生症宜选用

- A: 托特罗定
- B: 坦洛新
- C: 尼莫地平
- D: 利血平

答案：B

11. 吸收后代谢成活性产物而发挥抗甲型和乙型流感病毒的前体药物是
()

- A: 金刚乙胺
- B: 奥司他韦
- C: 扎那米韦
- D: 金刚烷胺

答案：B

12. 噻嗪类利尿药中，属于水溶性的药物是()

- A: 苻噻嗪
- B: 氢氟噻嗪
- C: 氢氯噻嗪
- D: 氯噻嗪

答案：D

13. 发热需采用非甾体抗炎药时，应首选

- A: 阿司匹林
- B: 双氯芬酸
- C: 布洛芬
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

14. 其他 β -内酰胺类抗生素的主作用靶位是

- A: 细菌核蛋白体 50S 亚基
- B: 细菌胞浆膜上特殊蛋白 PBPs
- C: 二氢叶酸合成酶
- D: DNA 螺旋酶

答案：B

15. 可用于骨和关节感染的药物是()

- A: 林可霉素
- B: 万古霉素
- C: 四环素
- D: 青霉素

答案：A

16. 具有抗炎作用的他汀类调血脂药是

- A: 普伐他汀
- B: 阿伐他汀
- C: 藻酸双酯钠
- D: 氟伐他汀

答案：A

17. (2020 年真题) 可改善心肌缺血症状，但高磷血症患者禁用的药物是

- A: 门冬氨酸钾镁注射液
- B: 二磷酸果糖注射液
- C: 乳酸钠注射液
- D: 葡萄糖注射液

答案：B

18. 咳嗽伴有较多痰液时需要合用

- A: 氨溴索
- B: 沙丁胺醇
- C: 喷托维林
- D: 噻托溴铵

答案：A

19. 对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是

- A: 长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂
- B: 长效 β_2 受体激动剂+长效 M 胆碱受体阻断剂
- C: 吸入性糖皮质激素+长效 β_2 受体激动剂

D: 吸入性糖皮质激素+短效 M 胆碱受体阻断剂

答案：C

20. 组胺 H

A: 肠激惹综合征

B: 失眠

C: 变态反应性疾病

D: 消化性溃疡

答案：D

21. 急性心肌梗死引起的室性心律失常有效，对室上性心律失常基本无效的药物是

A: 胺碘酮

B: 利多卡因

C: 苯妥英钠

D: 地高辛

答案：B

22. (2017 年真题) 具有磺胺类药物结构, 作用于近曲小管的利尿药是 ()

A: 乙酰唑胺

B: 呋达帕胺

C: 氢氯噻嗪

D: 螺内酯

答案：A

23. 下列药物使用期间需要缓慢停药的是

A: 比索洛尔

- B: 地尔硫?
- C: 氨氯地平
- D: 依那普利

答案: A

24. 对贝特类（苯氧芳酸类）的叙述正确的是

- A: LDL-CC 主要用于原发性高胆固醇血症
- B: 可降低 HDL-C
- C: 能明显降低血浆 TG
- D: 可升高 T

答案: C

25. 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是（）。

- A: 可待因
- B: 氯化铵
- C: 苯丙哌林
- D: 右美沙芬

答案: C

26. 治疗立克次体感染选用

- A: 庆大霉素
- B: 红霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 多西环素

答案: D

27. 可竞争肝药酶 CYP2C9、CYP2C19 而影响氯吡格雷代谢为有活性的产物，降低氯吡格雷的疗效，因此正在使用氯吡格雷的患者应避免合用

- A: 雷贝拉唑
- B: 法莫替丁
- C: 奥美拉唑
- D: 泮托拉唑

答案：C

28. 严格控制用药剂量和用药时间可以避免产生

- A: 副作用
- B: 变态反应
- C: 毒性反应
- D: 继发反应

答案：C

29. 非麻醉性镇痛药中属于中枢性镇痛药的是

- A: 秋水仙碱
- B: 布洛芬
- C: 曲马多
- D: 吗啡

答案：C

30. 长期大剂量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，应注意适当补充

- A: 维生素 A 和维生素 D
- B: 维生素 E 和叶酸
- C: 维生素 B 和维生素 K
- D: 维生素 C 和烟酸

答案：C

31. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 托拉塞米
- C: 氨苯蝶啶
- D: 乙酰唑胺

答案：B

32. (2015 年真题) 哮喘急性发作应用平喘药，最适宜的给药途径是 ()。

- A: 肌肉注射
- B: 静脉滴注
- C: 吸入给药
- D: 口服给药

答案：C

33. 加重洋地黄中毒的易感因素为

- A: 甲状腺功能减退症
- B: 低镁血症
- C: 低钾血症
- D: 伴有房颤的心功能不全

答案：A

34. 作用机制是抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的药物是 ()

- A: 异烟肼
- B: 阿莫西林
- C: 红霉素
- D: 氧氟沙星

答案：D

35. (2020 年真题) 用于散瞳的眼用药物是

- A: 毛果芸香碱
- B: 溴莫尼定
- C: 噻吗洛尔
- D: 复方托吡卡胺

答案: D

36. 可导致新生儿药物性黄疸的是

- A: 头孢他啶
- B: 林可霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 阿莫西林

答案: C

37. 治疗流行性细菌性脑膜炎最合适的联合用药是()

- A: 青霉素+磺胺嘧啶
- B: 青霉素+链霉素
- C: 青霉素+克林霉素
- D: 青霉素+四环素

答案: A

38. 袢利尿药中，最易引起耳毒性，且可发生永久性耳聋的药物是()

- A: 呋塞米
- B: 依他尼酸
- C: 托拉塞米
- D: 布美他尼

答案: B

39. (2019 年真题) 患者，女，36 岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午 10 点及下午 4 点，有时夜间痛醒，进食后缓解，X 线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是 ()

- A: 甲氧氯普胺
- B: 颠茄
- C: 奥美拉唑
- D: 多潘立酮

答案：C

40. 对四环素不敏感的病原体是 ()

- A: 肺炎衣原体
- B: 螺旋体
- C: 肺炎支原体
- D: 铜绿假单胞菌

答案：D

41. (2018 年真题) 低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐，宜选用的止吐治疗方案是 ()

- A: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- B: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- C: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- D: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药

答案：D

42. 患者，女，63 岁。急性心肌梗死行经皮冠状动脉介入 (PCI) 治疗，术后为预防支架内血栓形成，常与阿司匹林联合使用的药物是

- A: 华法林
- B: 奥美拉唑
- C: 双氯芬酸
- D: 氯吡格雷

答案：D

43. 属于 β 受体阻断剂，对正常人血压影响不明显，而对高血压患者具有降压作用的降压药是()

- A: 美托洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 利血平
- D: 硝苯地平

答案：A

44. α 肾上腺素受体分布占优势的效应器是

- A: 肾血管
- B: 骨骼肌血管
- C: 冠状血管
- D: 皮肤黏膜血管

答案：D

45. 下列关于碘苷说法错误的是

- A: 可延缓角膜上皮创伤愈合
- B: 可用于单纯疱疹性角膜炎
- C: 皮肤疾病可长期用药
- D: 可用于疱疹性脑膜炎

答案：C

46. 患者，男，25 岁。咽炎，注射青霉素后 1 分钟呼吸急促、面部发绀，心率 130 次/分，血压 60/40mmHg。

- A: 青霉素的降解产物诱导机体发生变态反应
- B: 青霉素促进机体释放组胺、白三烯等致敏原
- C: 青霉素加速抗原抗体结合
- D: 青霉素本身诱导机体发生变态反应

答案：A

47. (2018 年真题) 属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是 ()

- A: 低精蛋白锌胰岛素
- B: 甘精胰岛素
- C: 地特胰岛素
- D: 普通胰岛素

答案：D

48. 金刚烷胺与多潘立酮合用

- A: 可增加抗胆碱不良反应的危险
- B: 增加锥体外系不良反应的风险
- C: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)
- D: 增加肾毒性

答案：B

49. 戈那瑞林属于

- A: 促性腺激素
- B: 短效口服避孕药
- C: 雌激素类
- D: 促性腺激素释放激素类似物

答案：D

50. 抑酸剂泮托拉唑长期应用可引起的典型不良反应是

- A: 定向力障碍
- B: 血尿酸升高
- C: 低镁血症
- D: 血糖升高

答案：C

51. (2015 年真题) 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是 ()。

- A: 血管内皮生长因子
- B: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原
- C: 表皮生长因子受体
- D: 人表皮生长因子受体-2

答案：D

52. 下列可用于治疗哮喘的是

- A: 氯苯那敏
- B: 氮革斯汀
- C: 氯雷他定
- D: 孟鲁司特

答案：D

53. 与青霉素相比，阿莫西林 ()

- A: 对革兰阳性细菌的抗菌作用强
- B: 对 β -内酰胺酶稳定
- C: 对革兰阴性杆菌作用强
- D: 对耐药金黄色葡萄球菌有效

答案：C

54. (2021 年真题) 可致超敏反应综合征 (AHS)，推荐用药前做 HLA-B*5801 基因筛查的抗痛风药物是 ()

- A: 秋水仙碱
- B: 苯溴马隆
- C: 别嘌醇
- D: 非布司他

答案：C

55. 以上药物与肝素合用，不会增加出血风险的是

- A: 吲哚美辛
- B: 塞来昔布
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

56. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: 短效 B₂ 受体激动剂
- C: 吸入性糖皮质激素
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：B

57. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵 (+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 输血+注射右旋糖酐铁
- B: 驱钩虫+注射右旋糖酐铁

C: 驱钩虫+口服铁剂

D: 驱钩虫+亚叶酸钙

答案：C

58. 口服首过消除明显，常舌下给药的是

A: 硝酸甘油

B: 普萘洛尔

C: 胍乙啶

D: 阿昔莫司

答案：A

59. 易引起刺激性干咳的抗高血压药是()

A: 非洛地平

B: 阿托伐他汀

C: 厄贝沙坦

D: 卡托普利

答案：D

60. 主要经胆汁排泄(仅有 5%左右经肾排泄)，可用于肾功能轻中度不全患者的磺酰脲类药物是()

A: 格列齐特

B: 格列美脲

C: 格列喹酮

D: 格列吡嗪

答案：C

61. 与细菌核糖体的 30S 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成的是()

A: 四环素

B: 林可霉素

C: 万古霉素

D: 青霉素

答案：A

62. (2016 年真题) 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

A: 他莫昔芬

B: 托瑞米芬

C: 乙烯雌酚

D: 氟他胺

答案：D

63. 与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

A: 利福平

B: 四环素

C: 苯巴比妥

D: 环孢素

答案：D

64. 患者，男，22 岁，诊断为风湿热，可选用

A: 阿莫西林

B: 双氯西林

C: 苜星青霉素

D: 万古霉素

答案：C

65. 抑制细菌叶酸合成的抗菌药物是

- A: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶
- B: 头孢米诺
- C: 头孢吡肟
- D: 利福喷丁

答案：A

66. 进行透析的急、慢性。肾衰竭患者静脉滴注复方氨基酸注射液（9AA），滴速为

- A: 不超过 15 滴 / 分
- B: 不超过 40 滴 / 分
- C: 滴速 20~30 滴 / 分
- D: 滴速 80~100 滴 / 分

答案：A

67. 以下使用雌激素类药物的方法错误的是

- A: 女性子宫切除后患者采用周期性治疗，即用药 3 周后停药 1 周
- B: 男性患者采用周期性治疗。即用药 3 周后停药 1 周
- C: 应用最低有效量，时间尽可能缩短，以减少可能发生的不良反应
- D: 有子宫的女性在周期的最后 5~7 日加用孕激素

答案：D

68. 袢利尿药中，耳毒性最小，对听力有缺陷及急性肾衰竭者宜选用的药物是()

- A: 依他尼酸
- B: 托拉塞米
- C: 呋塞米
- D: 布美他尼

答案：D

69. 外耳道红肿局部治疗可选用

- A: 3%硼酸乙醇
- B: 赛洛唑啉
- C: 2%酚甘油
- D: 伪麻黄碱

答案：C

70. 通过影响疟原虫红内期的超微结构，阻断了疟原虫营养摄取的药物是

- A: 吡喹酮
- B: 青蒿素
- C: 乙胺嘧啶
- D: 奎宁

答案：B

71. 以下适应证与其他四个药物不同的是

- A: 特比萘芬
- B: 制霉菌素
- C: 联苯苄唑
- D: 克霉唑

答案：B

72. 下列有关口服伪麻黄碱的描述，错误的是

- A: 属处方类鼻黏膜肿胀治疗药物
- B: 用药期间不宜饮酒
- C: 兴奋肾上腺能 α 受体，使鼻腔黏膜血管收缩
- D: 不宜与中枢神经系统抑制药、抗精神病药合用

答案：A

73. 下列属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断药的是()

- A: 阿司匹林
- B: 双嘧达莫
- C: 阿替普酶
- D: 氯吡格雷

答案：D

74. 对钩虫皮下组织的超微结构破坏严重，导致细胞核消失或破坏、线粒体消失，对其肠管中心层线粒体等结构均有破坏，产生驱虫作用的药物是

- A: 伯氨喹
- B: 氯硝柳胺
- C: 三苯双脒
- D: 葡萄糖酸锑钠

答案：C

75. 不易发生耐药株，是目前治疗原虫和厌氧菌的重要药物是

- A: 多黏菌素
- B: 甲硝唑
- C: 克林霉素
- D: 呋喃妥因

答案：B

76. 下述关于铋剂的描述，错误的是

- A: 牛奶可促进铋剂的吸收，服药期间应同服牛奶
- B: 不得同食高蛋白饮食，如牛奶

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 两种铋剂不宜联用

D: 剂量过大时，可导致铋剂脑病现象

答案：A

77. (2021 年真题) 若无禁忌证，治疗 2 型糖尿病首选的口服降糖药物
()

A: 沙格列汀

B: 达格列净

C: 吡格列酮

D: 二甲双胍

答案：D

78. 纠正细胞内缺钾的是

A: 磺酰脲类

B: 胰岛素

C: 二甲双胍

D: A 和 B 均无效

答案：B

79. 利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

A: 氢氯噻嗪

B: 螺内酯

C: 乙酰唑胺

D: 呋塞米

答案：C

80. 下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

- A: 阿莫西林
- B: 氧化镁
- C: 噻嗪类利尿剂
- D: 四环素类

答案：C

81. 口服后很少被吸收的口服降糖药是

- A: 阿卡波糖
- B: 达格列净
- C: 二甲双胍
- D: 罗格列酮

答案：A

82. 肌内注射 ACTH 作用达到高峰的时间是

- A: 7~12 分钟
- B: 10~25 分钟
- C: 8 小时
- D: 4 小时

答案：D

83. 氟西汀的作用机制是

- A: 抑制 5-HT 及去甲肾上腺素的再摄取
- B: 抑制突触前膜对去甲肾上腺素的再摄取
- C: 抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解
- D: 选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度

答案：D

84. β -溶血性链球菌产生的一种蛋白质，现已有基因重组产品的是()

- A: 重组人促红素
- B: 叶酸
- C: 链激酶
- D: 尿激酶

答案：C

85. 耐酸耐酶的青霉素是

- A: 氨苄西林
- B: 双氯西林
- C: 青霉素 V
- D: 羧苄西林

答案：B

86. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

- A: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂
- B: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24h 尿量及尿颜色
- C: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇
- D: 肾功能不全者可以使用

答案：D

87. 下列药物属于高选择性非肽类血小板膜糖蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是

- A: 替罗非班
- B: 硫酸亚铁
- C: 阿司匹林
- D: 双嘧达莫

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/396121105101011030>