专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024河南省滑县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库含答案解析

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.从事药学服务的药师应具备较好的投诉应对能力，正确、妥善地应对投诉的重要意义是

A：提高用药顺应性

B：增进患者对药师工作的信任

C：警惕与防范用药错误

D：使患者获得有关的用药指导

答案：B

2.急性汞中毒出现

A：腐蚀性口腔炎

B：恶心、呕吐、视力模糊

C：肌肉震颤、抽搐

D：恶心、呕吐、口内有金属味

答案：A

3.（2018年真题）患者，女，49岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

A：维生素C片

B：阿司匹林泡腾片

C：氨溴索片

D：左氧氟沙星片

答案：B

4.6个月～2岁婴幼儿白细胞计数正常参考区间是

A：(100～300)×10^9/L

B：(11.0～12.0)×109/L

C：(200～300)×10^9/L

D：(4.0～10.0)×10^9/L

答案：B

5.治疗良性前列腺增生症的药物中，可引起性功能减退的药物为

A：坦索罗辛

B：非那雄胺

C：奥昔布宁

D：特拉唑嗪

答案：B

6.（2019年真题）患者，男，56岁，因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊，查体:舌面光滑，呈“牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素B12水平下降，下列药物中不会影响维生素B12吸收的是

A：对氨基水杨酸

B：氨氯地平

C：奥美拉唑

D：二甲双胍

答案：B

7.患者，女，48岁，因急性气管一支气管炎发作，出现“咳嗽、咳黄痰、喘息”症状就诊。患者无其他基础疾病，不应出现在患者用药处方中的是

A: 沙丁胺醇气雾剂

B: 美敏伪麻溶液

C: 氨溴索溶液

D: 阿莫西林胶囊

答案：D

8.(透析患者常用药物)可消除便秘，避免腹腔感染和腹膜透析液引流不畅的药物是

A: 铁剂

B: 乳果糖

C: 阿法骨化醇

D: 对乙酰氨基酚

答案：B

9.具有沉淀作用，不宜在胃内滞留，可用浓茶代替的洗胃液是

A: 3%鞣酸溶液

B: 活性炭混悬液

C: 淀粉溶液

D: 1：5000 高锰酸钾

答案：A

10.进一步验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

A: Ⅲ期临床试验

B: Ⅰ期临床试验

C: 临床预试验

D: Ⅱ期临床试验

答案：A

11.在现代社会，药学信息的收集已不困难，但很容易出现信息量大但杂乱无章和重复的现象。药师必须通过专业的药学信息检索，对众多良莠不齐的药物信息进行客观、合理的分析评价，去伪存真，挑出有专业证据的高质量信息，指导临床合理用药。

A: 三级信息源

B: 二级信息源

C: 一级信息源

D: 四级信息源

答案：A

12.患者，女，16岁，近两日因排尿困难就医。经医生询问，患者有尿急、尿频、尿痛、排尿不适、下腹痛等症状，且尿液比平时浑浊且有异味，医生测量体温为37．4℃，确诊为尿路感染。

A: 复方磺胺甲噁唑

B: 头孢噻肟

C: 青霉素

D: 氨苄西林

答案：C

13.2～3度房室传导阻滞、充血性心力衰竭禁用()。

A: 利尿剂（噻嗪类）

B: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

C: 利尿剂（袢利尿药）

D: ACEI

答案：B

14.可引起性功能障碍的药物是

A: 维生素E

B：西地那非

C：度洛西汀

D：沙美特罗

答案：C

15.已获准可以长期用于治疗失眠的药物为（）

A：艾司唑仑

B：多塞平

C：佐匹克隆

D：雷美尔通

答案：D

16.患者，男，55岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，医师建议首先改变生活方式（控制饮食等）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀20mg/d治疗。

A：80mg

B：20mg

C：60mg

D：40mg

答案：A

17.主要经肝脏清除，肝功能减退时清除明显减少，但并无明显毒性反应发生的药物

A：尽可能避免使用

B：须谨慎使用，必要时减量给药

C：需增加给药剂量

D：一般无须调整剂量

答案：B

18.某患者，女，27岁，多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁3个月。血FT

A：体重

B：白细胞

C：心率

D：血压

答案：D

19.血尿酸检查超过正常值可

A：诊断贫血

B：诊断黄疸

C：诊断心肌梗死

D：诊断痛风

答案：D

20.患者,女,49岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下：

A：用牛奶服药,减少对胃肠道的刺激

B：服药时避免与钙片同服,以免影响药物的作用

C：服药期间及停药一周内,避免饮用含酒精饮品

D：服药期间,可能会发生便秘

答案：A

21.需与脂餐同服，以增加其口服吸收生物利用度的痤疮治疗药是

A：维A酸

B：过氧化苯甲酰

C：米诺环素

D: 口服短效避孕药

答案：A

22.患者,男,71岁,因高血压、心力衰竭给予氢氯噻嗪、地高辛等治疗,产生的药物相互作用属于()

A: 敏感化作用,药品不良反应增加

B: 拮抗作用,药品不良反应增加

C: 增加靶器官药物浓度,药品不良反应减少

D: 降低抗药性,疗效增加

答案：A

23.Ⅳ级临床研究的结论或Ⅱ、Ⅲ级临床研究的推论属于

A: D级

B: B级

C: E级

D: C级

答案：D

24.患者，女，68岁，既往有高血压，双侧肾动脉狭窄，因水肿复诊，体检和实验室检查：血压172／96mmHg，尿蛋白>29／24h(正常值<150mg／24h)，血尿酸416μmol／L(正常值180～440mmol／L)，血钾6．1mmol／L(正常值3．5～5．5mmol／L)。在已经服用氨氯地平的基础上，应考虑联合应用的抗血压药品是

A: 依那普利

B: 卡托普利

C: 呋塞米

D: 螺内酯

答案：C

25.可造成肝脏损害，形成肝硬化或脂肪肝，减弱对药物的代谢速度的是

A：食醋中的醋酸

B：酒中的乙醇

C：茶叶中的鞣酸

D：食盐中的氯化钠

答案：B

26.属于肾上腺素能α受体拮抗剂，可改善尿道梗阻症状的药品

A：阿夫唑嗪

B：黄酮哌酯

C：氟他胺

D：非那雄胺

答案：A

27.静脉滴注给予万古霉素，滴注时间应该控制的时间是

A：6小时以上

B：2小时以上

C：1小时以上

D：4小时以上

答案：B

28.（2015 年真题）患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热（39.1℃），咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2～3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L（参考值 4.0×109～10.0×109），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 分泌性腹泻

B: 消化不良性腹泻

C: 动力性腹泻

D: 感染性腹泻

答案：D

29.降钙素

A: 激素替代剂

B: 促进骨矿化剂

C: 骨形成刺激剂

D: 骨吸收抑制剂

答案：D

30.餐后 1～2h 服用的是

A: 质子泵抑制剂

B: 解痉、镇痛药

C: 胃黏膜保护剂

D: 抗酸药

答案：D

31.患者，女，62 岁，医师处方如下：姓名：×××性别：女年龄：62 岁临床诊断：2 型糖尿病、高血压 2 级、高脂血症、PCI 术后

A: 阿卡波糖

B: 二甲双胍

C: 氯吡格雷

D: 氨氯地平

答案：D

32.水溶性基制软膏应存放于()。

A：常温库

B：低温库

C：专用仓库

D：凉暗库

答案：A

33.膀胱炎约占尿路感染的60%以上，致病菌多为（）

A：大肠埃希菌

B：金黄色葡萄球菌

C：奈瑟淋病双球菌

D：白色念珠菌

答案：A

34.告知"新上市药品的品牌名、商品名以及药动学与药效学信息"属于

A：新药信息

B：药物相互作用

C：禁忌证

D：药品不良反应

答案：A

35.咳嗽较弱者宜选用的药物是

A：氨溴索

B：喷托维林

C：右美沙芬

D：苯丙哌林

答案：B

36.患者女，6岁，因发热体温38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查:白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 对乙酰氨基酚

B: 双氯芬酸钠

C: 美洛昔康

D: 尼美舒利

答案：A

37.痛风慢性发作期间为促进尿酸排泄可选用

A: 泼尼松龙

B: 苯溴马隆

C: 别嘌醇

D: 秋水仙碱

答案：B

38.各种肠道感染性或非感染性腹泻，或急性胃肠炎可引起

A: 冻状便

B: 稀糊状或水样粪便

C: 米泔水样便

D: 黏液便

答案：B

39.秋水仙碱具有严重的毒副作用，痛风急性发作期使用秋水仙碱治疗时，出现严重中毒前驱症状应立即停药，停药指征是

A: 胃肠道反应

B: 紫癜

C: 肌肉抽搐

D: 血小板减少

答案：A

40.口服普萘洛尔用于解救的是（）

A: 硝西泮中毒

B: 瘦肉精中毒

C: 氯丙嗪中毒

D: 苯丙胺中毒

答案：B

41.患者，男性，80岁，患有帕金森病伴闭角型青光眼，近2个月出现尿频、尿急、夜尿增多，无法控制。诊断为急迫性尿失禁，给予米拉贝隆治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

A: 直立性低血压

B: 卧位和坐位时高血压

C: 鼻咽炎和尿路感染

D: 口干、便秘、尿潴留

答案：C

42.一个安全、有效、稳定、经济的药品，其基本前提必须是

A: 临床急需

B: 有明确的适应证

C: 有明确的使用对象

D: 质量合格

答案：D

43.维生素E用于

A：习惯性流产的辅助治疗

B：防治佝偻病

C：防治夜盲症

D：防治坏血病

答案：A

44.患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血T3、T4及TSH检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A：肝功能损害

B：头痛

C：皮疹

D：粒细胞减少

答案：D

45.患者，男，23岁，近日出现大便有鲜血、便后出血自行停止、肛门有坠胀感，无感染症状，诊断为痔疮。可用于患者的治疗药物是

A：复方甲硝唑栓

B：地塞米松软膏

C：复方片仔癀软膏

D：10%樟脑软膏

答案：C

46.属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的药物是

A：依折麦布

B：辛伐他汀

C：甲基多巴

D: 非诺贝特

答案：B

47.杨某，男性，25岁，间断上腹痛2年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

A: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂?

B: PPI+克拉霉素+呋喃唑酮?

C: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁?

D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂?

答案：D

48.以下评判为"过度治疗用药"的处方用药中，正确的是

A: 滥用糖皮质激素、白蛋白、二磷酸果糖

B: 忽略病情和患者的基础疾病

C: 盲目而无效果地应用肿瘤辅助治疗药

D: 应用两种或两种以上一药多名的药物

答案：A

49.已知1%(g/ml)枸橼酸钠溶液的冰点降低值为0.185℃，计算其等渗溶液的浓度是

A: 2.6(%g/ml)

B: 2.4(%g/ml)

C: 3.0(%g/ml)

D: 2.8(%g/ml)

答案：D

50.药物治疗的效果不以货币为单位表示，而是用其他量化的方法表达治疗目的的药物经济学评价方法是

A：最大成本法

B：成本-效果分析

C：最小成本法

D：成本-效益分析

答案：B

51.（2019年真题）患者，女，45岁，常有上腹部饱胀、恶心食欲不振等消化不良症状。宜选用的药物

A：蒙脱石散

B：奥美拉唑肠溶胶囊

C：干酵母片

D：复方阿嗪米特肠溶片

答案：C

52.同时使用5种药物，药物不良事件的发生率为

A：0.72

B：0.38

C：0.13

D：0.58

答案：B

53.患者,女,53岁,冠心病史2年,目前服用硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙。近三个月因胃痛心境低落、有自杀倾向就诊,临床诊断为消化性溃疡、抑郁症。给予奥美拉唑肠溶片40mgqdpo文拉法辛缓释片150mgadpo,谷维素片10mgtidpo治疗,患者用药后出现血压升高可能导致该患者血压升高的药物是()

A：阿托伐他汀钙片

B：奥美拉唑肠溶片

C：硝酸异山梨酯片

D：文拉法辛缓释片

答案：D

54.饮酒过多也可能致命，导致儿童丧生的纯乙醇致死量是（）

A：10ml

B：15ml

C：25ml

D：20ml

答案：C

55.含马兜铃酸的中药可导致

A：不可逆性肾小管坏死

B：肾间质纤维化

C：肾小管阻塞

D：直接肾毒性

答案：B

56.针对该患者的现有症状,应选用的药物是（）

A：单硝酸异山梨酯缓释片

B：多潘立酮片

C：布地奈德吸入剂

D：奥美拉唑肠溶胶囊

答案：D

57.融合抑制剂

A：利托那韦

B：利巴韦林

C: 依非韦伦

D: 齐多夫定

答案：B

58.不良反应的评价结果分为6级,报表内容填写不齐全，等待补充后再评价，或因果关系难以定论，缺乏文献资料佐证，药品不良反应因果关系评价结果为

A: 待评价

B: 肯定

C: 可能无关

D: 很可能

答案：A

59.肠外营养1g脂肪能提供的热量是

A: 3kcal

B: 7kcal

C: 9kcal

D: 4kcal

答案：C

60.(抗高血压药物的不良反应)，服用哌唑嗪可能引起

A: 多毛症

B: 房室传导阻滞

C: 免疫失调

D: 直立性低血压

答案：D

61.患者，男，50岁，身高167cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查：空腹血糖7.8mmol／L（正常值：3.9～6.1mmol／L），餐后血糖14.8mmol／L；血尿酸580μmol/L（正常值：男性180～440μmol／L），低密度脂蛋白胆固醇3.7mmol／L（正常值：2.1～3.1mmol／L），肌酐清除率100ml／min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化，有混合性脂质斑块。临床诊断为2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: 应用阿司匹林

B: 低嘌呤饮食

C: 适量运动

D: 控制体重

答案：A

62.向患者提供的用药咨询的主要内容是

A: 输液药物稳定性和配伍的理化性质变化

B: 服药后预计疗效起效时间及维持时间

C: 有否替代药物或其他疗法

D: 漏服后的补救方法

答案：A

63.口服氨苄西林吸收率比成人高1倍，即

A: 药物吸收

B: 药物分布

C: 药物代谢

D: 药物中毒

答案：A

64.具有中枢和周围抗多巴胺双重作用的是

A：多潘立酮

B：甲氧氯普胺

C：西沙必利

D：莫沙必利

答案：B

65.剧烈频繁干咳宜选用的药物是

A：多奈哌齐

B：可待因

C：阿司匹林

D：吗啡

答案：B

66.抗感冒药中具有“使鼻黏膜血管收缩、解除鼻塞症状”作用的成分是

A：金刚烷胺

B：双氯芬酸

C：伪麻黄碱

D：天麻素

答案：C

67.提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

A：部分确认信号

B：驳倒的信号

C：确认的信号

D：尚不确定的信号

答案：D

68.孕妇、绝经后女性及骨质疏松患者可适当选服

A：复合维生素

B：钙剂

C：中草药制剂

D：复合营养素

答案：B

69.易经乳汁分泌药物的特性是

A：脂溶性高

B：蛋白结合率高

C：分子量大

D：弱酸性

答案：A

70.对两种或多种药物治疗方案比较成本，为总体医疗费用的控制和医疗资源优化配置提供基本信息，采用货币为单位。该药物经济学评价方法是

A：成本-效益分析

B：成本-效果分析

C：成本-效用分析

D：最小成本分析

答案：D

71.下列情况的首选药物是，高TC血症

A：贝丁酸类

B：他汀类

C：胆酸螯合剂+贝特类

D：弹性酶

答案：B

72.患者，男，72岁，患有阿尔茨海默病，给予卡巴拉汀每日3mg治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是（）

A: 每日清晨空腹口服

B: 每日早晚空腹口服

C: 每晚睡前口服

D: 每日早晚与食物同服

答案：D

73.患者，女，30岁，情感低落、反应迟钝半年余，晨重夜轻，临床诊断为抑郁症。

A: 4周

B: 3周

C: 2周

D: 1周

答案：C

74.多潘立酮药物不良反应

A: 性功能障碍

B: 睡眠障碍

C: 黑便

D: 男性乳房女性化

答案：D

75.肾衰竭者不能

A: 实施血液净化

B: 强利尿

C：催吐

D：洗胃

答案：B

76.治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是（）

A：依非韦伦

B：拉米夫定

C：利巴韦林

D：阿昔洛韦

答案：A

77.重要器官或系统功能有严重损害、缩短或危及生命，应判为

A：轻度

B：弱轻度

C：中度

D：重度

答案：D

78.不宜与蛋白质食物合用的药物是

A：辛伐他汀

B：左旋多巴

C：磺胺类药物

D：硫酸亚铁

答案：B

79.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征

B: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

C: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎

D: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

答案：B

80.（2017年真题）服用后可引起多尿驾驶员应慎用的药物是（）

A: 吲达帕胺

B: 胰酶

C: 阿司匹林

D: 氯苯那敏

答案：A

81.以下有关γ-GT检查值升高的临床意义中，最正确的是

A: 诊断心肌梗死

B: 诊断急慢性白血病

C: 诊断痛风

D: 诊断恶性贫血

答案：A

82.药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。

A: 患者四?

B：患者三？

C：患者二？

D: 患者一?

答案：B

83.二甲双胍用于非糖尿病患者的减肥

A: 非适应证用药

B: 盲目联合用药

C: 过度治疗用药

D: 超适应证用药

答案：D

84.患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，可导致患者隐形眼镜染色的药物是

A: 异烟肼

B: 吡嗪酰胺

C: 利福平

D: 乙胺丁醇

答案：C

85.可用于紫癜辅助治疗的药物是

A: 复合维生素 B

B: 维生素

C: 维生素 A

D: 维生素 C

答案：D

86.巴比妥类药物重度中毒的表现是

A: 意识障碍、昏迷

B：抽搐反复发作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/396151231054011030