

(新) 急救相关知识考试题库

第一部分 单选题(200 题)

1、各种类型休克基本病理变化是 0

- A、血压下降
- B、中心静脉压下降
- C、脉压减小
- D、尿量减少
- E、有效循环血量锐减

【答案】： E

2、高血压脑出血的主要发病机制是 0

- A、小动脉壁受损出血
- B、微动脉瘤的形成与破裂
- C、脑淀粉样血管病
- D、脑软化后出血
- E、脑动脉结构异常

【答案】： B

3、非同步电复律用于治疗 0

- A、心室扑动
- B、室性心动过速
- C、心房扑动
- D、室上性心动过速
- E、心房颤动

【答案】： A

4、在对心跳呼吸骤停患者进行基本生命支持时，以下哪种说法不正确
0

- A、用 6-10 秒(不超过 10 秒)检查是否存在正常呼吸；
- B、对除怀疑颈椎损伤的所有病人使用仰头抬颊法开放气道；
- C、如果人工通气未使胸库起伏，应继续进行人工通气直到有效胸库起伏；
- D、每名急救人员最好只连续进行 2 分钟左右的胸外按压后轮换，以保证按压质量。
- E、对怀疑颈椎损伤的所有病人使用双手推举下颌法开放气道；

【答案】： G

5、高渗昏迷患者输液 4h 应输入总量的()

- A 、 1/3
- B、 1/2
- C 、 2/3
- D、 1/4
- E、 3/4

【答案】： A

6、患者，男性，35 岁，车祸外伤后输入大量库存血后，出现心率缓慢、手足抽搐，

血压下降，伤口渗血，出现以上症状的有关因素是 0

- A、高血钾
- B、低血钾
- C、高血钙
- D、低血钙
- E、低血钠

【答案】： D

7、现场急救电击伤最首要的措施是 0

- A、切断电源
- B、胸外心脏按压

C、包扎创面

D、预防感染

E、TAT

【答案】： A

8、哮喘持续状态是指经一般支气管扩张药治疗后仍有 0

- A、大量黏脓痰
- B、明显发绀
- C、哮喘 24 小时以上
- D、肺不张
- E、浅昏迷

【答案】： G

9、危重症患者家属病情保障方面的需求，家属最关心的是 0

- A、患者安全
- B、患者饮食
- C、患者舒适
- D、患者心理
- E、患者支持

【答案】： A

10、以下哪项不是中暑的常见诱因 0

- A、年老、疲劳
- B、体弱
- C、营养不良
- D、糖尿病
- E、骨质疏松

【答案】： E

11、患者，女性，55 岁。因高速车祸 4 小时入院，伤后当时浅昏迷，GCS 评分 5 分，呼吸急促(38 次/分)伴口严重发绀，面部严重肿胀，脉搏摸不到，手足发冷，血压 50/30mmHg。

假如你是现场救护人员，首先实施的抢救措施是 0

- A、立即建立静脉通路、抗休克治疗
- B、进行创伤严重度评分
- C、立即送往医院
- D、气管插管、给氧
- E、仔细检查，明确诊断

【答案】： D

12、严重低钾血症患者主要死于 0

- A、心机收缩性降低
- B、心机传导降低
- C、心机自律降低
- D、肾功能严重障碍
- E、呼吸衰竭

【答案】： A

13、患者家属王某，女性，26岁。在得知丈夫因病情危重，抢救成功的可能性不大

时，非常忧郁，伤心哭泣。护士在安慰她时，以下做法中不恰当的是 0

- A、当她表示想独自一人安静一会时，为她提供一个适当的环境
- B、坐在她身边，轻轻递给她纸巾
- C、阻止她哭泣，告诉她要坚强
- D、在她停止哭泣时，鼓励她说出悲伤的原因
- E、轻轻握住她的手，默默陪伴她

【答案】： C

14、诊断心跳骤停的简捷依据是 0

- A、血压测不到
- B、神志突然消失
- C、呼吸突然停止
- D、大动脉搏动消失

【答案】： D

15、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为 0

- A、仰头举颏法
- B、双手推举下颌法
- C、托颊法
- D、环状软骨压迫法
- E、托颈法

【答案】： A

16、心搏骤停复苏抢救的有效指征不包括 0

- A、触到大动脉搏动
- B、上肢收缩压在 8kPa 以上
- C、自主呼吸恢复
- D、瞳孔散大 E. 颜面、口唇转红润

【答案】： D

17、作为一名跳楼致高处坠落伤患者的现场目击者，以下哪种做法是最正确及时的？()

- A、立刻拨打 120 急救电话，等待救援人员的到来
- B、立刻离开现场，以免惹祸上身
- C、立刻给患者行心电图，宣布患者死亡
- D、围观患者，议论纷纷，摇头叹息
- E、迅速判断患者意识和伤情，呼吁现场群众协助救治，同时拨打急救电话呼叫急救措施，必要时立刻进行 CPR 或止血、固定等处理

【答案】： E

18、关于急性应激障碍的陈述，正确的是 0

- A、一般在刺激后 1 天内发病
- B、以急剧、严重的精神打击为直接原因
- C、表现平静
- D、应激消除者症状历时 20 天左右

E、通常 6 个月内症状缓解

【答案】： B

19、高原病的诱因不包括 0

- A、登高速度过急
- B、体力活动过大
- C、寒冷或气候改变
- D、饥饿、疲劳、失眠
- E、慢性胃炎

【答案】： E

20、有机磷农药中毒最早出现的临床表现是 0

- A、平滑肌痉挛和腺体分泌增加
- B、全身肌肉发生强直性痉挛
- C、头痛、头晕、乏力
- D、共济失调
- E、谵妄、意识障碍

【答案】： A

21、下列哪一项是多发伤的临床特点)

- A、创伤后全身反应较轻，死亡率不高
- B、较少发生休克
- C、低氧血症发生率高
- D、多发伤等同于多处伤
- E、不易发生漏诊和误诊

【答案】： C

22、下面禁止转运的指征不正确的是)

- A、心跳、呼吸停止；
- B、有气管插管指征，但未插管的；
- C、血流动力学不稳定；
- D、血压偏高

【答案】： D

23、胸部多根多处肋骨骨折的治疗要点 0

- A、保持呼吸道通畅
- B、鼓励患者咳嗽排痰
- C、卧床休息
- D、给精神安慰
- E、制止胸壁的浮动，纠正呼吸障碍预防外伤性湿肺发生

【答案】： E

24、抢救病人中护士进行的工作下列哪项不正确 0

- A、口头医嘱复诵后再执行
- B、用完的空安瓿应及时处理
- C、抢救后应及时请医生补写医嘱
- D、抢救记录字迹清晰及时准确
- E、医生未到时可先建立静脉通道

【答案】： B

25、冠心病猝死的原因多为 0

- A、窒息
- B、脑梗死
- C、肺梗死
- D、心脏破裂
- E、严重的心律失常

【答案】： E

26、休克早期血压的变化 0

- A、收缩压下降，脉压差小
- B、收缩压升高，脉压差大
- C、收缩压正常，脉压差小
- D、收缩压下降，脉压差大
- E、血压无变化

【答案】： C

27、成人心肺复苏时打开气道的最常用方式为 0

- A、仰头举颊法
- B、双手推举下颌法
- C、托颊法
- D、环状软骨压迫法
- E、托颈法

【答案】： A

28、下列判断心肺复苏有效的指标中，应除外 0

- A、瞳孔由大变小
- B、每次按压可触及颈动脉搏动
- C、出现周身毛孔收缩
- D、出现睫毛反射
- E、面色由发绀转为红润

【答案】： C

29、输液治疗时患者突然出现心慌气紧、呼吸困难、发绀、大汗、咳嗽、咳泡沫

血痰、烦躁不安。听诊肺部布满湿性啰音。应高度怀疑 0

- A、循环负荷过重
- B、空气栓塞
- C、输液反应
- D、过敏反应

【答案】： A

30、下列哪项是多发伤初级评估的目的 0

- A、明确诊断
- B、判定处理伤员的优先次序
- C、确认是否需要手术
- D、明确收治的科室
- E、决定后续的治疗方案及优先次序

【答案】： B

31、空气栓塞时应采取的卧位是 0

- A、半卧位
- B、端坐位
- C、右侧卧位，头低足高位
- D、左侧卧位，头低足高位
- E、左侧卧位，头高足低位

【答案】： D

32、进行 CPR 的前提条件是 0

- A、无反应、无呼吸
- B、无反应、有呼吸
- C、无意识
- D、无反应

【答案】： A

33、转运时护士及医生始终位于病人的 0

- A、头部两侧
- B、左右两侧
- C、头尾位置
- D、左侧

【答案】： A

34、以下影像学检查结果需报告危急值，除外的是 0

- A、自发性气胸
- B、外伤性膈疝
- C、纵隔摆动
- D、宫外孕破裂大出血
- E、大量心包积液合并心包填塞

【答案】： A

35、下列哪项不是高危药品 0

- A、10%氯化钾
- B、10%葡萄糖酸钙

C、胰岛素

D、肾上腺素

【答案】： B

36、一旦心搏骤停患者恢复自主循环，理想的目标是以最低的 FiO_2 将血氧饱和度水平维持在 0

- A、80%以下
- B、85%~100%
- C、90%~100%
- D、94%~100%
- E、100%以上

【答案】： D

37、中毒时最首要的处理是 0

- A、对症治疗
- B、使用抗生素
- C、立即终止接触毒药
- D、使用特效解毒药
- E、清除进入人体的毒药

【答案】： C

38、环状软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。环甲膜穿刺点是)

- A、甲状软骨下缘与环状软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。
- B、甲状软骨下缘与环状软骨弓上缘交界处。
- C、甲状软骨下缘与颈部正中线交界处。
- D、甲状软骨下缘与软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。
- E、环状软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。

【答案】： A

39、艾滋病的主要传播途径是 0

- A、饮食传播
- B、母婴传播
- C、蚊虫叮咬
- D、血液传播
- E、性接触传播

【答案】： E

40、有关骨折急救处理，下列哪项错误)

- A、 首先应止血及包扎伤口
- B、无夹板时，可用树枝、木棍(板)、步枪等作临时固定支架
- C、可将伤员上肢缚于胸壁侧面，下肢两腿绑在一起固定
- D、脊椎骨折患者不可采取手法复位
- E、搬动脊椎骨折患者时，应采取一人抱肩， 一人抬腿的方法

【答案】： E

41、糖尿病酮症酸中毒的表现错误的是 0

- A、酮体生成过多
- B、水肿
- C、治疗前，血钾偏高或正常
- D、携氧功能障碍

【答案】： B

42、心律失常中最严重的是 0

- A、室上性心动过速
- B、 心房颤动
- C、心室颤动
- D、一度房室传导阻滞
- E、室性心动过速

【答案】： C

43、下列止血方法中，最后在万不得已的情况下选用的是 0

- A、指压止血

B、加垫屈肢止血

C、填塞止血

D、止血带止血

E、穴道止血

【答案】： D

44、现场心肺复苏操作首要步骤是 0

- A、心前区叩击
- B、心脏按压
- C、口对口人工呼吸
- D、按额托项，保持呼吸道通畅
- E、心内注射

【答案】： D

45、患者，男性，55 岁。参加 2 小时会议后，到洗手间返回会议室途中突然晕倒，

意识不清。如果有 3 人在现场，其最佳分工是)

- A、1 人拨打“120”电话，第 2 人按压人中，第 3 人高声呼喊患者
- B、1 人判断患者心搏骤停，第 2 人拨打“120”电话，第 3 人立即进行胸外按压
- C、1 人拨打“120”电话，第 2 人判断患者意识，第 3 人置患者于舒适体位
- D、1 人拨打“120”电话，第 2 人判断患者意识，第 3 人给患者人工呼吸
- E、1 人呼喊患者、判断呼吸和脉搏，第 2 人拨打“120”电话，第 3 人呼救

【答案】： B

46、急性颅内压增高病人典型的生命体征表现是 0

- A、脉快，呼吸急促
- B、脉快，血压降低
- C、脉快，血压高
- D、脉慢，呼吸慢
- E、脉慢，血压低

【答案】： D

47、急性敌百虫中毒禁用 0

溶液洗胃。0

- A、清水、生理盐水
- B、1:5000 高锰酸钾溶液
- C、2%重曹溶液
- D、牛奶、蛋清水
- E、活性炭

【答案】： C

48、护士在紧急情况下为抢救患者生命实施必要的紧急救护，应该做到以下几点，

但除外()

- A、必须依照诊疗技术规范
- B、必须有医师在场指导
- C、根据患者的实际情况和自身能力水平进行力所能及的救护
- D、避免对患者造成伤害
- E、以上均正确

【答案】： B

49、患者，男性，23岁，踝关节扭伤6小时，局部肿胀、疼痛明显，需进行冷敷，其目

的是()

- A、促进末梢循环
- B、促进炎症的消散
- C、促进炎症的局限
- D、减轻局部出血、疼痛
- E、使血管扩张，减轻深部组织充血

【答案】： D

50、休克早期微循环灌流的特点是0

- A、少灌少流
- B、多灌少流

C、 不灌不流

D、

少灌多流

E、多灌多流

【答案】： A

51、火灾急救处理“三防”是指 0

A、防休克、防中毒、防窒息

B、防窒息、防跳楼、防奔跑

C、防休克、防感染、防中毒

D、防休克、防窒息、防感染

【答案】： D

52、医护人员到达现场，可用哪几种颜色对伤员进行分类 0

A、白、黄、绿、黑

B、红、黄、绿、黑

C、红、黄、蓝、黑

D、红、白、绿、黑

【答案】： B

53、患者女性，前臂行细带包扎 1 小时，自觉手指剧痛，护士观察见手指发凉发绀，

不能自主活动。首先考虑是 0

A、室内温度过低

B、石膏绷带包扎过紧

C、神经损伤

D、体位不当

【答案】： B

54、患者患有心脏病但活动量不受限制，平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸

困难或心绞痛。其心功能分级应为 0

A、心功 1 能级

B、心功能 2 级

C、 心功能 3 级

D、

心功能 4 级

E、以上都不是

【答案】： A

55、地震发生现场，某患者出现大量肠管脱出，此时首先要做的是 0

A、进行保护性包扎

B、把肠管回纳腹腔

C、暂时不予处理

D、马上紧急处理

E、给予止痛药

【答案】： A

56、头颈部创伤的伤者开通气道的方法为 0

A、仰头举颏法

B、抬颌法

C、仰头抬颈法

D、压额抬颌法

【答案】： B

57、患者，女性，58 岁，慢性支气管炎病史 10 年，慢阻肺病史 5 年。护士在夜间查房时发现患者剧烈咳嗽后突感上胸刺痛、胸闷、呼吸困难，不能平卧，查体：左侧 胸廓膨隆、呼吸运动减弱、叩诊呈鼓音，听诊左肺呼吸音明显减弱，应考虑为 0

A、肺梗死

B、急性心肌梗塞

C、自发性气胸

D、支气管哮喘

E、胸腔积液

【答案】： C

58、患者，男性，49 岁。冠心病史 5 年，以“胸闷、剧烈胸痛半小时，伴大汗”为

主诉来诊，进入抢救室后，心电监护示波显示 “RS

波群消失，代之以大小不等、形态各异的颤动波，频率为 300 次/分”。此时应立即采取的最恰当的急救措施是

)

- A、按压人中，同时立即给予气管插管
- B、应用单相波除颤器连续除颤 3 次
- C、应用双相波除颤器进行除颤，能量 150J
- D、立即给予气管插管，胸外按压
- E、立即建立静脉通路，给予肾上腺素 0.5~1mg 静脉注射

【答案】： C

59、患者心脏骤停，开始抢救时间为心脏骤停 4-6 分钟进行，心肺复苏成功率是多少。()

- A、60%
- B、10%
- C、4%
- D、50%

【答案】： B

60、急救药品和各种抢救设备做到“五定”不包括 0

- A、定点安置
- B、定人保管
- C、定期消毒灭菌
- D、定期检查维修
- E、定期使用

【答案】： E

61、患者，女性，35 岁。因头部外伤报诊为“脑挫裂伤”急诊入院。接诊时发现，

患者神志不清，口鼻腔出血且分泌物多，口唇发绀，呼吸困难。该患者目前最确切的首要护理诊断是 0

- A、有窒息的危险
- B、气体交换受损
- C、有受伤的危险
- D、有感染的危险
- E、有脑疝的危险

【答案】： A

62、属于骨折早期并发症的是 0

- A、血管神经损伤
- B、关节僵硬
- C、创伤性关节炎
- D、缺血性肌挛缩
- E、延迟愈合

【答案】： A

63、下面措施中，最能有效改善早期肺气肿症状的是 0

- A、促进痰液排出
- B、保证睡眠质量
- C、去除外界刺激因素
- D、呼吸功能锻炼
- E、处理并发症

【答案】： D

64、李先生，56岁，因“右心衰”来院急诊，在休息状态下也心悸、呼吸困难，请问李先生现在的心功能分级为 0

- A、I级
- B、II级
- C、III级

D、IV 级

E、V 级

【答案】： D

65、在对未建立高级气道的心跳呼吸骤停患者进行 CR 时，应进行 0 次人工通气。

- A 、 1
- B 、 2
- C 、 3
- D、 4
- E 、 5

【答案】： B

66、现场急救中，口对口人工呼吸的吹气频率较适宜的是()

- A、 12~14 次/分
- B、 14~16 次/分
- C、 16~18 次/分
- D、 18~20 次/分
- E、 20~22 次/分

【答案】： B

67、复苏时一人行胸外心脏按压和人工呼吸的次数比例是(

- A、 15:2
- B 、 5:1
- C、 15:1
- D 、 5:2
- E、 其余各项均不对

【答案】： A

68、在灾难现场通常以黑颜色醒目的卡片或胶带表示患者的分类是 0

- A、 死亡
- B、 重伤
- C、 危重伤
- D、 中重伤
- E 、 致命伤

【答案】： E

69、四肢大动脉出血或采用加压包扎后不能有效控制的大出血应采用 0

- A、加压包扎止血法
- B、按压止血法
- C、指压止血法
- D、止血带止血法
- E、用止血钳直接夹闭血管的断端

【答案】： D

70、心脏骤停首选的治疗措施是 0

- A、心肺复苏
- B、安置起搏器
- C、开通静脉输液
- D、通畅呼吸道
- E、高浓度吸氧

【答案】： A

71、下列各组药物中，可经气管内给予的是 0

- A、肾上腺素、阿托品、胺碘酮
- B、阿托品、心律平、肾上腺素
- C、利多卡因、异搏定、5%碳酸氢钠
- D、纳洛酮、西地兰、阿托品
- E、肾上腺素、阿托品、利多卡因

【答案】： E

72、急性苯巴比妥中毒患者可，用哪种溶液洗胃 0

- A、5000 高锰酸钾溶液
- B、2%重碳酸溶液
- C、牛奶、蛋清水
- D、液体石蜡
- E、活性

【答案】： A

73、脑出血患者降低颅内压，控制脑水肿时应使用 0

- A、复方氯化钠
- B、碳酸氢钠
- C、甘露醇
- D、葡萄糖
- E、氯化钠

【答案】： C

74、救治中毒的原则错误的是 0

- A、促进毒物的排泄
- B、尽早使用特效解毒剂
- C、立即终止机体与毒物的接触
- D、毒物不明确先诊断再抢救

【答案】： D

75、最简单、有效的临时止血方法为 0

- A、加压包扎止血法
- B、指压止血法
- C、屈肢加垫止血法
- D、填塞止血法

【答案】： A

76、抢救溺水病人的第一步是 0

- A、倒出呼吸道内及胃内的积水
- B、立即进行口对口人工呼吸
- C、胸外心脏
- D、迅速清除口鼻内泥沙污泥
- E、应用抗生素预防感染

【答案】： D

77、急性镇静安眠药中毒时，可选用)药物促进苏醒，同时还有拮抗呼吸抑制作用。

()

- A、美蓝
- B、VK1
- C、解磷定
- D、阿托品
- E、纳络酮

【答案】： E

78、以下说法中哪一条可能不正确()

A、肺脏在正常时含有足够的氧，在呼吸停止后能防止严重的血氧不饱和达 30 秒

左右；

B、单纯施行胸外心脏按压的患者存活率明显高于未接受 CPR 者；

C、在 SCA 导致心搏骤停早期，即使不通气，单纯胸外心脏按压可能也足以维持机

体基本的通气要求；

D、双人实行 CPR 时，应按照 15:2 的按压通气比进行。

E、双人实行 CPR 时，应按照 30:2 的按压通气比进行。

【答案】： D

79、初期复苏所讲 ABC 中，通常 A 是指 O

- A、开放气道
- B、口对口(鼻)人工呼吸
- C、胸外心脏按压
- D、药物治疗
- E、病情观察

【答案】： A

80、气管插管时看到的第一个标记物是 0

- A、声门
- B、会厌
- C、切牙
- D、悬雍垂

【答案】： D

81、休克的临床表现有 0

- A、脉搏细弱
- B、大汗淋漓
- C、口唇发绀
- D、血压下降
- E、以上都是

【答案】： E

82、男，12岁，因溺水出现心脏骤停，心电监护示一直线，有双人参与抢救，除如下哪种抢救措施外，其余措施均可采取 0

- A、胸外按压
- B、人工呼吸
- C、电除颤
- D、心脏起搏

【答案】： D

83、药品冰箱温度应维持在什么范围?0

- A、2-6℃
- B、2-8℃
- C、3-8℃
- D、4-6℃

【答案】： B

84、如果一次注入洗胃液过多会引起 0

- A、胃内压升高引起反射性心跳加快

B、胃内压降低引起反射性心跳骤停

G、胃内压升高毒物吸收增加

D、胃内压降低毒物吸收增加

【答案】： C

85、对火灾抢救出来的伤员，应首先 0

- A、给予充足的饮食再送医院
- B、询问火灾原因
- C、采取各种适当的方法进行现场救护再送医院
- D、得到亲友的陪伴在进行抢救治疗

【答案】： C

86、灭火器至少多长时间进行一次全面检查和保养 0

- A、一个月
- B、一个季度
- C、半年
- D、一 年

【答案】： A

87、成年人颅内压的正常值为 0

- A、70-200mmH2O
- B、80-210mmH2O
- C、90-190mmH2O
- D、60-180mmHg
- E、70-150mmHg

【答案】： A

88、男性，30 岁。车祸伤现场发现左股部伤口有大量鲜血涌出，此时最先应检查

的 是 0

- A、触诊足背和胫后动脉
- B、检查肢体感觉
- C、检查膝腱或跟腱反射
- D、足部主动活动有无缺失
- E、左下肢主动活动有无缺失

【答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/397010034101006120>