

# 如何看待女性不孕不育症

# 概论

- **不孕症：（原发不孕）**

育龄夫妇婚后同居，性生活正常  
未避孕2年未受孕者

- **不育症（继发不育）**

曾受孕，但均已流产，早产，死胎，死产  
，

异位妊娠等未获活婴2年

# 女性生殖器官





# 妊娠必备条件

- **受孕的先行之路-生殖道**
- **阴道：** 性交，精液排放的器官  
是分娩时胎儿,胎盘等的通道
- **宫颈：**  
排卵前： 宫颈瞳孔样反应，含多量透明  
蛋清样粘液，利于精子穿透  
排卵后： 宫颈粘明显减少，口闭  
有防御作用

# 妊娠必备条件

## 子宫：

- 受孕前，后为胚胎充分准备
- 子宫内膜蜕膜化，是孕育胚胎之温床
- 胎儿生长发育的场所

# 妊娠必备条件

输卵管：管道通畅，结构功能正常  
拾卵、受精、运送孕卵进入子宫



# 妊娠必备条件

- 健康卵子产生：卵巢结构、功能正常孕育优质的卵子，是受孕的先决条件  
正常的内分泌是支撑受孕和胚胎、胎儿正常发育的必需具备的条件

# 病因-内分泌失调因素

- 内分泌失调:导致卵泡发育, 排卵功能障碍
- 无排卵
- 持续性不排卵:15%~25%  
多囊卵巢综合症, 高泌乳血症
- 无排卵的特殊形式: 未破裂卵泡黄素化综合症



# 病因-内分泌失调因素

- 有排卵黄体功能不足
  - 稀发排卵:8%~10%
  - 排卵异常:15%~20%
- 小卵泡排卵

# 病因-内分泌失调因素

- 损伤卵巢结构引起卵巢排卵功能障碍  
炎症:各种盆腔炎症破坏卵巢  
卵巢赘生物剥出术后:如卵巢巧克力囊肿  
卵巢肿瘤  
物理化学因素:放疗化疗

# 病因-输卵管因素

- 输卵管阻塞,通而不畅

输卵管结核:**25.45%~31.1%**

输卵管粘连,结节,钙化,疤痕,变硬僵硬

影→响蠕动

内膜肉芽肿,管壁玻璃样变,干酪样坏死


纤→毛破坏,管壁阻塞



# 病因-输卵管因素

- 性传播性疾病:STD

沙眼衣原体,支原体,淋病,梅毒



滴虫,霉菌

# 病因-输卵管因素

- 子宫内膜异位症：  
盆腔粘连致输卵管不通
- 输卵管蠕动异常  
人工流产,引产后

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/397060101120006062>