

关于精神疾病与婚育医学意见





掌握五个概念

- 精神疾病的概念
- 精神障碍
- 精神病
- 常见的精神症状
- 婚前医学检查的有关精神病



精神疾病的概念

- 精神疾病是指在各种生物学、心理学以及社会环境因素影响下，大脑功能失调，导致认知、情感、意志和行为等精神活动出现不同程度障碍临床表现的疾病。



精神障碍

- 指精神活动显著偏离正常，以精神病性症状、社会功能下降和（或）本人感到精神痛苦为特征的一种情况。
- 精神障碍包括精神病、神经症、人格障碍与精神发育迟滞。



精神病

- 指一种产生严重的精神障碍，有感知、思维、情感、意志行为障碍，社会功能下降，自知力缺乏。
- 精神病不包括精神发育迟滞、神经症和人格障碍。



精神病和神经病的区别：

- 精神病只涉及大脑的高级功能的紊乱，如认知、情感、意志和行为等活动；神经病学重点在大脑的低级功能，如感觉、运动等。
- 精神病学只与大脑打交道；神经病学则还包括脊髓、周围神经和肌肉。



常见的精神症状

- 感觉和知觉障碍
- 思维障碍
- 情感障碍
- 动作行为障碍
- 智能障碍
- 记忆障碍



感觉和知觉障碍（一）

- 错觉—错觉是对客观事物歪曲的知觉，受许多心理内外因素的影响。其特点是必须有客观事物的存在，在外界事物的刺激下产生，对事物的感知是错误的。
- 幻觉—是感觉器官缺乏客观刺激时的知觉体验，并且与真正的知觉体验有相同的特征。幻觉是产生于外界（或躯体内部）的一种类似知觉的体验，而不像意象是内心的体验。幻觉是精神病患者最常见的症状之一，少数正常人也可体验到幻觉，特别是疲劳时。



感觉和知觉障碍（二）

- 感知综合障碍—病人在感知某一现实事物时，作为一个客观存在的整体来说是正确的，但对该事物的个别属性,如大小、形状、颜色、空间距离等产生与该事物不相符合的感知。



思维障碍

- 思维形式障碍 一指思维联想过程中形成概念的障碍。
- 思维内容障碍 一指主要指妄想
- 逻辑障碍



思维形式障碍

- 思维散慢—联想松弛，内容松散。
- 思维破裂—联想过程破裂，表现为言语支离 破碎，别人无法理解。
- 思维迟缓—联想速度缓慢、困难、少语。
- 思维奔逸—联想加快、思维活跃，话多。
- 思维贫乏—联想数量减少，言语单调、空洞。

思维内容障碍

(妄想是一种病态的信念。它缺乏事实根据，又难以说服纠正)

- 被害妄想—坚信受到别人陷害、打击。
- 关系妄想—认为周围的无关事物都与他直接有关，别人的言行举动都是针对他。
- 嫉妒妄想—坚信自己的配偶对自己不忠，另有新欢。
- 钟情妄想—坚信自己被异性钟情。
- 夸大妄想—坚信自己有非凡的才智、地位和权利。



逻辑障碍

- 象征性思维—是指患者将一事物的具体概念与抽象的概念混淆在一起，以一种只有自己才能理解的抽象概念、词句或动作替换某一具体概念。
- 逻辑倒错性思维—是指患者违反逻辑法则进行推理,或在推理过程中偷换概念。
- 语词新作—指患者自创一些文字、语言、图形、符号并赋予特殊意义，或对常用普通词语赋予新概念。



情感障碍

- 情感倒错一是指患者的情感反应与客观刺激的性质不相称。如遇悲哀的事件表现欢乐，遇到高兴的事反而痛哭。
- 情感淡漠一对与自身利益密切相关的事物漠不关心，无动于衷。
- 情绪低落一心境低沉，悲观绝望，甚至产生自杀观念和行。
- 表情倒错一是指患者的情感体验与外部表情不协调。如嚎啕大哭时同似不悲伤，喜笑颜开时内心极其痛苦。



情感障碍

- 情绪高涨—与环境不相符的过分愉快、欢乐。
- 焦虑—过分担心，惶恐不安，似大祸临头。



动作行为障碍

- 精神运动性兴奋一指整个精神活动的增强。可表现为协调性精神运动性兴奋或不协调性精神运动性兴奋。
- 精神运动性抑制一指整个精神活动的降低。病人表现为言语动作普遍迟缓和减少，严重时呈木僵状态。



智能障碍

智能是一个复杂的综合精神活动的功能。智能可表现为理解力、计算力、分析能力和创造力等，一般与年龄、文化程度和职业、职位等有关。

- 智商在70~86为边缘智力。
- 智商在50~69为轻度智力受损。
- 智商在35~49为中度智力受损。
- 智商在20~34为重度智力受损。
- 智商在20以下为极重度智力受损。

精神发育迟滞（智能低下、弱智）

- 精神发育迟滞指先天或围产期或生长发育成熟以前（18岁以前），因某种致病因素如遗传、感染、中毒、头部外伤、内分泌异常或缺氧等引起大脑发育不良或受阻碍，智能发育停留在一定的阶段，随着年龄增长其智能明显低于正常的同龄儿童。



痴呆

- 痴呆是一种综合征。指18岁以后由各种原因引起的大脑高级皮层功能损害，包括记忆、智能和人格的受损。



记忆障碍

- 记忆减退一是指记忆的识记、保存、再认和回忆四个部分的普遍减退，临床上比较多见。
- 遗忘一部分地或全部地能再现以往的经验称为遗忘，它不是记忆减退，而是回忆的丧失。



记忆障碍

- 错构症一是对过去实际经历过的事物，在其发生的时间、地点、情节上，有回忆的错误，张冠李戴、唐汉不分，往往将日常生活经历中的远事近移，多见于老年性和动脉硬化性精神病患者。
- 虚构症一是一种记忆错误，指患者在回忆中将过去事实上从未发生的事或体验，说成是确有其事，患者就以这样一段虚构的事实来填补他所遗忘的那一片段的经过。



自知力障碍

- 自知力是指患者对自己所患疾病的认识与判断能力。大多数精神病患者自知力丧失，有的患者在患病初期尚有自知力，随病情加重逐渐丧失。经过治疗，病情好转后患者的自知力恢复，并能对患病期间的精神异常表现作出恰当的判断和认识。因此，自知力检查对判断疗效和预后具有重要意义。



婚前医学检查的有关精神病

- 精神分裂症
- 情感性精神障碍
- 其他重性精神病（偏执性精神病；脑器质性精神障碍；躯体疾病所致精神障碍；精神活性物质所致精神障碍）



有关精神病及婚育医学意见

- 精神病人的结婚问题
- 精神病人的生育问题

精神病人的结婚问题

■ 新婚姻法（七）禁止结婚的条件

(一)直系血亲和三代以内的旁系血亲；

(二)患有医学上认为不应当结婚的疾病。包括严重遗传性疾病、指定传染病、有关精神病三类疾病的检查。

“医学上认为不应当结婚的疾病”中精神病占有一定比例，比如，精神分裂症、情感性精神障碍等患者在发病期间或症状未彻底缓解时、严重的癫痫、重度精神发育迟滞。神经症、病情较轻的癫痫或智能低下者，是可以结婚的。精神分裂症、情感性精神病患者，经治疗已病愈或精神症状缓解已有相当时间，也可以结婚。不过，事先应去市级精神病医院作病情鉴定，出具疾病证明，才可办理结婚登记手续。



精神病人的生育问题

精神病人能否生育，我国《婚姻法》中也没有明确规定，一般说来，有关精神病人的生育和子女抚养问题可参考下述数条：

1、前述不宜结婚的精神病人，亦不提倡生育后代，包括：（1）重性精神病预后较差的；（2）中至重度精神发育迟滞患者；（3）严重癫痫，包括癫痫频繁发作或者已伴有精神障碍和明显性格改变和智能缺损者。

2、家族中有多名精神病人，或双方均罹患精神病疾病患者，可到医学专业机构进行遗传咨询，已孕者需定期产前检查，以决定是否终止妊娠。

精神病人的生育问题

3、怀孕期女性精神病人，若病情恶化，服用大剂量抗精神病药物者，需酌情考虑终止妊娠。

4、精神病是有遗传的，血缘关系越近，亲属患病率越高。为了下一代的身心健康，精神病人还是以不生育为好。在病情稳定一段时期后，经过专科医生的鉴定之后，可考虑领养一个孩子。

5、领养子女的家庭，如夫妻双方均为精神病患者，从该子女今后成长考虑，需慎重决定，必要时需经法院裁决。



各论

- 精神分裂症
- 情感性精神障碍
- 其他重性精神病



精神分裂症

- 概述：
- 是最常见的一种精神病
- 原因不明
- 多起病于青壮年
- 主要临床特征为感知、思维、情感和行为等多方面的障碍和精神活动与环境的不协调
- 一般没有意识障碍和智能障碍
- 病程多迁延

流行病学

- 年份 时点患病率 终生患病率
- 1982 4.75‰ 5.69‰
- 1993 5.51‰ 6.55‰
- 居民的患病率为1%，精神分裂症同胞患病率为8%，父或母患精神分裂症其子女患病率为16.4%，双亲均患精神分裂症其子女患病率为39.2%，血缘越近患病率越高。



John Forbes **Nash**

A **professor** of Princeton University

A **mathematical genius**

He made an astonishing discovery early in his career and stood on the brink of international acclaim.

But Nash soon found himself on a painful journey of self-discovery once **he was diagnosed with schizophrenia**

After many years of struggle, he eventually triumphed over this tragedy, and finally, late in life, **received the Nobel Prize.**

主要临床表现

■ 具有特征性的症状：

1) 思维散漫 (7) 病理性象征性思维

(2) 思维破裂 (8) 语词新作

(3) 思维中断 9) 原发性妄想

(4) 强制性思维 (10) 情感淡漠


(5) 思维被插入 (11) 情感不协调

(6) 思维被播散 (12) 情感倒错

10 9:55

如果你没有自信的话，
如果你曾经有过自信的话，
请正版的音乐吧。
看正版

社会是进步的也是多彩的，为什么要想那么多，做自己好了。不要想那么多的选择，
每种适合自己的方式，虽重要的那么重要，
但





附加症状：

(1) 行为障碍- 可有动作、行为的增加或减少，有怪异动作

(2) 知觉障碍

最常见的是幻听，其次是幻视、幻嗅、幻味等。

(3) 常见的妄想:被害妄想、关系妄想、嫉妒妄想、夸大妄想、非血统妄想





临床类型

- 偏执型
- 紧张型
- 青春型
- 单纯型
- 未定型



诊断

- 根据病史、体格检查、神经系统检查、精神检查和辅助检查进行综合分析 诊断标准：
- 按照《中国精神障碍分类与诊断标准》第三版中关于精神分裂症的诊断标准，符合下列 3 项标准诊断为精神分裂症：

症状标准（一）

- 至少有下列 2 项，并非继发于意识障碍、智能障碍、情感高涨或低落，单纯型分裂症另有规定。
 - （1）反复出现的言语性幻听；
 - （2）明显的思维松弛、思维破裂、言语不连贯，或思维贫乏或思维内容贫乏；
 - （3）思想被插入、被撤走、被播散、思维中断，或强迫性思维；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/397104141136010000>