

2024 江西省宜黄县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试附参考答案（名师推荐）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于非麻醉性镇咳药的是

- A: 苯丙哌林
- B: 羧甲司坦
- C: 沙丁胺醇
- D: 羟甲唑啉

答案：A

2. 药库管理人员根据药品用量和库存情况提出购药计划，向指定的药品经营单位采购，必须持有

- A: 五专管理
- B: 印鉴卡
- C: 防盗设施
- D: 基数卡

答案：B

3. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受到外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期为胎儿发育的最后阶段，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 碳青霉烯类
- B: 青霉素
- C: 头孢菌素

D: 氟喹诺酮类

答案: D

4. 6 个月~2 岁婴幼儿白细胞计数正常参考区间是

A: $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$

B: $(200 \sim 300) \times 10^9 / L$

C: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$

D: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$

答案: D

5. 患者，女，55 岁，因"反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食"而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力 $<6\text{mmHg}$ ，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

A: 戒烟酒

B: 餐中多饮水

C: 避免高脂饮食

D: 控制体重

答案: B

6. 常见老年人 ADR 的药物类别，硝苯地平可出现面部潮红、心慌、头痛等反应

A: 抗生素

B: 抗胆碱药

C: β 受体阻断剂

D: 钙通道阻滞剂

答案: D

7. (2019 年真题) 患者，男，78 岁，因心房颤动服用华法林治疗 2 年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后 INR 升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是

- A: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高
- B: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高
- C: 氟康唑可抑制 CYP2C9，导致华法林血药浓度升高
- D: 氟康唑可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高

答案：C

8. 血浆半衰期最长的强心苷类药物是

- A: 地高辛
- B: 米力农
- C: 卡维地洛
- D: 洋地黄毒苷

答案：D

9. 表现为“牛肉样舌”的疾病为

- A: 再生障碍性贫血
- B: 巨幼红细胞贫血
- C: 白血病
- D: 缺铁性贫血

答案：B

10. 患者，女 67 岁出现认知功能障碍 5 年，诊断为阿尔茨海默病，予以美金刚治疗。下列药物中，可增加美金刚血药浓度的是 ()

- A: 碳酸氢钠
- B: CYP2D6 抑制剂

C: 氯化铵

D: CYP3A4 制剂

答案: A

11. 肿瘤患者在化疗后出现痛性黏膜炎，可对症给予

A: 劳拉西泮

B: 苯海拉明—利多卡因—氢氧化镁铝

C: 吗啡

D: 醋酸甲地孕酮—地塞米松

答案: B

12. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

B: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征

C: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

D: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎

答案: A

13. 口服或静脉滴注 β 受体拮抗剂用于解救

A: 亚硝酸盐中毒

B: 克仑特罗中毒

C: 异烟肼中毒

D: 麦角胺中毒

答案: B

14. 抗高血压药物的禁忌证双侧肾动脉狭窄（）

- A: 依那普利
- B: 维拉帕米
- C: 美托洛尔
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

15. （2015 年真题）静脉注射阿昔洛韦的适宜溶媒是（）。

- A: 复方氯化钠注射液
- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 0.9 氯化钠注射液

答案：D

16. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药
- B: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用
- C: 瑞格列奈片应于餐前服用
- D: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

答案：B

17. （2018 年真题）使用肝素静脉滴注期间需监测的指标是（）

- A: APTT
- B: RBC
- C: ALT
- D: INR

答案：A

18. (2019 年真题) 患者，女，76 岁，慢性阻塞性肺病病史 10 年，一年来多次因急性加重入院，予以抗感染等治疗。近日因咳嗽咳痰加重再次入院，经验性抗感染治疗时适宜选用的药物是

- A: 头孢他啶
- B: 阿米卡星
- C: 头孢唑林
- D: 阿奇霉素

答案：A

19. 患者，男，72 岁，因腰痛无法起床 1 天就诊。患者已有多年的腰痛病史，经物理疗法后可有所好转。现于久坐之后起立困难，行走为小步慢行，昨夜睡眠正常，早晨自觉腰痛而无法起床。既往无抗癫痫药、抗甲状腺药及糖皮质激素长期服用史。经 X 线检查诊断为腰椎压缩性骨折。

- A: 维生素 D 中毒
- B: 长期服用糖皮质激素
- C: 长期服用抗癫痫药
- D: 老年性骨质疏松症

答案：D

20. 属于胃黏膜保护剂的是 ()

- A: 多潘立酮
- B: 铝碳酸镁
- C: 埃索美拉唑
- D: 法莫替丁

答案：B

21. 患者，女，42 岁。临床诊断“小三阳”，其临床意义是

- A: HBsAg 阳性
- B: HBsAg、HBeAg 和 HBcAb 同为阳性
- C: HBsAg、HBeAb 和 HBcAb 同为阳性
- D: HBeAg 阳性

答案：C

22. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β_2 受体激动剂是

- A: 噻托溴铵
- B: 异丙托溴铵
- C: 沙美特罗
- D: 孟鲁司特

答案：C

23. 硝酸甘油

- A: 血红蛋白量增多
- B: 中性粒细胞减少
- C: 嗜酸性粒细胞减少
- D: 血小板减少

答案：A

24. 患过敏性疾病的驾驶员可选用的药物是

- A: 氯雷他定
- B: 苯海拉明
- C: 赛庚啶
- D: 异丙嗪

答案：A

25. 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 小时后，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病可能，该病例用药与不良反应因果关系评价结果是

- A: 可能无关?
- B: 很可能?
- C: 可能?
- D: 肯定?

答案: B

26. 处方是医院药品消耗及药品经济收入结账的凭证和原始依据，体现其

- A: 法律性
- B: 技术性
- C: 经济性
- D: 有效性

答案: C

27. 以下药物中，用于治疗细菌感染性腹泻应首选的是

- A: 黄连素
- B: 维生素
- C: 谷维素
- D: 抗生素

答案: A

28. 患者，女，76 岁，患阿尔茨海默病，伴严重的肾功能不全，该患者禁用的药物为，

- A: 卡巴拉汀

B: 加兰他敏

C: 多奈哌齐

D: 美金刚

答案: B

29. 对于形似或声似的药品要加用醒目的标识，是针对药品调配环节防范措施中的

A: 保证足够的人力配备

B: 规范操作、坚持核对

C: 及时沟通

D: 环境整齐、安静

答案: D

30. 如果 ACEI 引起干咳可

A: 给予硫酸亚铁

B: 停用 ACEI 或减量

C: 联用他汀类

D: 慎用甲基多巴

答案: A

31. 患者男性，45 岁，反复发作夜间呼吸困难 1 个月，加重 1 天就诊。体格检查：血压 180 / 110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

A: 痰液稀释剂

B: 泼尼松

C: 吗啡

D: 氨茶碱

答案: D

32. 脾功能亢进可见的

- A: 白细胞增多
- B: 红细胞沉降率减慢
- C: 白细胞减少
- D: 淋巴细胞增多

答案：C

33. 属于抗胆碱药的是

- A: 普拉克索
- B: 苯海索
- C: 司来吉兰
- D: 恩托卡朋

答案：B

34. 下列药品中，妊娠期妇女禁用的是

- A: 环丙沙星
- B: 维生素 A
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 拉贝洛尔

答案：A

35. 归属于药历“患者基本情况”内容的是

- A: 联合用药
- B: 医保和费用支付情况
- C: 主要实验室检查数据
- D: 临床诊断

答案：B

36. 癫痫持续状态首选的药物是

- A: 拉莫三嗪
- B: 卡马西平
- C: 丙戊酸钠
- D: 地西洋

答案：D

37. 尤其适用于胸膜炎伴胸痛的干咳患者的药品是

- A: 羧甲司坦
- B: 右美沙芬
- C: 可待因
- D: 苯丙哌林

答案：C

38. 关于透析患者使用磷结合剂的下列叙述错误的是

- A: 透析患者服用磷结合剂的钙剂目的是为了补钙
- B: 透析患者服用钙剂的量大时易出现高钙血症
- C: 高磷血症会导致心脏、血管的钙化
- D: 透析患者服用钙剂必须在进食的同时服用

答案：A

39. 下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法，错误的是：

- A: 需要终身服药
- B: 妊娠期妇女必须联合使用丙硫氧嘧啶
- C: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用
- D: 服用过量可能出现甲状腺激素功能亢进症状

答案：B

40. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 B 级的药物是

- A: 葡萄糖
- B: 万古霉素
- C: 阿莫西林
- D: 沙利度胺

答案：C

41. 服药期间饮酒可引起低血糖反应的是

- A: 硫酸亚铁
- B: 西咪替丁
- C: 格列本脲
- D: 维生素

答案：C

42. 三环类抗抑郁药中毒的临床表现是（）

- A: 明显的锥体外系症状
- B: 心血管毒性
- C: 肌肉震颤、抽搐
- D: 谵妄、躁狂、幻觉

答案：B

43. 发挥局部作用的栓剂是

- A: 甘油栓
- B: 吲哚美辛栓
- C: 阿司匹林栓
- D: 盐酸克伦特罗栓

答案：A

44. 骨髓造血功能较为活跃，某些药物可引起贫血、粒细胞减少、过敏性紫癜等

- A: 水盐代谢
- B: 运动系统
- C: 内分泌系统
- D: 血液系统

答案：D

45. 切忌直接静脉注射，应于临用前稀释，否则不仅会引起剧痛，且可致心脏停搏的药物是

- A: 青霉素
- B: 氯化钾
- C: 头孢曲松钠
- D: 两性霉素 B

答案：B

46. 药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

- A: 抗酸药合用四环素类药
- B: 依他尼酸合用华法林
- C: 用药时同服甲氧氯普胺
- D: 磺胺类药与青霉素合用

答案：B

47. 控制被经济利益驱动的过度药物治疗体现

- A: 安全性
- B: 有效性
- C: 经济性
- D: 规范性

答案：C

48. 不得将咨询档案等患者的资料用于商业目的

- A: 保护患者的隐私
- B: 特别关注特殊人群
- C: 及时回答不拖延
- D: 解释的技巧

答案：A

49. 在治疗口腔溃疡的药品中，可能致使儿童和青年偶发口腔无痛性浅表脱屑损害的是

- A: 西地碘含片
- B: 甲硝唑粘贴片
- C: 左旋咪唑
- D: 氯己定含漱剂

答案：D

50. 用于治疗苯二氮?类药物中毒的特殊解毒剂是

- A: 青霉胺
- B: 乙酰胺
- C: 氟马西尼
- D: 纳洛酮

答案：C

51. 主要用于抗病毒的药物是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 氟胞嘧啶
- C: 阿糖腺苷
- D: 阿糖胞苷

答案: C

52. I 期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价试验阶段。试验对象主要为健康受试者，试验样本数一般为

- A: 36~40 例
- B: 12~13 例
- C: 10~18 例
- D: 20~30 例

答案: D

53. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L、甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考区间 0.56~1.70mmol / L)、总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考区间 <5.2mmol / L)、低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L(正常参考区间 2.1~3.1mmol / L)、高密度脂蛋白胆固醇 1.2mmol / L(正常参考区间 1.2~1.65mmol / L)、血肌酐 50 μ mol / L(正常参考区间 45~84 μ mol / L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 复方利血平
- B: 氢氯噻嗪
- C: 依那普利
- D: 特拉唑嗪

答案: C

54. 可提示完全梗阻性黄疸的是

- A: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- B: $>342 \mu\text{mol/L}$
- C: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

答案：B

55. 结核杆菌生命力顽强，且易产生耐药性，临床采用标准化学治疗方案

- A: 2HRZE / 4HR
- B: 2HRE / 7HR
- C: 2HRZE / 4HR
- D: 3HRZE / 9HR

答案：D

56. 不良反应有恶心、呕吐、心律失常、血压下降及多尿等，个体差异大，应进行血药浓度监测的药物是

- A: 异丙托溴铵气雾剂
- B: 茶碱片
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 孟鲁司特钠咀嚼片

答案：B

57. 提示"胰酶肠溶胶囊不宜嚼碎服用，以免药粉残留口腔内、发生溃疡"，是针对

- A: 交代用药途径及用药方法
- B: 交代药品贮存条件与方法

C: 交代药物的用量

D: 交代用药注意事项

答案: A

58. (2017 年真题) 痛风缓解期宜选用的治疗药物是 ()

A: 泼尼松

B: 阿司匹林

C: 苯溴马隆

D: 秋水仙碱

答案: C

59. 针对单纯严重乙醇中毒同时出现烦躁不安症状的患者，下列救治措施，错误的是 ()

A: 静脉注射 50%葡萄糖注射液 100ml 和胰岛素 20U

B: 静脉滴注维生素 C 注射液 1g

C: 静脉注射纳洛酮 0.4mg 和吗啡 20mg

D: 肌肉注射维生素 B

答案: C

60. 可减弱华法林抗凝作用的药物为

A: 苯巴比妥

B: 布洛芬

C: 阿司匹林

D: 头孢哌酮

答案: A

61. 马兜铃酸可导致药源性肾病的机制是

A: 前列腺素合成障碍

- B: 不可逆性肾小管坏死
- C: 肾间质纤维化
- D: 阻塞肾小管、肾小球

答案：C

62. 溃疡性结肠炎活动期的生化检查标志是

- A: 白细胞计数降低
- B: 凝血酶原时间缩短
- C: 血红蛋白升高
- D: 血沉

答案：D

63. 药物过量、毒性反应、继发反应、后遗效应、致畸、致癌、致突变作用归属

- A: 药动学相互作用
- B: 药理作用
- C: 药物的使用
- D: 药物制剂因素

答案：B

64. 宜溶解于温开水中后服用

- A: 糖浆剂
- B: 胶囊剂
- C: 粉剂
- D: 泡腾片

答案：D

65. 妊娠后 3~5 周服用容易导致胎儿出现肢体、耳、内脏畸形的药物是

- A: 沙利度胺
- B: 四环素
- C: 叶酸拮抗剂
- D: 氯霉素

答案：A

66. 麻醉药品处方印刷用纸为

- A: 淡黄色
- B: 淡绿色
- C: 白色
- D: 淡红色

答案：D

67. (2021 年真题) 患者, 男, 45 岁, 因消化不良 (上腹饱胀, 餐后明显) 来药店咨询。下列说法错误的是 ()

- A: 应除外器质性疾病
- B: Hp 感染是引起消化不良的常见原因
- C: 可用助消化药对症治疗
- D: 进餐时不要摄入过多的液体

答案：B

68. 细菌性尿路感染最常见的致病菌是 ()

- A: 大肠埃希菌
- B: 克雷伯杆菌
- C: 铜绿假单胞菌
- D: 肠球菌

答案：A

69. 发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。中等度热是指体温范围

A: 38.1℃~39.0℃

B: 37.0℃~38.3℃

C: 37.4℃~38.0℃

D: 39.1℃~41.0℃

答案：A

70. 利血平+氢氯噻嗪

A: 抑制氧化代谢反应

B: 造成听神经和肾功能不可逆性损害

C: 抑制乙醛脱氢酶

D: 产生有利的药物相互作用

答案：D

71. 有家族血栓栓塞性疾病史人群禁用的痤疮药是

A: 维A酸

B: 过氧化苯甲酰

C: 口服短效避孕药

D: 米诺环素

答案：C

72. 脂溶性最高，作用快而短的是

A: 苯巴比妥

B: 硫喷妥

C: 戊巴比妥

D: 巴比妥

答案: B

73. (2019 年真题) 下列药物中，适宜在餐前服用的是

A: 伊马替尼片

B: 莫沙必利片

C: 双氯芬酸钠片

D: 头孢辛酯片

答案: B

74. “药师参与临床药物治疗，提供药学服务的重要方式和途径”的工作是

A: 治疗药物监测

B: 静脉药物配置

C: 参与临床药物治疗

D: 处方调剂

答案: A

75. 患者，女，33 岁，患有高铁血红蛋白血症，可选用的治疗药物是

A: 青霉胺

B: 亚甲蓝

C: 纳洛酮

D: N-乙酰半胱氨酸

答案: B

76. 患儿，男，12 岁，连续 3 日夜间咳嗽就诊，首选的止咳药是

A: 右美沙芬

- B: 氨溴索
- C: 苯丙哌林
- D: 糖皮质激素

答案：A

77. 下列药物中不按兴奋剂管理的是

- A: 精神刺激剂
- B: 利尿剂
- C: 钙通道阻滞剂
- D: 蛋白同化激素

答案：C

78. 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是

- A: 预混胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 普通胰岛素

答案：D

79. 除常规检查外，需要检查有无变色、异臭、酸败、干缩、油层析出等变质现象的制剂是

- A: 胶囊剂
- B: 软膏剂
- C: 丸剂
- D: 注射剂

答案：B

80. 患者，女，52岁，患骨质疏松症伴静脉血栓，该患者避免使用的治疗药是

- A: 雷洛昔芬
- B: 特立帕肽
- C: 鲑鱼降钙素
- D: 阿仑膦酸钠

答案：A

81. 应贮存在阴凉处的药物是

- A: 头孢拉定
- B: 重组人促红细胞生成素
- C: 托烷司琼注射剂
- D: 硫酸亚铁片

答案：A

82. 杨某，女，19岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性罗音；WBC $>13\times 10^9/L$ 。

- A: 红霉素
- B: 利福霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 链霉素

答案：C

83. 增加患者出现高血糖或低血糖症隐患的药品是

- A: 头孢哌酮
- B: 利巴韦林
- C: 加替沙星
- D: 拉氧头孢

答案：C

84. 患者，女，35岁，部分发作性癫痫病史12年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有2型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素B。

- A: 糖尿病病情进展
- B: 卡马西平的不良反应
- C: 停用了苯妥英钠
- D: 丙戊酸钠的不良反应

答案：D

85. (2016年真题) 患者，女，64岁，患2型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片0.5gtidpo，瑞格列奈片1mgtidpo，阿托伐他汀钙片20mgqdpo等药物治疗。

- A: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用
- B: 瑞格列奈片应于餐前服用
- C: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何时候固定时间给药
- D: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

答案：A

86. 儿童使用后可造成软骨病，18岁以下儿童禁止使用的药物是

- A: 莫西沙星
- B: 阿奇霉素
- C: 头孢哌酮

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 阿米卡星

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/397160141046010024>