

[2020 年最新]龙岗区人社局、卫健委招聘耳鼻咽喉学科样题及参 考答案[精编版]

(满分 100 分)

单位：_____ 姓名：_____ 分数：_____

[注意事项]

1. 在你拿到试卷的同时将得到一份专用答题卡，所有试题均须在专用答题卡上作答，在试卷或草稿纸上作答不得分。

2. 答题时请认真阅读试题，对准题号作答。

下载提示：本试卷完全由本知识店铺整理近年题目而成的,花了 6 天请个人尊重劳动成果和版权，非网络搬运,请购买后编辑使用

一、名词解释题

1. 固有鼻腔

【答案】固有鼻腔：即通常所指的鼻腔。前起自鼻阈，后至后鼻孔，分内、外、顶、底四壁。

【解析】

2. 先天性鼻部脑膜脑膨出

【答案】先天性鼻部脑膜脑膨出：一部分脑膜、脑组织及脑脊液经过发育不完善的颅裂疝至鼻部而引起的畸形。

【解析】

3. 特应性个体

【答案】特应性个体：带有与变应性疾病发病相关基因的个体。

【解析】

4. 声门旁间隙

【答案】声门旁间隙：该间隙的界限是：前外界是甲状软骨，内下界是弹性圆锥，后界为梨状窝黏膜。原发于喉室的肿瘤，易向外侧的声门旁间隙扩散。

【解析】

5. 鼻中隔血肿

【答案】鼻中隔血肿：是指鼻中隔软骨膜下或骨膜下积血，多为双侧性。

【解析】

6. 纵隔摆动

【答案】纵隔摆动:异物引起一侧支气管部分阻塞时,呼气、吸气时两侧胸腔压力失去平衡,使纵隔向两侧摆动。

【解析】

7. 蝶上筛房

【答案】蝶上筛房:最后筛房如发育侵入蝶骨将形成蝶窦上方的气房,称为蝶上筛房。

【解析】

8. 鼻中隔脓肿

【答案】鼻中隔脓肿:是指鼻中隔软骨膜下或骨膜下积脓,多由鼻中隔血肿继发感染所致。

【解析】

9. 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征

【答案】阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征:一般是指上气道塌陷堵塞引起的呼吸暂停。偷屯夕 蛔恪> 吁逮赋扇嗽?h 的夜间睡眠时间内,至少有 30 次呼吸暂停,每次呼吸暂停时间至少 10s 以上,睡眠过程中吸气气流强度较基础水平降低 50%以上,并伴有动脉血氧饱和度下降 $\geq 4\%$;或呼吸暂停低通气指数(即平均每小时睡眠中呼吸暂停?偷屯夕 拇问?>5。

【解析】

10. 上颌窦牙源性囊肿

【答案】上颌窦牙源性囊肿:上列牙发育障碍或病变形成并突入到上颌窦内的囊肿,包括含牙囊肿和牙根囊肿两种。

【解析】

二、判断题

1. 患不动纤毛综合征的患者易患鼻炎、中耳炎、气管支气管炎。

A. 正确

B. 错误

【答案】A

【解析】

2. 喉白斑病属于喉部癌前病变。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

【解析】

3. 突发性耳聋患者有部分自愈倾向，所以不必积极治疗。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

【解析】

4. 耳聋是前庭病变的主要症状之一。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

【解析】

5. 急性会厌炎又称为急性声门上喉炎。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

【解析】

6. 结核性咽后脓肿一经确诊，应尽早在咽部切开排脓。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

【解析】

7. 食管异物最常见的停留部位为食管中段第二狭窄，其次为食管入口，发生于下段较少见。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

【解析】

8. 临床诊断为鼻咽纤维血管瘤病人应进一步做病理活检，以求获得确切诊断。

A. 正确 B. 错误

【答案】B

【解析】

9. 右侧主支气管较粗短，且与气管纵轴所成的角度较小，故异物容易进入右主支气管。

A. 正确

B. 错误

【答案】A

【解析】

10. 筛骨骨折后顽固性鼻出血经鼻腔填塞无效可考虑结扎颈外动脉。

A. 正确

B. 错误

【答案】B

【解析】

三、填空题

1. 鼻咽癌经咽隐窝由_____侵入颅内，常先侵犯第_____、_____脑神经，继而累及第_____、_____、_____脑神经而发生脑神经受累症状，肿瘤可直接侵犯或转移淋巴结压迫引起第_____、_____、_____脑神经受累，而出现一系列症状。

【答案】破裂孔，V，VI，IV，III，II，IX，X，VIII

【解析】

2. 根据耳源性脑脓肿的临床表现，可将其分为四期，即临床分期：_____、_____、_____和_____。

【答案】初期，潜伏期，显症期，终末期

【解析】

3. 儿童诉单侧性流涕且伴有恶臭者应首先考虑_____；老年人一侧鼻腔排出脓血性鼻涕，经久不愈，应考虑_____。

【答案】鼻腔异物，鼻腔恶性肿瘤

【解析】

4. 急性喉炎的局部症状有_____、_____、_____、_____。

【答案】声嘶，咳嗽，咳痰，喉痛

【解析】

5. 外耳道乳头状瘤主要发生于外耳道_____段。

【答案】软骨

【解析】

四、简答题

1. 简述变应性鼻炎的治疗原则。

【答案】变应性鼻炎的治疗:(1)以鼻内皮质类固醇和抗组胺药为主的综合治疗。(2)适当使用减充血剂。(3)避免与变应原接触。(4)可试用免疫疗法。(5)其他疗法:①降低鼻黏膜敏感性:对下鼻甲黏膜进行冷冻、激光、射频和微波等治疗。②鼻内选择性神经切断术:不首选,如翼管神经、筛前神经等切断等手术。

【解析】

2. 试述窦口鼻道复合体。

【答案】以筛漏斗为中心的附近区域,包括中鼻甲、钩突、筛泡、半月裂、筛漏斗以及额隐窝、前组筛窦和上颌窦的自然开口,如发生解剖变异和病理改变,将直接影响鼻窦的通气引流,导致鼻窦病变,这一解剖区域称为窦口鼻道复合体,这是开展鼻内镜鼻窦手术的解剖基础。鼻内镜鼻窦手术的原则是通过微创手术,解除鼻窦窦口的机械性阻塞,借助鼻腔及鼻窦的黏液、纤毛清除功能,恢复鼻窦窦口正常的通气、引流及鼻腔、鼻窦黏膜的功能,从而解决广泛的鼻窦病变。

【解析】

五、单选题

1. 声带紧张肌为:

- A. 环杓侧肌
- B. 环杓后肌
- C. 环甲肌
- D. 甲杓肌
- E. 杓肌

【答案】C

【解析】

2. 慢性喉炎患者声音嘶哑的病史特点是:

- A. 病程较长,声嘶初为间歇性,后呈持续性
- B. 声嘶呈持续性

C. 病程较长，声嘶逐渐加重，严重者可引起呼吸困难
声嘶，喉痛，血痰，有时可引起呼吸困难
E. 声音粗而有力

D. 进行性

【答案】A

【解析】

3. 咽峡是指：

- A. 鼻咽部
- B. 口咽部
- C. 喉咽部
- D. 鼻咽与口咽交界处
- E. 以上都不正确

【答案】E

【解析】

4. 患者，男，14岁，因鼻塞、反复鼻出血就诊，前鼻镜检查见鼻腔后部有粉红色新生物。首先应考虑：

- A. 鼻咽纤维血管瘤
- B. 出血坏死性息肉
- C. 下鼻甲后端息肉样变
- D. 中鼻甲后端息肉样变
- E. 鼻咽脊索瘤

【答案】A

【解析】

5. 喉返神经受压或损害时，最早出现麻痹的肌肉是：

- A. 外展肌
- B. 咽缩肌
- C. 内收肌
- D. 环甲肌
- E. 以上都不是

【答案】A

【解析】

6. 患者，男，43岁，10个月前无意中发现左颈部包块，无不适感，近2周出现声音嘶哑，无鼻阻、耳闷、涕中带血等表现。检查见颈动脉三角区有直径5cm包块，左右活动好，上下活动欠佳，边界清楚，无粘连，质韧。于包块表面触到搏动，推开血管，于其下面仍可触到包块。依上述描述，最可能的诊断是：

- A. 颈部转移性恶性肿瘤
- B. 颈部血管瘤
- C. 颈部神经鞘膜瘤
- D. 颈部慢性淋巴结炎
- E. 颈部纤维瘤

【答案】C

【解析】

7. 与喉返神经伴行进入喉内的动脉是：

- A. 甲状腺上动脉
- B. 喉上动脉
- C. 甲状腺下动脉
- D. 喉下动脉
- E. 环甲动脉

【答案】D

【解析】

8. 收缩时使声带内收，声门关闭的是：

- A. 环杓后肌
- B. 环杓侧肌和杓肌
- C. 环甲肌
- D. 甲杓肌
- E. 杓会厌肌

【答案】B

【解析】

9. 某患者，左侧颈部胸锁乳突肌前缘及舌骨水平处可见一包块，其上有一瘻孔，触诊，有一索状物指向耳部，耳屏处亦可见一瘻孔，可有干酪样物挤出。最有可能的诊断是：

- A. 甲状舌管瘻
- B. 耳前瘻管
- C. 第一鳃裂瘻
- D. 第二鳃裂瘻
- E. 第三鳃裂瘻

【答案】C

【解析】

10. 鼓膜穿刺最常采用的进针位置是：

- A. 鼓膜任何部位
- B. 鼓膜后上方
- C. 鼓膜前上方
- D. 鼓膜后下方
- E. 鼓膜前下方

【答案】E

【解析】

11. 环状软骨弓为：

- A. 环状软骨的前部，较窄
- B. 环状软骨的前部，较宽

- C. 环状软骨的后部，较窄
E. 环状软骨的两侧部

D. 环状软骨的后部，较宽

【答案】A

【解析】

12. 一患儿有声嘶、犬吠样咳嗽、吸气性呼吸困难伴喉喘鸣 4 天，首先应考虑的疾病是：

- A. 气管、支气管炎
B. 喉白喉
C. 喉痉挛
D. 小儿急性喉炎
E. 喉肿物

【答案】D

【解析】

13. 甲状软骨上缘正中有一“V”形凹陷，称为：

- A. 甲状软骨切迹
B. 甲状软骨上角
C. 甲状软骨下角
D. 喉结
E. 以上都不是

【答案】A

【解析】

14. 某患者左耳流脓 1 年，脓稀不臭。检查发现左鼓膜紧张部穿孔，鼓室有黏膜，不能用的耳局部用药是：

- A. 酚甘油滴耳液
B. 3%双氧水
C. 氯霉素滴耳液
D. 氧氟沙星滴耳液
E. 以上都不是

【答案】A

【解析】

15. 下列有关耳漏的描述，正确的是：

- A. 结核性中耳炎多为血性耳漏
B. 头部外伤后如出现血性耳漏，应疑为颞骨横断骨折
C. 如发现黏液性耳漏应考虑有鼓膜穿孔
D. 耳漏量与疾病程度完全一致
E. 耳漏中如发现胆脂瘤结晶应疑为黏液链球菌性中耳炎

【答案】C

【解析】

16. 骨气导对比试验中，震动的音叉臂距外耳道的距离是：

- A. 5mm
- B. 10mm
- C. 15mm
- D. 25mm
- E. 35mm

【答案】B

【解析】

17. 收缩时将会厌拉向后下方使喉入口关闭的是：

- A. 环杓后肌
- B. 环杓侧肌和杓肌
- C. 环甲肌
- D. 甲杓肌
- E. 杓会厌肌

【答案】E

【解析】

18. 良性位置性眩晕出现的眼震为：

- A. 自发性眼震
- B. 位置性眼震
- C. 变位性眼震
- D. 视动性眼震
- E. 中枢性眩晕

【答案】C

【解析】

19. 关于耳后骨膜下脓肿，说法错误的是：

- A. 乳突炎症经乳突外层骨板溃破入耳后骨膜下形成耳后骨膜下脓肿
- B. 除中耳炎症状外有头痛、高热及不适症状
- C. 诊断性穿刺可抽出脓液
- D. 应与外耳道疖、第一腮裂瘻管鉴别
- E. 治疗应切开引流、抗感染

【答案】E

【解析】

20. 对喉返神经的描述，错误的是：

- A. 迷走神经的分支
- B. 喉的主要运动神经
- C. 左侧绕主动脉弓、右侧绕锁骨下动脉上行
- D. 支配喉内各肌的运动

E. 亦有一些感觉支司声门下黏膜的感觉

【答案】D

【解析】

六、多选题

1. 围成鼓室的结构包括：

- A. 鼓膜
- B. 颞骨岩部
- C. 颞骨鳞部
- D. 颞骨鼓部
- E. 枕部

【答案】A, B, C, D

【解析】

2. 引起双侧声带麻痹的最常见原因是：

- A. 颈部肿瘤
- B. 肺肿瘤
- C. 甲状腺全切术
- D. 喉外伤
- E. 中枢神经疾患

【答案】C, D

【解析】

3. 化脓性中耳炎引起的颞骨并发症包括：

- A. 迷路炎
- B. 岩锥炎
- C. 周围性面瘫
- D. 乙状窦血栓性静脉炎
- E. Bezold 脓肿

【答案】A, B, C

【解析】

4. 喉垂直部分切除术的手术要点正确的是：

- A. 颈阔肌下翻瓣，正中切开带状肌暴露甲状软骨
- B. 甲状软骨正中或偏健侧裂开，并裂开喉腔
- C. 直视下据肿瘤范围切除病侧声带、室带及甲状软骨板
- D. 喉腔缺损用单蒂或双蒂肌瓣修复
- E. 环状软骨与舌骨吻合

【答案】A, B, C, D

【解析】

5. 关于颈部贝佐尔德脓肿，正确的是：

- A. 乳突脓液穿破乳突尖内侧骨壁流入胸锁乳突肌深面，在颈侧形成贝佐尔德脓肿
- B. 同侧颈部疼痛，运动受限
- C. 颈部上方相当于胸锁乳突肌上 1/3 部位压痛明显
- D. 局部穿刺可引起纵隔炎
- E. 尽早切开引流并行乳突手术

【答案】 A, B, C, E

【解析】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/398044060024007001>