北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科找答案》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

Ⅰ C.腰段脊髓

D.腰骶段脊髓

E.骶段脊髓

4、单项选择题：患儿，出生后 3 周发现左颈部肿块，质硬，头偏向左侧，下颌及面部转向右侧，肿块有一定活动度，无触痛。肿块消失的时间约为出生后（ ）。A.2 个月

B.4 个月

C.6 个月

D.5 个月

E.3 个月

5、单项选择题：50 岁以上髋关节骨关节炎病人有明显疼痛和运动障碍者，应首选（ ）。A.髋关节融合术

B.截骨术

C.人工关节置换术

D.关节清理术

E.钻孔减压术

6、单项选择题：儿童股骨干骨折复位标准中不允许的是（ ）。A.对位为 0%

B.成角 15

C.重叠缩短 2cm

D.旋转 15

E.以上都不允许

7、单项选择题：粗隆间骨折常见的并发症是（ ）。A.骨折延迟愈合

B.不愈合

C.髋内翻

D.股骨头缺血性坏死

E.髋关节僵硬

8、单项选择题：女患，诊断为左膝关节单纯滑膜结核，已行滑膜切除术后 3 周，病情恢复平稳，此时对膝关节的处理原则是（ ）。A.待病情稳定后施关节融合术

B.用石膏管型固定于功能位促其骨性强直

C.继续皮牵引 3 个月，避免关节活动

D.逐渐开始练习不负重关节活动

E.必须大运动量加强练习关节活动

9、单项选择题：男性，10岁，外伤后左膝附近肿胀，剧痛，体温达39～40℃，经大剂量抗生素应用3天，效果不明显。体检：急性病容，左大腿下段及膝关节肿胀明显，发红，皮温高，压痛明显，左膝活动受限，X线平片骨质未见破坏，血白细胞19×109/L，中性89%，最佳处理（　）。A.全身支持疗法

B.反复关节穿刺及腔内抗生素注射

C.股骨下端切开引流

D.止痛药物应用

E.血液细菌培养

10、单项选择题：周围神经损伤的治疗方法取决于损伤的病因，有关治疗方法的选择，错误的是（　）。A.髋关节脱位或骨盆骨折所致的坐骨神经损伤，多系压迫性损伤，早期复位后可观察2~3个月，根据恢复情况再决定是否手术

B.切割伤应早期修复

C.火器伤清创同时行修复

D.药物注射伤一般先行局部理疗

E.肱骨骨折造成的桡神经挫伤，若外膜完整，也可先观察

11、单项选择题：早期类风湿性关节炎，除药物治疗外，还应选择（　）。A.截骨术

B.关节清理术

C.关节成形术

D.滑膜切除术

E.钻孔减压术

12、单项选择题：指骨X线片示，骨干中心密度减低区骨皮质膨大，边缘整齐，阴影中心有钙化点。最大可能是（　）。A.骨囊肿

B.内生性软骨瘤

C.成软骨细胞瘤

D.成骨细胞瘤

E.嗜酸性肉芽肿

13、单项选择题：有关骨关节结核，下列哪种情况不适于手术治疗（　）。A.有明显死骨，较大脓肿

B.经久不愈的窦道

C.脊柱结核合并截瘫

D.全身中毒症状严重，衰弱，重度贫血

E.早期全关节结核，为了抢救关节功能

14、单项选择题：判断发育性髋关节脱位复位成功的指标是（　）。A.双下肢等长

B.X线片头臼同心

C.髋部肌张力增强

D.髋关节前方饱满

E.外展试验消失

15、单项选择题：初诊特发性脊柱侧弯最关键的诊断依据是（　）。A.X线片见脊柱弯曲，未见椎体异常

B.X线片上见到椎体破坏

C.X线片上见椎旁软组织影增厚

D.MRI见脊髓空洞

E.CT检查见椎间盘突出

16、单项选择题：新鲜肩关节前脱位常用的治疗方法是（

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/398054137015006063