

呼吸与危重症医学科在职护士理论考试题

1. 某患者，女性，50岁。患慢性支气管炎、阻塞性肺气肿20年，近3年来出现双下肢水肿，2天前感冒后病情加重口唇发绀，神志恍惚，双下肺闻及湿啰音，心率120次/分。为确诊该病人是否出现呼吸衰竭，下列哪项指标最有意义（） [单选题]

*

- A. 发绀的程度
- B. 血气分析 (正确答案)
- C. 呼吸困难的程度
- D. 神志状态
- E. 肺功能检查结果

2. 某患者，女性，60岁。患阻塞性肺气肿10余年，近半年来出现呼吸困难加重，口唇发绀。血气分析： PaO_2 50mmHg， PaCO_2 65mmHg。护士给病人氧疗时应采取（） [单选题] *

- A. 立即吸入高浓度氧
- B. 低浓度、低流量间断给氧
- C. 低浓度、低流量持续给氧 (正确答案)
- D. 酒精湿化给氧
- E. 高流量给氧

3. 某患者，男性，62岁，诊断为“COPD，II型呼衰，肺性脑病”。护理人员应避免使用以下哪项处理措施（） [单选题] *

- A. 持续低流量给氧
- B. 静脉滴注抗生素

C.肌注呋塞米

D.烦躁时使用镇静剂 (正确答案)

E.口服解痉平喘类药物

4. 男性患者，68岁，因肺心病呼吸衰竭入院，入院查体神志清晰，血气分析： pao_2 30mmHg， $paco_2$ 60mmHg，吸氧后神志不清，血气分析 pao_2 70mmHg， $paco_2$ 80mmHg，该患者病情恶化的原因是（） [单选题]*

A、感染加重

B、氧疗不当 (正确答案)

C、气道阻力增加

D、心力衰竭

E、周围循环衰竭

5. 血气分析： PaO_2 ：30mmHg， $PaCO_2$:75mmHg，提示（） [单选题]*

I型呼吸衰竭

II型呼吸衰竭 (正确答案)

肺性脑病

哮喘

6. 患者，男性，入院后诊断呼吸衰竭，呼吸困难明显，持续无创呼吸机辅助呼吸，护士输液时发现患者烦躁，表情淡漠，嗜睡，此时考虑（） [单选题]*

肺脓肿

休克早期

哮喘大发作

肺性脑病 (正确答案)

窒息先兆

7. 某患者入院后意识障碍，能被语言或轻刺激所唤醒醒后能够正确回答问题但反应迟钝，去除刺激后有很快入睡，该患者属于（） [单选题]*

嗜睡(正确答案)

意识模糊

昏睡

意识障碍

8. 该患者病情加重，表现为思维、语言不连贯，对时间、地点、人物的定向力全部障碍，有幻觉，此时患者处于（） [单选题]*

昏迷

昏睡

意识模糊(正确答案)

嗜睡

9. 昏迷病人采取何种体位最为合适（） [单选题]*

头偏向一侧(正确答案)

头高足低位

侧卧位

中凹卧位

10. 54床患者王某，62岁，以“胸痛”入院，入院后遵医嘱报病重，给予心电监护，次日患者感腹胀，小便困难，作为责任护士你该如何处理（） [单选题]*

嘱患者多饮水

按摩下腹部或让患者听流水的声音(正确答案)

遵医嘱给予呋塞米静推

11. 患者张某入院后血压 162/88mmHg，责任护士询问患者既往有高血压病史，且血压一直控制不好，患者无头晕及头痛，作为责任护士一下做法正确的是（） [单选题]*

做好记录即可，不用复测。

半小时内复测，并告知值班医生(正确答案)

一小时内复测。

嘱患者卧床休息即可

12. 呼吸衰竭患者主要的临床表现是（） [单选题]*

水肿

意识障碍

肺心病

缺氧和二氧化碳储留(正确答案)

球结膜水肿

13. 具备以下哪种情况的患者,定为二级护理（） [单选题]*

A、病情趋向稳定的重症患者

B、病情稳定,仍需卧床的患者(正确答案)

C、严重创伤或大面积烧伤的患者

D、生活完全自理且病情稳定的患者

14. 护士延续注册每（）年一次。 [单选题]*

A、1年

B、3年

C、4年

D、5年(正确答案)

15. 下列不属于护理核心制度的是（） [单选题]*

A、护理新业务、新技术准入制度(正确答案)

B、值班、交接班制度

C、护理安全管理制度

D、查对制度

16. 下列哪些病人不需要床头交接班 () [单选题]*

A、手术后患者

B、待产妇及分娩后

C、危重病人

D、病情稳定的患者(正确答案)

17. 无菌包一经打开, 使用时限为 () [单选题]*

A. 最长不得超过 8 小时

B. 最长不得超过 12 小时

C. 最长不得超过 24 小时(正确答案)

D. 最长不得超过 36 小时

18. 发生医院内尿路感染最常见的诱因是 () [单选题]*

A、长期卧床

B、留置导尿管(正确答案)

C、膀胱冲洗

D、膀胱内注射

19. 抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体与启封抽吸的各种溶媒有效期分别为

() [单选题]*

A. 1 小时; 12 小时

B. 1 小时; 12 小时

C. 2 小时；24 小时 (正确答案)

D. 2 小时；36 小时

20. 用 G-1 型消毒剂浓度试纸测试使用中的过氧乙酸或含氯消毒剂浓度应 () [单选题]*

A、每日监测 (正确答案)

B、每周监测一次

C、每周监测二次

D、每月监测一次

21. 您在注射后的医用针头应投入以下哪种容器： () [单选题]*

A、黄色垃圾袋

B、黑色垃圾袋

C、红色垃圾袋

D、黄色标志锐器盒 (正确答案)

E、任何硬质容器

22. 手术体位不当可引起的并发症有 () [单选题]*

A、肺通气不足

B、上呼吸道阻塞 (正确答案)

C、血压下降

D、肢体动脉搏动

23. 输液速度的调节与下列哪项无关 () [单选题]*

A、药液的浓度

B、药液的刺激性

C、病人的年龄

D、输液量的多少 (正确答案)

24. 静脉补钾的原则错误的是 [单选题] *

见尿补钾

速度宜慢

浓度每天 3-6g

使用方法静脉推注 (正确答案)

25. 采集静脉血标本正确的是 [单选题] *

血清使用抗凝管

全血使用普通管

血培养严格执行无菌操作，防止污染 (正确答案)

为减轻痛苦可在输液处采集

26. 测量血压值偏高原因是 [单选题] *

袖带太宽

袖带缠的太松 (正确答案)

手臂位置高于心脏水平

视线高于水银柱弯月面

27. 发生空气栓塞时的正确体位 [单选题] *

左侧卧位

右侧卧位

头低足高位

左侧卧位并头低足高位 (正确答案)

28. 尿失禁的原因 [单选题] *

真性尿失禁

假性尿失禁

压力性尿失禁

以上均是(正确答案)

29. 下列哪项不是胸外心脏按压的有效指征 [单选题]*

扪及大动脉搏动

皮肤苍白转红润

瞳孔散大(正确答案)

自主呼吸恢复

30. 院外获得的细菌性肺炎中，最常见的病菌为：（） [单选题]*

A.金黄色葡萄球菌

B.肺炎链球菌(正确答案)

C.肺炎克雷白杆菌

D.嗜肺军团杆菌

31. 可产生血浆凝固酶的细菌为：（） [单选题]*

A.表皮葡萄球菌

B.金黄色葡萄球菌(正确答案)

C.流感嗜血杆菌

D.军团菌

32. 军团菌肺炎的确定诊断包括：（） [单选题]*

A.痰的革兰氏染色

B.血涂片进行瑞氏染色

C.尿的普通细菌培养

D.动态检测抗体滴度有大于等于4倍升高(正确答案)

33. 具有荚膜并能引起组织坏死的病原菌为：（） [单选题]*

- A.肺炎链球菌
- B.金黄色葡萄球菌
- C.肺炎克雷白杆菌(正确答案)
- D.表皮葡萄球菌

34. 关于肺炎链球菌引起的肺炎的病理生理过程，不正确的说法是：（） [单选题]

*

- A.病变开始于肺的外周
- B.引起原发组织坏死并空洞(正确答案)
- C.首先引起肺泡壁的水肿
- D.分为充血、红肝变、灰肝变、消散等四期

35. 院内获得性肺炎的病原学特点，不正确的是：（） [单选题]*

- A.肺炎球菌很少见(正确答案)
- B.需氧革兰氏阴性杆菌增至约 50%
- C.革兰氏阴性杆菌肺炎病死率较高，约 30%-40%
- D.金黄色葡萄球菌占 10%

36. 男性，35岁，平素体健。4天前淋雨，2天前突然高热40度，伴寒热，咳铁锈色痰伴呼吸困难，胸片示右下肺近心缘处大片密度均匀的实变影，查体口周存在疱疹。本患者最可能的诊断：（） [单选题]*

- A.结核性胸膜炎
- B.绿脓杆菌肺炎
- C.支原体肺炎
- D.肺炎链球菌肺炎(正确答案)

58岁，慢性扁桃体炎病史，近一周来发高热，咳嗽，咯黄臭痰，查体左肺叩诊呈浊音，2天后出现左测胸痛，经检查有胸水，行胸穿，抽出带有恶臭的脓性液体。可能性最大的病原体为：（） [单选题]*

- A.支原体
- B.厌氧菌(正确答案)
- C.葡萄球菌
- D.结核菌

38. 男性，48岁，突然高热寒战6天，胸片为左上大片致密阴影，1天来少尿；查体口唇干燥，四肢厥冷，BP70/60mmHg，中心静脉压5cmH₂O。目前最重要的治疗措施为：（） [单选题]*

- A.静脉滴入青霉素，400万IU
- B.静脉滴入间羟胺
- C.立即气管插管
- D.静脉滴入低分子右旋糖酐500ml(正确答案)

39. 支气管扩张症最常见的病因：（） [单选题]*

- A.支气管内结石
- B.严重的支气管-肺部感染和支气管阻塞(正确答案)
- C.肿瘤压迫
- D.肺囊性纤维化

40. 干性支气管扩张是指：（） [单选题]*

- A.干咳为主
- B.仅有早晨咳嗽、咳痰
- C.纤支镜示支气管黏膜干燥萎缩
- D.仅有反复咳血，一般无咳嗽、咳痰(正确答案)

41.

[单选题]*

- A.支气管动脉先天性解剖畸形
- B.支气管动脉与肺动脉终末支扩张血管瘤破裂 (正确答案)
- C.合并重度支气管炎
- D.支气管发生囊性扩张

42. 女性，55岁，近5年来反复痰中带血或大咳血。轻咳，少量黏液痰，无低热。胸片示右下肺肺纹理粗乱，有多个不规则的环状透亮阴影；余肺清晰。首先考虑可能是：（） [单选题]*

- A.慢性支气管炎
- B.肺脓肿
- C.支气管扩张 (正确答案)
- D.支气管内膜结核

43. 血源性肺脓肿最常见的病原菌：（） [单选题]*

- A.大肠杆菌
- B.产气杆菌
- C.金黄色葡萄球菌 (正确答案)
- D.克雷白杆菌

44. 除使用抗生素外，肺脓肿治疗的另一项关键措施：（） [单选题]*

- A.输血
- B.卧床休息
- C.痰液引流 (正确答案)
- D.手术治疗

45. 最有助于诊断肺脓肿的症状是：（） [单选题]*

- B.咳嗽、咯血
- C.呼吸困难
- D.咯大量脓臭痰 (正确答案)

46. 男性，30岁，间断咳嗽，咳黄痰10余年，加重伴发热一周。痰为脓性恶臭痰，静置有分层，患者多次因支气管扩张住院治疗。查体：T39℃，重度消瘦，急性热病容，咳嗽无力，左下肺固定湿啰音，右下肺管状呼吸音。WBC $19.6 \times 10^9/L$ ，N85%。痰培养提示铜绿假单胞菌3+。X线提示左下肺蜂窝状影，内见小液平，右下肺实变影。该患者确切诊断是：（） [单选题]*

- A.肺结核
- B.支气管扩张并肺部感染 (正确答案)
- C.韦格纳肉芽肿
- D.中叶综合征

47. 患者女性65岁，诊断为支气管扩张，咳血100ml后突然出现胸闷气促、张口瞪目、两手乱抓、大汗淋漓、牙关紧闭，此时患者应取（） [单选题]*

- A.头低足高位，头偏向一侧 (正确答案)
- B.平卧头偏向一侧
- C.端坐位
- D.患侧卧位

48. 下叶后基底段支气管扩张患者宜采取的引流体位是（） [单选题]*

- A.头低脚高俯卧位 (正确答案)
- B.头低脚高仰卧位
- C.头高脚低仰卧位
- D.头高脚低俯卧位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/398071006032006076>