

2024 年甘肃省永靖县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题完整题库答案下载

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 异烟肼抗结核杆菌的机制是

- A: 抑制细胞核酸代谢
- B: 抑制细菌细胞壁的合成
- C: 抑制细菌分枝菌酸合成
- D: 抑制 DNA 螺旋酶

答案：C

2. 对浅表和深部真菌感染都有效的抗真菌药物是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 酮康唑
- C: 灰黄霉素
- D: 特比萘芬

答案：B

3. 监测他汀类药所致肌毒性的临床指标的是

- A: 乳酸脱氢酶
- B: 肌酸激酶
- C: 碱性磷酸酶
- D: 尿淀粉酶

答案：B

4. 抗血小板药西洛他唑属于

- A: 整合素受体阻断剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂
- D: 维生素 K 拮抗剂

答案：B

5. 兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是（）

- A: 羟甲唑啉鼻喷剂
- B: 麻黄碱滴鼻液
- C: 赛洛唑啉滴鼻液
- D: 呋麻滴鼻液

答案：D

6. 右美沙芬与吗氯贝胺合用会出现

- A: 精神症状
- B: 支气管平滑肌痉挛
- C: 反射亢进，异常发热、昏睡
- D: 中枢神经系统和呼吸系统抑制作用增强

答案：C

7. 下列关于钠的作用特点描述，错误的是

- A: 不能调节体内水量的恒定
- B: 维持血压
- C: 调节体液渗透压、电解质及酸碱平衡
- D: 调节体内水量的恒定

答案：A

8. 患者，男，35 岁。大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是()

- A: 林可霉素
- B: 氯霉素
- C: 哌拉西林
- D: 庆大霉素

答案：C

9. (2017 年真题) 应用维生素 B12 治疗巨幼红细胞性贫血 48 小时内，应监测的电解质是 ()

- A: 钙
- B: 锂
- C: 钾
- D: 钠

答案：C

10. 烟酸缺乏时发生

- A: 糙皮病
- B: 成人佝偻病
- C: 夜盲症
- D: 脚气病

答案：A

11. 属于噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂的是

- A: 瑞格列奈
- B: 罗格列酮
- C: 沙格列汀
- D: 格列美脲

答案：B

12. 维生素 C 缺乏时引起

- A: 成人佝偻病
- B: 脚气病
- C: 角膜软化症
- D: 坏血病

答案：D

13. (2021 年真题) 渗透性强，可透过甲板，属于吡啶酮类的抗真菌药物是 ()

- A: 环吡酮胺
- B: 米卡芬净
- C: 克霉唑
- D: 特比萘芬

答案：A

14. (2019 年真题) 患者，男，30 岁，有长期便秘病史，因胃痛就医，诊断为胃溃疡，该患者治疗胃溃疡应避免使用的药物是 ()

- A: 奥美拉唑
- B: 氢氧化铝
- C: 西咪替丁
- D: 雷贝拉唑

答案：B

15. 已用指南推荐剂量或达到 ACEI / ARB 最大耐受剂量后，收缩压 >95mmHg，NYHA 心功能 II ~ III 级、仍有症状的 HFrEF 患者，可用

- A: 伊伐布雷定

B: 美托洛尔

C: 沙库巴曲缬沙坦

D: 卡托普利

答案: C

16. 兼有镇静、催眠、抗惊厥和抗癫痫作用的药物是

A: 苯巴比妥

B: 苯妥英钠

C: 佐匹克隆

D: 卡马西平

答案: A

17. 大剂量可导致 Q-Tc 间期延长的是

A: 西沙必利

B: 多潘立酮

C: 莫沙必利

D: 甲氧氯普胺

答案: A

18. (2018 年真题) 属于电解质补充药, 可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是 ()

A: 多烯磷脂酰胆碱

B: 异甘草酸镁

C: 门冬氨酸钾镁

D: 双环醇

答案: C

19. 属于延长动作电位时程类的广谱抗心律失常的药物是

- A: 普罗帕酮
- B: 胺碘酮
- C: 奎尼丁
- D: 普鲁卡因胺

答案：B

20. 患者，男性，23 岁。患者 2 年前出现咳嗽，低热，气喘，胸闷隐痛，盗汗。经 X 线诊断为“肺结核”，以抗结核药物治疗。

- A: 青霉素
- B: 吡嗪酰胺
- C: 链霉素
- D: 乙胺丁醇

答案：D

21. 奥昔布宁、托特罗定与索利那新的代谢酶是

- A: CYP2C9
- B: CYP3A5
- C: CYP3A4
- D: CYP3A7

答案：C

22. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药的是()。

- A: 甲氧氯普胺
- B: 维生素 B
- C: 托烷司琼
- D: 阿瑞吡坦

答案：A

23. 骨化三醇可引起高钙血症，在服药后应监测血钙和血肌酐浓度，首次监测的时间建议是

- A: 服药后第 4 周
- B: 服药后第 2 周
- C: 服药后第 3 个月
- D: 服药后第 6 个月

答案：A

24. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，口服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 美托洛尔
- C: 替米沙坦
- D: 埃索美拉唑钠

答案：A

25. 成人使用美罗培南一日剂量不得超过

- A: 6g
- B: 4g
- C: 3g
- D: 5g

答案：A

26. 头孢唑林

- A: 肾毒性较大
- B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
- D: 用于非典型病原体感染

答案：A

27. 低分子量肝素发挥抗凝作用主要抑制的凝血因子是

- A: 因子Ⅱa
- B: 因子Ⅹa
- C: 因子Ⅸa
- D: 凝血酶Ⅲ（AT—Ⅲ）

答案：B

28. 米非司酮避孕的主要机制是（）

- A: 抑制乳腺泡发育
- B: 抑制胚胎发育
- C: 抑制受精卵着床
- D: 促进子宫内膜充血增厚

答案：C

29. 患者男性，25 岁。咽炎，注射青霉素后 1 分钟，呼吸急促，面部发绀，心率 130 次/分，血压 60/40mmHg。

- A: 地塞米松+多巴胺
- B: 曲安西龙+异丙肾上腺素
- C: 地塞米松+肾上腺素

D: 地塞米松+去甲肾上腺素

答案: C

30. (2017 年真题) 易发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁肿瘤病是 ()

A: 紫杉醇注射液

B: 注射用盐酸博来霉素

C: 注射用柔红霉素

D: 注射用硫酸长春新碱

答案: A

31. 布地奈德的作用特点是

A: 舒张支气管作用弱且慢，适用于夜间哮喘和痰多的患儿

B: $10 \mu\text{g/ml}$ 为有效治疗浓度， $15-20 \mu\text{g/ml}$ 以上会出现毒性反应

C: 适用于轻度持续型 (2 级以上) 哮喘的长期治疗

D: 不宜长期、单一、过量使用，不宜用于重度哮喘患者，对小于 18 个月的婴幼儿和大多数儿童有效

答案: C

32. 鱼精蛋白可用于救治 ()。

A: 异烟肼中毒导致的神经毒性

B: 肝素过量导致的出血

C: 华法林过量导致的出血

D: 吗啡过量导致的呼吸抑制

答案: B

33. 治疗黏液性水肿的药物是

A: 普萘洛尔

B: 甲状腺片

C: 硫脲类

D: 硫脲类+大剂量碘

答案：B

34. 高血压伴消化性溃疡患者不宜选用的药物是()

A: 卡托普利

B: 普萘洛尔

C: 利血平

D: 哌唑嗪

答案：C

35. 胰岛素依赖型重症糖尿病用

A: 胰岛素皮下注射

B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

C: 艾塞那肽

D: 二甲双胍

答案：A

36. 可缩小皮脂腺，减轻上皮细胞分化()

A: 阿达帕林

B: 异维 A 酸

C: 维 A 酸

D: 过氧苯甲酰

答案：B

37. 不宜口服给药的是

A: 普萘洛尔

B: 硝苯地平

C: 硝酸甘油

D: 胍乙啶

答案：C

38. 不耐酸，口服剂型多制成酯化物的是

A: 克林霉素

B: 罗红霉素

C: 红霉素

D: 克拉霉素

答案：C

39. 原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血可选用

A: 氨甲环酸

B: 维生素 K

C: 尿激酶

D: 低分子肝素

答案：A

40. 铁剂用于治疗

A: 小细胞低血红蛋白性贫血

B: 再生障碍性贫血

C: 溶血性贫血

D: 巨幼红细胞性贫血

答案：A

41. 耳底、耳塞、耳内流黄水等症可选用

A: 1%碘甘油

B: 9%硼酸冰片滴耳液

C: 曲伏前列素

D: 四环素

答案：B

42. 强心苷中毒最早出现的症状是

A: 色视

B: 厌食、恶心和呕吐

C: 房室传导阻滞

D: 眩晕、乏力和视力模糊

答案：B

43. 肺栓塞静脉溶栓更有效的是()

A: 磺达肝癸钠

B: 尿激酶

C: 肝素

D: 华法林

答案：B

44. 患者，男，43 岁，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应合用的药物是

A: 红霉素

B: 奈替米星

C: 庆大霉素

D: 阿莫西林

答案：C

45. 下列关于吉非替尼的描述，错误的是

- A: 常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻
- B: 用药期间应监测肝肾功能
- C: 用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者
- D: 与传统化疗药存在交叉耐药

答案：D

46. 阻止胞苷酸转化为脱氧胞苷酸

- A: 羟基脲
- B: 甲氨蝶呤
- C: 阿糖胞苷
- D: 氟尿嘧啶

答案：A

47. 下列药物属于高选择性非肽类血小板膜糖蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是

- A: 替罗非班
- B: 硫酸亚铁
- C: 阿司匹林
- D: 双嘧达莫

答案：A

48. (2019 年真题) 老年患者长期大剂量使用可引起骨折的药物是 ()

- A: 替普瑞酮
- B: 胶体果胶铋
- C: 复方碳酸钙
- D: 奥美拉唑

答案：D

49. 可减少神经元囊泡释放乙酰胆碱，使平滑肌或横纹肌暂时麻痹，改善膀胱储尿功能的药物是

- A: 奥昔布宁
- B: 西地那非
- C: A 型肉毒毒素
- D: 睾酮

答案：C

50. 噻嗪类利尿药的作用部位是

- A: 远曲小管近端
- B: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- C: Na^+-Cl^- 共转运子
- D: 磷酸二酯酶

答案：A

51. 需停 5 周才能换用单胺氧化酶抑制剂的药物是

- A: 文拉法辛
- B: 吡拉西坦
- C: 氟西汀
- D: 吗氯贝胺

答案：C

52. (2019 年真题) 服用后易出现呃逆、腹胀和嗝气，甚至引起反跳性胃酸分泌增加的药物是 ()

- A: 替普瑞酮
- B: 复方碳酸钙
- C: 胶体果胶铋
- D: 奥美拉唑

答案：B

53. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

A: 肺纤维化

B: 出血性膀胱炎

C: 药物性肝炎

D: 骨髓抑制

答案：A

54. 患者。女,43 岁,左乳浸润性导管癌术后放、化疗 3 年后复发左肺门、左锁骨上、左腋窝淋巴结转移现采用卡培他滨+多西他赛行复发后第一周期化疗化疗后第 2 日,患者出现重度恶心、呕吐,根据化疗药物致吐分级,宜选用的对症治疗药物是 ()

A: 甲氧氯普胺

B: 奥美拉唑

C: 昂丹司琼

D: 地塞米松

答案：C

55. 可特异性拮抗肝素抗凝作用的是

A: 甲萘氢醌

B: 鱼精蛋白

C: 氨甲环酸

D: 酚磺乙胺

答案：B

56. 对四环素不敏感的病原体是 ()

- A: 铜绿假单胞菌
- B: 螺旋体
- C: 肺炎衣原体
- D: 肺炎支原体

答案：A

57. 关于地芬诺酯的叙述，不正确的是()

- A: 可吸附肠内的细菌及有毒气体
- B: 长期应用可产生依赖性
- C: 能提高肠张力，减少肠蠕动
- D: 用于急、慢性功能性腹泻

答案：A

58. 下列有关奎尼丁的叙述，不正确的是

- A: 可用于治疗心房扑动和心房颤动
- B: 可用于强心苷中毒
- C: 具有抗胆碱和仅受体阻断作用
- D: 抑制 Na^+ 内流和 K^+ 外流

答案：B

59. 典型不良反应除消化道反应，还有耳毒性和肾毒性的药物是

- A: 顺铂
- B: 环磷酰胺
- C: 多柔比星
- D: 长春碱类

答案：A

60. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是()

- A: 长春碱类
- B: 多柔比星
- C: 伊立替康
- D: 紫杉醇

答案：C

61. 激动 I1 咪唑啉受体的降压药是

- A: 可乐定
- B: 吡那地尔
- C: 利血平
- D: 肼屈嗪

答案：A

62. 可用于单纯疱疹性角膜炎的药物是

- A: 碘苷
- B: 阿托品
- C: 奥布卡因
- D: 20%甘露醇

答案：A

63. 对于高胆固醇血症造成高危心肌梗死的患者，作为一线治疗药物应选择()

- A: 阿昔莫司
- B: 非诺贝特
- C: 烟酸
- D: 洛伐他汀

答案：D

64. 高血钾的肾损伤患者禁用下列哪种利尿药()

- A: 依他尼酸
- B: 山梨醇
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案：D

65. (2019 年真题) 对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是()

- A: 十一酸睾酮
- B: 西地那非
- C: 特拉唑嗪
- D: 坦洛新

答案：D

66. 关于镇咳药作用强度的比较，正确的是

- A: 可待因>苯丙哌林>喷托维林
- B: 喷托维林>苯丙哌林>可待因
- C: 苯丙哌林>可待因>喷托维林
- D: 苯丙哌林>喷托维林>可待因

答案：C

67. 维生素 K

- A: 促进纤溶
- B: 抑制血小板聚集
- C: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用
- D: 促进凝血因子合成

答案：D

68. 具有强大的抗凝血因子 XA 功能及微弱的抗凝血酶作用,可用于预防深静脉血栓形成的药物是()

- A: 那屈肝素钙
- B: 阿加曲班
- C: 尿激酶
- D: 华法林

答案: A

69. β -内酰胺类抗生素的抗菌机制是

- A: 影响胞浆膜的通透性
- B: 抑制细菌细胞壁的合成
- C: 抑制蛋白质合成的全过程
- D: 影响叶酸代谢

答案: B

70. 广谱肠道驱虫药,用于治疗钩虫(尤其是美洲钩虫)、蛔虫感染的药物是

- A: 吡喹酮
- B: 三苯双脒
- C: 甲硝唑
- D: 乙胺嘧啶

答案: B

71. 属于胰岛素增敏剂的是

- A: 艾塞那肽
- B: 罗格列酮
- C: 瑞格列奈

D: 阿卡波糖

答案: B

72. 用于抗艾滋病病毒的药物是

A: 利巴韦林

B: 阿昔洛韦

C: 拉米夫定

D: 更昔洛韦

答案: C

73. 可以减轻环磷酰胺导致的膀胱毒性的药物是()。

A: 亚叶酸钙

B: 右雷佐生

C: 美司钠

D: 二巯基丙醇

答案: C

74. 乳果糖禁用于

A: 急腹症

B: 妊娠期

C: 肝性脑病

D: 哺乳期

答案: A

75. (2015 年真题) 易导致牙齿黄染的药品是()。

A: 多西环素

B: 头孢哌酮

C: 加替沙星

D: 庆大霉素

答案: A

76. 与其他 NSAID 合用时疗效并不增强，但可增加其他部位出血风险的是

A: 塞来昔布

B: 吲哚美辛

C: 对乙酰氨基酚

D: 阿司匹林

答案: D

77. 可用于重度痤疮（尤其是结节囊肿型痤疮）的药品是

A: 异维 A 酸

B: 过氧苯甲酰

C: 克林霉素

D: 阿达帕林

答案: A

78. 属于孕激素类的是

A: 他莫昔芬

B: 睾酮

C: 己烯雌酚

D: 甲地孕酮

答案: D

79. 破坏 DNA 结构和功能的抗肿瘤药是

A: 5-氟尿嘧啶

B: 环磷酰胺

C: 吉非替尼

D: 多柔比星

答案: B

80. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

A: 乙酰唑胺

B: 托拉塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 氨苯蝶啶

答案: B

81. 通过选择性抑制 5-HT 再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度，从而增强 5-HT 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

A: 阿米替林

B: 舍曲林

C: 度洛西汀

D: 吗氯贝胺

答案: B

82. 长期大剂量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，应注意适当补充

A: 维生素 A 和维生素 D

B: 维生素 E 和叶酸

C: 维生素 B 和维生素 K

D: 维生素 C 和烟酸

答案: C

83. 严重中毒性感染采用

A: 糖皮质激素一般剂量长期疗法

- B: 糖皮质激素小剂量代替疗法
- C: 抗结核病药与糖皮质激素合用
- D: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

答案：D

84. 卡泊三醇禁用于

- A: 低钙血症患者
- B: 高钠血症患者
- C: 低钠血症患者
- D: 高钙血症患者

答案：D

85. 属于 I b 类抗心律失常药且具有抗癫痫作用的是()

- A: 利多卡因
- B: 普鲁卡因胺
- C: 苯妥英钠
- D: 维拉帕米

答案：C

86. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食，增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg / d 治疗。

- A: 80mg
- B: 20mg
- C: 40mg
- D: 100mg

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/405001103121012033>