

学习及考试资料整理汇编

—— 备考冲刺篇 ——

（考点或配套习题突击训练专用）

药理学考试试题及答案

1、应用强心苷治疗时下列哪项是错误的

- A、选择适当的强心苷制剂
- B、选择适当的剂量与用法
- C、洋地黄化后停药
- D、联合应用利尿药
- E、治疗剂量比较接近中毒剂量

答案：C

2、四环素类药物中抗菌作用最强的是

- A、四环素
- B、土霉素
- C、多西环素
- D、米诺环素
- E、替加环素

答案：D

3、可用于解热镇痛，但却能造成凝血障碍的是

- A、麻黄碱
- B、扑热息痛
- C、阿司匹林
- D、吲哚美辛
- E、阿托品

答案：C

4、氟喹诺酮类抗革兰阳性菌的机制是

- A、抑制 DNA 回旋酶
- B、抑制二氢叶酸合成酶
- C、抑制拓扑异构酶IV
- D、抑制二氢叶酸还原酶
- E、抑制 β -内酰胺酶

答案：C

5、具有 Ca^{2+} 通道阻滞作用，可用于治疗慢性心功能不全的药物是

- A、哌唑嗪
- B、肼屈嗪
- C、硝酸甘油
- D、硝苯地平
- E、硝普钠

答案：D

6、可使血 K⁺升高

A、卡托普利

B、氢氯噻嗪

C、两者均是

D、两者均不是

E、硝苯地平

答案：A

7、抗炎效能最小的糖皮质激素药物是

A、氢化可的松

B、可的松

C、曲安西龙

D、甲泼尼松

E、氟轻松

答案：B

8、庆大霉素无治疗价值的感染是

A、铜绿假单胞菌

B、结核性脑膜炎

C、大肠埃希菌所致尿路感染

D、革兰阴性杆菌引起的败血症

E、细菌性心内膜炎

答案：B

9、下列有关毒性反应的叙述，错误的是

A、治疗量时产生

B、多因剂量过大引起

C、危害多较严重

D、临床用药时应尽量避免毒性反应出现

E、三致反应也属于毒性反应

答案：A

10、抢救伴有心肌收缩力减弱并伴有尿量减少的休克病人，最好选用的药物是

A、麻黄碱

B、去甲肾上腺素

C、肾上腺素

D、异丙肾上腺素

E、多巴胺

答案：E

11、硝酸甘油与普萘洛尔共有的作用是

A、减弱心肌收缩力

B、降低血压

C、增大心室容积

D、减慢心率

E、诱发支气管痉挛

答案：B

12、与呋塞米合用，使其耳毒性增强的抗生素是：

A、青霉素类

B、磺胺类

C、四环素类

D、大环内酯类

E、氨基糖苷类

答案：E

13、利尿药的分类及搭配正确的是

A、中效利尿药——布美他尼

B、高效利尿药——阿米洛利

C、低效利尿药——呋塞米

D、高效利尿药——氢氯噻嗪

E、低效利尿药——螺内酯

答案：E

14、糖皮质激素不适用于

A、中毒性菌痢

B、重症伤寒

C、霉菌感染

D、暴发型流行性脑膜炎

E、猩红热

答案：C

15、洋地黄中毒所致的完全性房室传导阻滞禁用

A、阿托品

B、山莨菪碱

C、溴丙胺太林

D、异丙肾上腺素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/405002142243011221>