

2023-24 年河北省海兴县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库附答案【满分必刷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1.（2015 年真题）阿片类镇痛药与阿托品合用，可抑制胃肠蠕动，导致的不良反应是（）。

- A: 低血压
- B: 胆绞痛
- C: 躁狂
- D: 便秘

答案：D

2. 对抗香豆素过量引起的出血可选用（）

- A: 垂体后叶素
- B: 维生素
- C: 维生素 K
- D: 鱼精蛋白

答案：C

3. 螺内酯临床常用于

- A: 脑水肿
- B: 醛固酮升高引起的水肿
- C: 急性肾功能衰竭
- D: 尿崩症

答案：B

4. 属于棘白菌素类的是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 制霉菌素
- C: 特比萘芬
- D: 卡泊芬净

答案：D

5. 由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性的是

- A: 顺铂
- B: 亚叶酸钙
- C: 奥沙利铂
- D: 卡铂

答案：A

6. 缺铁性贫血患者通常口服铁剂治疗，如有条件进行铁蛋白测定，停药应在血清铁蛋白上升到

- A: $30\sim 50\ \mu\text{g/L}$
- B: $20\sim 30\ \mu\text{g/L}$
- C: $10\sim 15\ \mu\text{g/L}$
- D: $3\sim 5\ \mu\text{g/L}$

答案：A

7. 属于膨胀性泻药的是()

- A: 蓖麻油
- B: 硫酸镁
- C: 乳果糖

D: 聚乙二醇 4000

答案：D

8. 下列药物属于第四代头孢菌素的是

A: 头孢吡肟

B: 头孢噻肟

C: 头孢氨苄

D: 头孢呋辛

答案：A

9. 作用于造血祖细胞，促进其增殖和分化，促进成熟细胞向外周血释放的药品是

A: 维生素 B12

B: 人血白蛋白

C: 硫酸亚铁

D: rhGM-CSF

答案：D

10. 地西泮用于

A: 神经源性尿崩症

B: 慢性脑功能不全

C: 早期帕金森病

D: 特发性震颤

答案：D

11. 与第二代溶栓酶相比，瑞替普酶的作用优势不包括()

A: 全身纤溶活性大于链激酶、阿替普酶

B: 血浆半衰期长，栓塞开通率高，给药方便

C: 具有较强的、特异的纤维蛋白选择性

D: 给药较方便，可以为抢救患者赢得时间

答案：A

12. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次 / 日。

A: 多潘立酮

B: 莫沙必利

C: 胰酶

D: 甲氧氯普胺

答案：C

13. 属于 M 期细胞周期特异性的抗肿瘤药是

A: 长春碱

B: 顺铂

C: 氮芥

D: 阿糖胞苷

答案：A

14. 糖皮质激素的药理作用不包括

A: 抗炎

B: 抗病毒

C: 抗休克

D: 免疫抑制

答案：B

15. 耐青霉素酶青霉素类的是

- A: 氨苄西林
- B: 苯唑西林
- C: 哌拉西林
- D: 青霉素 V

答案：B

16. 可使维生素 B

- A: 糖皮质激素
- B: 异烟肼
- C: 丙磺舒
- D: 雌激素

答案：D

17. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是()。

- A: 乙烯雌酚
- B: 氟他胺
- C: 托瑞米芬
- D: 他莫昔芬

答案：B

18. (2020 年真题) 痛风急性发作时首选的药物是

- A: 秋水仙碱
- B: 碳酸氢钠
- C: 非布司他
- D: 苯溴马隆

答案：A

19. 属于非噻吩并吡啶类二磷酸腺苷(ADP)P2Y₁₂受体阻断剂的是

- A: 替罗非班
- B: 阿司匹林
- C: 替格瑞洛
- D: 双嘧达莫

答案：C

20. 链霉素首选用于()

- A: 鼠疫、土拉菌病
- B: 布鲁菌病
- C: 钩端螺旋体病
- D: 伤寒、副伤寒

答案：A

21. 降低心脏前、后负荷，对急性心肌梗死及高血压所致的慢性心力衰竭效果较好()

- A: 多巴酚丁胺
- B: 氨力农
- C: 地高辛
- D: 硝普钠

答案：D

22. 与胆汁酸结合而降血脂的药物是

- A: 洛伐他汀
- B: 烟酸
- C: 考来烯胺
- D: 氯贝丁酯

答案：C

23. 与奥美拉唑-替硝唑合用的三联疗法治疗胃溃疡

- A: 克林霉素
- B: 红霉素
- C: 万古霉素
- D: 克拉霉素

答案：D

24. 又称为腺嘌呤，是生物体内辅酶与核酸的组成和活性成分，具有刺激骨髓白细胞增生作用的是

- A: 小檗胺
- B: 丙酸诺龙
- C: 维生素 B4
- D: 鲨肝醇

答案：C

25. 氨基苷类抗生素的抗菌机制是

- A: 影响叶酸代谢
- B: 影响胞浆膜的通透性
- C: 抑制细菌细胞壁的合成
- D: 抑制蛋白质合成的全过程

答案：D

26. 可中效、稳定的降低糖化血红蛋白的是

- A: 吡格列酮
- B: 阿卡波糖
- C: 西格列汀

D: 胰岛素皮下注射

答案: C

27. 甲羟孕酮口服用于功能失调性子宫出血(功血)止血的用法用量是

A: 一日 30mg, 连服 6 个月

B: 于月经后半周期(撤退性出血的第 16~25 日)开始口服, 一次 10mg, 一日 1 次, 连用 10~14 日, 酌情应用 3~6 个周期

C: 口服一日 4~8mg, 连服 5~10 日

D: 口服, 一次 10~20mg, 每 4~8 小时一次, 连用 2~3 日; 血止后每隔 3 日递减 1/3 剂量, 直至维持量每日 100mg, 连续用药至血止后 21 日停药

答案: D

28. 使用时可引起单抗药综合征的是

A: 他莫昔芬

B: 曲妥珠单抗

C: 氟他胺

D: 阿那曲唑

答案: B

29. 患者, 男, 57 岁, 身高 175cm, 体重 87kg, 诊断为 2 型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服, 500mg, bid。

A: 餐前半小时

B: 餐后半小时

C: 餐后 2 小时

D: 随餐服用

答案: D

30. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向可选用

- A: 低分子肝素
- B: 维生素 K1
- C: 尿激酶
- D: 氨甲环酸

答案：B

31. (2017 年真题) 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的药物是 ()

- A: 伏格列波糖
- B: 阿格列汀
- C: 利拉鲁肽
- D: 那格列奈

答案：A

32. 需要皮下注射的糖尿病治疗药物是

- A: 二甲双胍
- B: 那格列奈
- C: 阿卡波糖
- D: 艾塞那肽

答案：D

33. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次 / 日。

- A: 不会导致催乳素增多
- B: 不会导致锥体外系反应

C: 不会导致 Q~T 间期延长及室性心律失常

D: 不会促进乙酰胆碱的释放

答案: D

34. 关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是()

A: 用药期间需定期测定血红蛋白

B: 用药过量可导致出血并发症

C: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药

D: 对于不同的手术选择的疗程不同

答案: C

35. 属于叶酸类抗代谢类药物的是

A: 长春瑞滨

B: 巯嘌呤

C: 吉西他滨

D: 甲氨蝶呤

答案: D

36. 帕罗西汀用于治疗抑郁症、社交恐怖障碍，成人的起始剂量为每日

A: 60mg

B: 100mg

C: 50mg

D: 20mg

答案: D

37. 患者，男，35 岁。大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是()

A: 林可霉素

B: 哌拉西林

C: 氯霉素

D: 庆大霉素

答案：B

38. 不宜口服给药的药物是

A: 硝苯地平

B: 普萘洛尔

C: 洛伐他汀

D: 硝酸甘油

答案：D

39. 肝功能减退患者可按原治疗量应用而肾功能减退患者需减量使用的是

A: 红霉素

B: 青霉素

C: 氟胞嘧啶

D: 异烟肼

答案：B

40. 变异型心绞痛不宜选用的是

A: 胍乙啶

B: 硝酸甘油

C: 普萘洛尔

D: 硝苯地平

答案：C

41. 可与抗菌药物联合应用的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 嗜热链球菌
- B: 嗜酸乳杆菌
- C: 保加利亚乳杆菌
- D: 地衣芽孢杆菌

答案：D

42. (2020 年真题) 属于高效利尿剂，耳毒性低，适用于有听力缺陷及急性肾衰竭患者的药物是

- A: 呋塞米
- B: 托拉塞米
- C: 布美他尼
- D: 依他尼酸

答案：C

43. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 奥沙利铂
- B: 泼尼松
- C: 顺铂
- D: 吉西他滨

答案：C

44. 具有抗炎作用的他汀类调血脂药是

- A: 阿伐他汀
- B: 普伐他汀
- C: 藻酸双酯钠
- D: 氟伐他汀

答案：B

45. 下述关于留钾利尿药作用特点的描述，正确的是()

- A: 利尿作用强，药效持久
- B: 对肝硬化者无效
- C: 其利尿作用与体内的醛固酮浓度无关
- D: 具有抑制心肌纤维化的功能

答案：D

46. 对心肌梗死患者，若无禁忌，应尽快给予阿司匹林的初始剂量为每日

- A: 150~300mg
- B: 75~150mg
- C: 10~25mg
- D: 25~50mg

答案：A

47. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌引起的肺炎宜选用()

- A: 克林霉素
- B: 万古霉素
- C: 氟康唑
- D: 阿奇霉素

答案：B

48. 氯吡格雷与奥美拉唑因竞争共同的肝药酶而避免联合应用，该肝药酶是

- A: CYP1A2
- B: CYP2D6
- C: CYP2E1
- D: CYP2C19

答案：D

49. (2015 年真题) 可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁止使用的抗菌药物是 ()。

- A: 氨基糖苷类
- B: 林可霉素类
- C: 四环素类
- D: 酰胺醇类 (氯霉素)

答案：A

50. (2019 年真题) 体内代谢迅速，严重过量导致出血时，可用鱼精蛋白拮抗的药物是 ()

- A: 氯吡格雷
- B: 阿司匹林
- C: 依诺肝素
- D: 肝素

答案：D

51. 属于 PDE5 抑制剂的禁忌人群的是

- A: 2 周前发生过心肌梗死或脑卒中
- B: 高血压未得到控制者
- C: 轻度、稳定型心绞痛
- D: 中度的充血性心力衰竭

答案：B

52. 用于较严重的频繁干咳，极量一次 100mg 的药物是

- A: 地塞米松
- B: 右美沙芬

C: 苯丙哌林

D: 可待因

答案: D

53. 属于钙通道阻滞剂的抗心律失常药是()

A: 维拉帕米

B: 普鲁卡因胺

C: 利多卡因

D: 胺碘酮

答案: A

54. 进行透析的急、慢性。肾衰竭患者静脉滴注复方氨基酸注射液 (9AA)，滴速为

A: 不超过 40 滴 / 分

B: 滴速 20~30 滴 / 分

C: 不超过 15 滴 / 分

D: 滴速 80~100 滴 / 分

答案: C

55. 下列关于铁剂的叙述错误的是

A: 最容易吸收的铁剂为三价铁

B: 口服铁剂主要在十二指肠和空肠上段吸收

C: 脂肪泻患者不建议使用

D: 儿童缺铁可能影响其行为和学习能力

答案: A

56. 可诱发或加重支气管哮喘急性发作的药物是()

A: 普萘洛尔

B: 苯妥英钠

C: 利多卡因

D: 奎尼丁

答案：A

57. 可拮抗维生素 B6 或增加维生素 B6 经肾脏排泄，引起贫血或周围神经炎的是

A: 异烟肼

B: 糖皮质激素

C: 雌激素

D: 丙磺舒

答案：A

58. 口服铁剂最常见的不良反应是

A: 便秘

B: 血性腹泻

C: 坏死性胃肠炎

D: 胃肠道反应

答案：D

59. 影响微管的装配，阻碍纺锤体的形成

A: 羟喜树碱

B: 他莫昔芬

C: 紫杉醇

D: 长春碱

答案：D

60. 关于达比加群酯的描述，错误的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 用药期间应监测凝血功能、肝功能
- B: 与阿司匹林联用不会增加出血风险
- C: 应用期间不能口服奎尼丁类药物
- D: 胺碘酮可使达比加群酯血浆浓度提高 50%

答案：B

61. 服用后易出现呃逆、腹胀和暖气,甚至引起反跳性胃酸分泌增加的药物是 ()

- A: 奥美拉唑
- B: 替普瑞酮
- C: 胶体果胶铋
- D: 复方碳酸钙

答案：D

62. (2018 年真题) 低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐,宜选用的止吐治疗方案是 ()

- A: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- B: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- C: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药
- D: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

答案：C

63. 适用于肥胖及单用饮食控制无效的糖尿病患者的是

- A: 格列本脲
- B: 胰岛素
- C: 二甲双胍

D: 西格列汀

答案: C

64. 通过阻断血管紧张素 II 受体而治疗慢性心功能不全的药物是()

A: 美托洛尔

B: 地高辛

C: 氯沙坦

D: 氨力农

答案: C

65. 关于丙硫氧嘧啶的描述，正确的是

A: 使血循环中甲状腺刺激性免疫球蛋白升高

B: 可抑制外周组织的 T

C: 长期应用反馈抑制 TSH 分泌

D: 作用较甲巯咪唑弱

答案: D

66. 双香豆素应用过量可选用的拮抗药是()

A: 氨甲苯酸

B: 鱼精蛋白

C: 维生素 K1

D: 葡萄糖酸钙

答案: C

67. 阿司匹林的主要适应证不包括()

A: 胃溃疡

B: 急性心肌梗死

C: 不稳定型心绞痛

D: 预防血栓形成

答案：A

68. 对急需抗凝处理的患者，以下哪种方案最优()

A: 华法林+低分子量肝素

B: 肝素

C: 华法林

D: 低分子量肝素

答案：A

69. (2021 年真题) 常见不良反应为泌尿生殖系统感染的口服降糖药物是()

A: 沙格列汀

B: 吡格列酮

C: 二甲双胍

D: 达格列净

答案：D

70. 属于超短效胰岛素/胰岛素类似物的是

A: 门冬胰岛素

B: 普通胰岛素

C: 精蛋白锌胰岛素

D: 甘精胰岛素

答案：A

71. 下列不属于治疗前列腺增生的药物是

A: 非那雄胺

B: 特拉唑嗪

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 坦洛新

D: 西地那非

答案: D

72. 为快速杀菌药的抗菌药是()

A: 万古霉素和替考拉宁

B: 万古霉素和林可霉素

C: 氯霉素和替考拉宁

D: 万古霉素和氯霉素

答案: A

73. (2018 年真题) 不属于血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 类药物作用特点是 ()

A: ACEI 可防治高血压患者心肌细胞肥大

B: ACEI 可引起反射性心率加快

C: ACEI 禁用于双侧肾动脉狭窄者

D: ACEI 对肾脏有保护作用

答案: B

74. 通过抑制碳酸酐酶发挥利尿作用的药物是

A: 氢氯噻嗪

B: 呋达帕胺

C: 托拉塞米

D: 乙酰唑胺

答案: D

75. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

- A: CK
- B: Hcy
- C: BUN
- D: Cr

答案：A

76. 普通感冒患者，有打喷嚏、流鼻涕的症状，宜选用的药物是()

- A: 右美沙芬片
- B: 对乙酰氨基酚滴剂
- C: 茶碱缓释片
- D: 氯苯那敏片

答案：D

77. 应用强心苷或停用后 7 日内禁用

- A: 氯化钠
- B: 氯化钾
- C: 枸橼酸钾
- D: 氯化钙

答案：D

78. 下述关于甘油的描述，错误的是

- A: 妊娠期妇女慎用
- B: 用于便秘的治疗
- C: 属于渗透性泻药
- D: 属于润滑性泻药

答案：C

79. 属于 DNA 多聚酶抑制剂的是

- A: 巯嘌呤
- B: 吉西他滨
- C: 甲氨蝶呤
- D: 长春瑞滨

答案：B

80. 伊伐布雷定发挥作用特异性针对

- A: 房室传导
- B: 心房传导
- C: 心室传导
- D: 窦房结

答案：D

81. 痛风首选

- A: 丙磺舒
- B: 非药物治疗
- C: 外源性拉布立酶
- D: 别嘌醇

答案：B

82. 高效抑菌药是

- A: 异烟肼
- B: 头孢菌素
- C: 氯霉素
- D: 磺胺嘧啶

答案：D

83. 属于碳酸酐酶抑制剂的药物是

- A: 布林佐胺
- B: 阿托品
- C: 拉坦前列素
- D: 奥布卡因

答案：A

84. 抑制质子泵而减少胃酸分泌的药物是

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 谷丙胺
- C: 法莫替丁
- D: 奥美拉唑

答案：D

85. 以下关于硫酸阿托品眼用凝胶的叙述，不正确的是

- A: 用于虹膜睫状体炎
- B: 前列腺肥大病人慎用
- C: 为散瞳药
- D: 青光眼禁用

答案：B

86. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是

- A: 左氧氟沙星
- B: 多索茶碱

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 泼尼松龙

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/405324322132012033>