

2024 广西壮族自治区都安瑶族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库大全附参考答案（考试直接用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 若某药的成人剂量是每次 500mg，那么一个体重 35kg 的儿童按体表面积计算每次服用剂量约为

- A: 250mg
- B: 300mg
- C: 350mg
- D: 400mg

答案：C

2. 患儿，男，3 岁半，身高 95cm，体重 16kg 一天前开始发热，20h 左右出现腹泻，约 3h 一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。检查结果：体温 38.8° C，脉搏 118 次/分，呼吸 28 次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 首选口服补液，必要时静脉补液
- B: 腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充电解质
- C: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与微生态制剂同时服用
- D: 益生菌应避免与小檗碱、鞣酸蛋白同时服用

答案：C

3. 由于上市后风险评估，发现其大剂量服用可使患者罹患心肌梗死和心脏猝死的危险增加，从而导致全球撤市的药物是

- A: 阿糖胞苷儿科事件
- B: 罗非昔布
- C: 仙牛健骨颗粒
- D: 西立伐他汀

答案：B

4. 下列药物中，不属于兴奋剂的是

- A: 钙通道阻断剂
- B: β 受体阻断剂
- C: 利尿剂
- D: 精神刺激剂

答案：A

5. (肾功能不全者的抗菌药物给药方案调整)肾功能重度损害时，抗菌药减低至正常剂量的

- A: $1/5 \sim 1/2$
- B: $3/5 \sim 3/4$
- C: $1/7 \sim 1/5$
- D: $1/10 \sim 1/5$

答案：D

6. 新生儿血红蛋白(Hb)正常参考区间是

- A: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9 / L$
- B: $180 \sim 220 g / L$
- C: $(5.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$
- D: $170 \sim 200 g / L$

答案：D

7. 老年糖尿病患者不建议使用

- A: 双胍类
- B: 噻唑烷二酮类
- C: 长效磺脲类
- D: α -葡萄糖苷酶抑制剂

答案：C

8. 透析患者应用时，必须在进食的同时服用，否则无效的药物是

- A: 维生素 D
- B: 促红细胞生成素
- C: 铁剂
- D: 磷结合剂

答案：D

9. 病毒性肝炎、肝硬化等可引起

- A: 尿酸碱度增高
- B: 尿胆红素检测阳性
- C: 尿酸碱度降低
- D: 尿蛋白检测阳性

答案：B

10. 紫外线加速一些药品的氧化、分解

- A: 湿度
- B: 温度
- C: 空气
- D: 日光

答案：D

11. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 停用瑞格列奈片
- B: 停用二甲双胍肠溶片
- C: 停用阿托伐汀钙片
- D: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

答案：B

12. H

- A: 埃索美拉唑
- B: 铝碳酸镁
- C: 法莫替丁
- D: 多潘立酮

答案：C

13. 关于透析患者使用磷结合剂的下列叙述错误的是

- A: 透析患者服用磷结合剂的钙剂目的是为了补钙
- B: 高磷血症会导致心脏、血管的钙化
- C: 透析患者服用钙剂的量大时易出现高钙血症
- D: 透析患者服用钙剂必须在进食的同时服用

答案：A

14. 患者，女，65 岁，今日因天气骤变出现急性支气管炎症状，出现喘息困难，无其他基础疾病，可给予的治疗药物是

- A: N-乙酰半胱氨酸片 600mg bid

B: 喷托维林 25mg tid

C: 沙丁胺醇气雾剂 1~2 喷 q6h

D: 马来酸氯苯那敏片 4~8mg tid

答案: C

15. (2018 年真题) 临床上将酚妥拉明 20mg、多巴胺 20mg、呋塞米 20mg 加入到 5%葡萄糖注射液 250ml 后, 出现黑色沉淀。出现沉淀的原因是 ()

A: 多巴胺和呋塞米发生反应

B: 酚妥拉明和多巴胺发生反应

C: 酚妥拉明在葡萄糖溶液中分解

D: 酚妥拉明和呋塞米发生反应

答案: A

16. “室温”所指温度范围是

A: -5℃~10℃

B: 2℃~10℃

C: 2℃~4℃

D: 10℃~30℃

答案: D

17. 属于胃黏膜保护剂的是 ()

A: 法莫替丁

B: 多潘立酮

C: 铝碳酸镁

D: 埃索美拉唑

答案: C

18. 服用维生素 A、维生素 D 等应该食用的是

- A: 脂肪
- B: 酒
- C: 食醋
- D: 食盐

答案：A

19. 可引起尿肌酐减少的是

- A: 病毒性肝炎
- B: 肺结核
- C: 肾小球肾炎
- D: 再生障碍性贫血

答案：C

20. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 μmol/L (正常值: 男性 180~440 μmol/L)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 控制体重
- B: 低嘌呤饮食
- C: 应用阿司匹林
- D: 适量运动

答案：C

21. 循证医学证据级别和强度最低的是

- A: 单个样本随机对照试验
- B: 大样本病案系列
- C: 专家意见
- D: 同质随机对照试验的系统评价

答案：C

22. 出血是肝素最常见的不良反应，对明显出血者选用的特异性拮抗药是

- A: 地塞米松
- B: 烯丙吗啡
- C: 鱼精蛋白
- D: 氟马西尼

答案：C

23. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 500mol/L；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 阿司匹林
- B: 尼美舒利
- C: 布洛芬
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

24. 患者，男，58 岁，因心前区疼痛 5 年，加重伴呼吸困难入院。入院前 6 年常感心前区疼痛，疼痛性质系紧缩性或压迫感，多于劳累、餐后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg；呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻及湿啰音，心界向左侧扩大，心音减弱。入院诊断为冠心病。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: ACEI/AR

B: 硝普钠、利尿药、ACEI/AR

C: β 受体阻断剂、钙通道阻滞剂、ACEI/ARB

D: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞剂、ACEI/ARB

答案：C

25. 高血压合并心力衰竭不宜用下哪种药物

A: 哌唑嗪

B: 氢氯噻嗪

C: 普萘洛尔

D: 卡托普利

答案：C

26. 即在体内有抗凝作用，又在体外有抗凝作用的药物是

A: 噻氯匹定

B: 尿激酶

C: 华法林

D: 肝素

答案：D

27. 2 型儿童糖尿病者宜首选 ()。

A: 二甲双胍

B: 胰岛素

C: 瑞格美脲

D: 格列喹酮

答案：A

28. 膀胱炎约占尿路感染的 60%以上，致病菌多为 ()

- A: 奈瑟淋病双球菌
- B: 金黄色葡萄球菌
- C: 大肠埃希菌
- D: 白色念珠菌

答案：C

29. 治疗严重先兆子痫的首选药物为

- A: 硫酸镁
- B: 美托洛尔
- C: 氢氯噻嗪
- D: 依那普利

答案：B

30. 属于长效的胰岛素制剂是

- A: 甘精胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 赖脯胰岛素
- D: 精蛋白锌胰岛素

答案：D

31. 剧烈频繁干咳宜选用的药物是

- A: 吗啡
- B: 可待因
- C: 多奈哌齐
- D: 阿司匹林

答案：B

32. 已知 1%(g/mL) 枸橼酸钠溶液的冰点降低值为 0.185°C ，计算其等渗溶液的浓度是()。

- A: 2.61(%, g/mL)
- B: 3.11(%, g/mL)
- C: 2.81(%, g/mL)
- D: 2.91(%, g/mL)

答案：C

33. 患者，女，37 岁，因小腹胀痛 2 月余、加重 5 天就诊。主诉就诊前无明显诱因出现小腹胀痛，阴道不规则流液，流出物呈黄色脓状，量时多时少，下腹及腰骶部间歇性坠痛。间断性院外治疗（口服金刚藤胶囊、阿莫西林胶囊，具体用量不详）。5 天前月经来潮，下腹部坠痛与腰骶部胀痛难忍，遂来院就诊。8 超提示右侧卵巢囊肿、盆腔积液。妇科检查提示外阴发育正常，阴道黏膜充血，有黄色脓性鱼腥臭味白带，宫颈肥大充血并有举痛，子宫大小正常。门诊以“急性盆腔炎、卵巢囊肿、阴道炎”收治入院。

- A: 阿奇霉素
- B: 多西环素
- C: 氧氟沙星
- D: 克林霉素

答案：D

34. 药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到 ADR 时，需要进行因果关系评价。患者，男，45 岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗 1 个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是()

- A: 可能

B: 可能无关

C: 肯定

D: 很可能

答案: C

35. 患者，男，55 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，医师建议首先改变生活方式（控制饮食等）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀 20mg/d 治疗。

A: 20mg

B: 80mg

C: 40mg

D: 60mg

答案: B

36. （2019 年真题）患者，男，64 岁，因右足肿痛就诊。查体：右脚第一趾关节红肿，触痛明显。化验结果：血尿酸 $588.1 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

A: 氢氯噻嗪和辛伐他汀

B: 美托洛尔和辛伐他汀

C: 美托洛尔和赖诺普利

D: 氢氯噻嗪和阿司匹林

答案: D

37. 规范处方行为与操作流程，归属于用药错误预防策略中的

A: 人员培训

B: 管理规范到位

C: 科学发展

D: 环境与流程的优化与持续改进

答案：B

38. 慢性非特异性结肠炎患者服用美沙拉秦期间应定期监测

A: 呼吸功能

B: 脾功能

C: 肾功能

D: 肝功能

答案：C

39. 呋塞米

A: 宜睡前服用

B: 宜餐前服用

C: 宜餐后服用

D: 宜清晨服用

答案：D

40. 按照药品不良反应程度分级标准评判,轻微的反应或疾病,症状不发展,一般无需治疗,应评判为

A: 弱轻度

B: 中度

C: 轻度

D: 重度

答案：C

41. 下列哪种药物是血液透析和腹膜透析均可清除的药物

A: 卡托普利

B: 苯巴比妥、阿司匹林

C: 茶碱、普鲁卡因胺

D: 氯霉素

答案：B

42. 特别适用于碘中毒的是

A: 淀粉溶液

B: 药用炭混悬液

C: 1%氯化钠溶液

D: 1%硫酸镁溶液

答案：A

43. 《2013 版中国居民膳食营养素参考摄入量》建议，成人推荐维生素 D 摄入量为

A: 400IU (10 μ g) / d

B: 2000~4000IU (50~100 μ g) / d

C: 600IU (15 μ g) / d

D: 800~1200IU (20~30 μ g) / d

答案：A

44. 严重肝功能减退者服用经肝、肾两种途径清除的药物时

A: 避免使用

B: 必须减量应用

C: 一般无需调整剂量

D: 须谨慎使用，必要时减量给药

答案：B

45. 吡哌美辛片剂和栓剂所表现的是()。

- A: 同一药物，制成同一剂型，由于制备工艺不同而表现不同
- B: 同一药物，制成同一剂型，由于处方组成不同而表现不同
- C: 同一药物，剂型不同，其起效的快慢、作用强度和持续时间不同
- D: 同一药物，剂型不同，其副作用、毒性不同

答案：D

46. 属于 β 受体激动剂的是

- A: 福莫特罗
- B: 美托洛尔
- C: 乙酰胆碱
- D: 异丙托溴铵

答案：A

47. 用淡红色处方纸书写的是

- A: 第二类精神药品处方
- B: 急诊处方
- C: 普通处方
- D: 第一类精神药品处方

答案：D

48. “以快速、准确地获得问询问题答案”的咨询服务方法步骤是

- A: 确立有效的检索方法、查阅文献
- B: 对问题进行确定并归类
- C: 对文献进行评价、分析和整理
- D: 形成答案并以口头形式提供给询问者

答案：C

49. 患者，男，76 岁，良性前列腺增生症伴前列腺体积增大，适宜选用的药物为

- A: 米多君
- B: 度洛西汀
- C: 特拉唑嗪
- D: 非那雄胺

答案：D

50. 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是（）

- A: 软膏剂
- B: 含漱剂
- C: 直肠栓剂
- D: 滴眼剂

答案：C

51. （2018 年真题）患者，女，30 岁，因感冒所致发热（体温 38.5℃）并伴有头痛、全身酸痛到药店购药，药师应推荐的药品是（）

- A: 萘甲唑啉滴鼻液
- B: 氯苯那敏片
- C: 酚麻美敏片
- D: 对乙酰氨基酚片

答案：D

52. 及时发现并确定“亮菌甲素事件”显示药物警戒的作用是

- A: 发现与规避假、劣药品流入市场
- B: 药品上市前风险评估
- C: 药品上市后风险评估
- D: 发现药品质量问题

答案：A

53. 若空腹服药，则胃排空快，药物在短时间内进入十二指肠与小肠；餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃粘膜的刺激。因此，一般药品适宜餐后服用。

- A: 餐后服用
- B: 餐前服用
- C: 清晨服用
- D: 餐中服用

答案：B

54. 重度哮喘的处理不包括

- A: 给予糖皮质激素
- B: 注射毛花苷 C（西地兰）
- C: 吸氧
- D: 补液

答案：B

55. 治疗时需长期口服维生素的是

- A: 抗癫痫药所致的骨质疏松症
- B: 原发性骨质疏松症
- C: 妇女绝经后骨质疏松症
- D: 老年性骨质疏松症

答案：A

56. 敌百虫中毒应

- A: 禁止使用肟类复能剂
- B: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙

C: 静脉滴注烟酰胺

D: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

答案: D

57. 从事药学服务的药师应具备较好的投诉应对能力，正确、妥善地应对投诉的重要意义是

A: 使患者获得有关的用药指导

B: 警惕与防范用药错误

C: 增进患者对药师工作的信任

D: 提高用药顺应性

答案: C

58. 患者，男，58 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 停用二甲双胍肠溶片

B: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

C: 停用阿托伐他汀钙片

D: 停用瑞格列奈片

答案: A

59. β 受体阻断剂的主要不良反应是

A: 血尿酸升高

B: 直立性低血压

C: 支气管痉挛

D: 足踝部水肿

答案: C

60. 患者，男，65 岁，诊断为高血压(2 级)，同时有哮喘病史，不宜选用的药物是()

- A: 卡托普利
- B: 普萘洛尔
- C: 非洛地平
- D: 多沙唑嗪

答案：B

61. (2019 年真题) 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1，主诉夜间咳嗽、咽部有异物感，平躺时常有反酸、烧心、胸痛伴背痛，自用止咳糖浆无效。查体：咽红，听诊双肺未闻及干湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，血压控制在 140/85mmHg 左右，高脂血症 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 胃食管反流病
- B: 支气管哮喘
- C: 心绞痛
- D: 胃溃疡

答案：A

62. 对严重药品滥用和用药失误的处方，处置的方式是

- A: 应拒绝调配，并按有关规定报告
- B: 拒绝调配
- C: 经改正并签字确认后，方可调配
- D: 准予调配

答案：A

63. 患者，女，77 岁，53kg，既往糖尿病病史 10 年，因“反复尿路感染 4 个月，加重 3 天”来院就诊。4 个月前，患者无明显诱因出现排尿疼痛，间断低热，体温波动在 37.2℃~37.5℃之间，自服左氧氟沙星片 0.29bid 治疗 5 天后好转停药。其间多次反复发作，自服左氧氟沙星片好转。3 天前，患者再次出现尿路刺激症状，自行口服左氧氟沙星 0.29bid 治疗后无明显好转。门诊查尿常规示：白细胞（+++），白细胞计数 463.2 / g1，细菌计数 1262.1 / μl。查体：T37.9℃P86 次 / 分 R21 次 / 分 BP132 / 77mmHg，心、肺听诊无异常，腹平软，无压痛及反跳痛，左肾区叩击痛（+），双下肢无水肿。辅助检查：血常规：白细胞计数 $12.35 \times 10^9 / L$ 、中性粒细胞百分比 86.5%，CRP69.5mg / L。血生化：AST15U / L，ALT11U / L，ALB43.29 / L，Scr669mol / L。尿培养及药敏试验结果：大肠埃希菌（ESBLs+），细菌计数 $>10^5 \text{cfu} / \text{ml}$ ；对左氧氟沙星耐药，对哌拉西林一他唑巴坦、亚胺培南敏感。

- A: 4.5gq8h
- B: 1.5gq8h
- C: 4.5gqd
- D: 1.5gqd

答案：A

64. （2021 年真题）患者，女，65 岁，因乳腺癌接受第二周期化疗。禁用的止吐药物是（）

- A: 甲氧氯普胺
- B: 苯海拉明
- C: 昂丹司琼
- D: 地塞米松

答案：A

65. 常用于退热时的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

A: 静脉注射

B: 肌肉注射

C: 直肠给药

D: 口服给药

答案: C

66. 老年人服用可能出现锥体外系反应的药物是

A: 哌替啶

B: 甲氧氯普胺

C: 苯二氮䓬类药

D: 双嘧达莫

答案: B

67. 以下论述哪项是错误的 ()

A: 普萘洛尔可抑制肾素的分泌

B: 硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全

C: 氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压

D: 氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，以提高疗效、减少不良反应

答案: C

68. 甲基黄嘌呤治疗慢阻肺疾病的不良反应不包括

A: 口渴

B: 室性心律失常

C: 癫痫大发作

D: 头痛失眠

答案: A

69. 处方的法律性是指

A: 处方是药品消耗及药品经济收入结账、患者用药报销的凭证和原始依据

B: 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件

C: 因开具处方或调配处方所造成的医疗差错或事故，医师和药师分别担负有相应的责任

D: 处方由前记、正文与后记三部分组成

答案：C

70. 牙齿黄染及牙釉质发育不全

A: 阿奇霉素

B: 氯霉素

C: 庆大霉素

D: 米诺环素

答案：D

71. (2017 年真题) 容易通过被动扩散透过胎盘屏障的物特点是 ()

A: 分子量大、弱碱性

B: 脂溶性高，分子量小

C: 蛋白结合率高，具有手性、分布容积大

D: 弱酸性蛋白结合率低、半衰期长

答案：B

72. MHT 具体治疗方案,有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的妇女宜选用

A: 单纯孕激素补充治疗

B: 单纯雌激素补充治疗

C: 雌孕激素间隔用药

D: 雌孕激素连续联合用药

答案：D

73. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，血小板 $30 \times 10^9/L$ ，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间 18 秒（正常值 13 秒），骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

- A: 低分子肝素
- B: 维生素 K1
- C: 鱼精蛋白
- D: 维生素 C

答案：C

74. （2017 年真题）下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法，错误的是（）

- A: 随餐服用，并大量饮水，可增加吸收、减少胃肠道刺激
- B: 食管炎为典型不良反应
- C: 口服后 30 分钟内应保持立位或坐位
- D: 应避免同时使用两种双膦酸盐

答案：A

75. 患者，女，28 岁，近一个月出现阴道分泌物增多，痛痒明显，阴道检查时发现粘稠的奶酪样分泌物，经验治疗首选的药物是（）

- A: 头孢曲松钠
- B: 咪康唑
- C: 甲硝唑
- D: 青霉素钠

答案：B

76. 患者，男，56 岁，因高血压常年服用苯磺酸氨氯地平 10mgqd，近期体检血脂指标为 LDL—C4.8mmol / L，药师应建议患者加服

- A: 叶酸
- B: 阿托伐他汀
- C: 二甲双胍
- D: 福辛普利

答案：B

77. 提示"药物都应保存在原始包装中，并不要将瓶外的标签撕掉"，是针对

- A: 药品有效期
- B: 特殊剂型用法
- C: 特殊装置药品
- D: 药品贮存

答案：D

78. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，HR108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 心房颤动？
- B: 窦性心动过缓？
- C: 阵发性室上性心动过速？
- D: 室性期前收缩？

答案：A

79. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 药理作用
- B: 药物的使用
- C: 药物制剂因素
- D: 药动学相互作用

答案：C

80. 属于 A 级高危药品的是

- A: 5%葡萄糖注射液
- B: 血液透析液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 全胃肠外营养液

答案：C

81. 对痛风急性发作者不宜服用，以防发生转移性痛风的是

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 泼尼松
- D: 苯溴马隆

答案：D

82. 能使人长时间忍受肌肉疼痛的是

- A: 蛋白同化激素
- B: 利尿剂
- C: 肽类激素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 麻醉药品

答案：D

83. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 药用炭
- B: 洛哌丁胺
- C: 鞣酸蛋白
- D: 小檗碱

答案：B

84. (2016 年真题) 患者，女，21 岁，未婚，患有甲状腺功能亢进症，应用丙硫氧嘧啶 150mg tid 治疗 4 个月后，出现体重增加，乏力，怕冷，突眼加重，治疗方案应该调整为 ()。

- A: 丙硫氧嘧啶减量并加甲状腺素片
- B: 换用另一种抗甲状腺药物
- C: 加大丙硫氧嘧啶用量
- D: 放射性 ^{131}I 治疗

答案：A

85. 患者，男，12 岁，因纳差、恶心、呕吐、腹泻就诊，主诉里急后重，每小时排便 3~4 次，水样便，初步诊断为急性感染性腹泻，处方如下：

- A: 存在禁忌人群用药

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 存在给药时间不合理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/406004154055011030>