

急救理论知识模拟练习题与参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、对被目击的短暂室颤患者的最佳处理措施为

- A、立即除颤
- B、胸外按压
- C、静脉推注利多卡因
- D、静脉推注胺碘酮

正确答案：A

2、以下情况不应终止评估过程的是

- A、心搏骤停；
- B、神志不清。
- C、呼吸道梗阻；

正确答案：B

3、_____是在事故中汽车可以伤及司机最致命的武器。

- A、方向盘
- B、刹车踏板
- C、离合器
- D、挡风玻璃

正确答案：A

4、行心肺复苏时，按压/通气要求为

- A、30：2
- B、5：1
- C、15：2
- D、15：1

正确答案：A

5、关于成人心肺复苏，正确的是

- A、心脏按压时应两手手指贴于胸壁
- B、心脏按压 50 次/min
- C、成人心脏按压的力度应使胸骨下陷 4-5cm
- D、按压部位在胸骨中下段
- E、双人复苏时人工呼吸与按压之比为 2:5

正确答案：C

6、下列不属于多沙普仑药效学特点的是

- A、增加心排量

- B、可以使潮气量增加，使呼吸频率有限增快
- C、大剂量时可直接兴奋延髓呼吸中枢、脊髓和脑干
- D、该药物主要经过肾脏代谢
- E、小剂量时可刺激颈动脉窦化学感受器，反射性兴奋呼吸中枢

正确答案：D

7、() 2976. 多源性室性期前收缩是指

- A、心电图同一导联上出现两种或两种以上形态的室性期前收缩
- B、心电图同一导联上出现三种或三种以上形态的室性期前收缩
- C、心电图同一导联上出现两种或两种以上形态的 QRS 波群
- D、同一份心电图上出现两种或两种以上形态的 QRS 波群
- E、同一份心电图上出现两种或两种以上形态的室性期前收缩

正确答案：A

8、当怀疑插管位置有问题时，可进行以下判断方法哪些是错误的

- A、可利用洗耳球和 CO₂ 监测器来帮助诊断。
- B、胸骨切迹听诊不能听到呼吸音；
- C、上腹部听诊不应该听到呼吸音；
- D、胸骨切迹压迫触诊导管气囊能感觉到压力波动；

正确答案：B

9、患儿曹某，3 岁，家中进食中突发吸气性呼吸困难伴刺激性干咳，面色发绀。该患儿最可能的诊断是 ()

- A、肺水肿
- B、气管异物
- C、自发性气胸
- D、哮喘发作
- E、急性左心衰

正确答案：B

10、下列哪一动脉为最常用的摸脉点

- A、肱动脉
- B、桡动脉
- C、颞浅动脉
- D、足背动脉
- E、股动脉

正确答案：B

11、() 2767. 18 岁，晨卧床不起，人事不省，多汗，流涎，呼吸困难。

体检：神志不清，双瞳孔缩小如针尖，双肺布满湿罗音，心率 60 次/分，肌束震颤，抽搐，最可能的诊断是_____。

- A、急性安定中毒
- B、急性一氧化碳中毒
- C、急性巴比妥中毒。
- D、急性有机磷中毒
- E、急性氯丙嗪中毒

正确答案：D

12、急性心肌梗死早期(24 小时内)死亡主要原因是

- A、以上都不是
- B、心源性休克
- C、心脏破裂
- D、心律失常
- E、心力衰竭

正确答案：D

13、创伤性休克早期常可出现

- A、血液稀释
- B、血液浓缩
- C、多尿
- D、代谢性酸中毒
- E、呼吸性酸中毒

正确答案：B

14、医院感染主要发生在

- A、陪护人员
- B、医务人员
- C、探视者
- D、门诊、急诊病人
- E、住院病人

正确答案：E

15、患者男性，42 岁，在树丛中割草，不慎被蛇咬伤，现场急救时以下哪项有错

- A、伤口排毒
- B、就地取材，绑扎
- C、切勿奔跑

D、立即呼救

E、抬高伤肢

正确答案：E

16、亚硝酸盐或大剂量美蓝，硫代硫酸钠疗法用于哪项抢救

A、氰化物中毒

B、亚硝酸盐中毒

C、有机磷中毒

D、酒精中毒

E、重金属中毒

正确答案：A

17、目前主张在成功复苏、重建正常心脏节律前，避免过早应用的药物为

A、阿托品

B、肾上腺素

C、利多卡因

D、碳酸氢钠

E、溴苄胺

正确答案：D

18、缓慢心率性心律失常包括以下类型，除了

A、室性早搏

B、窦性心动过缓

C、房室传导阻滞

D、病窦综合征

正确答案：A

19、抢救溺水时，患者的体位应该是

A、头高脚低位

B、俯卧位

C、半卧位

D、平卧位

正确答案：B

20、有关瘧症性瘫痪，以下说法正确的是

A、为紧张型硬瘫

B、病理反射阳性

C、以上都不对

D、病程再长也无肌肉萎縮

E、暗示治疗一般无效

正确答案：C

21、异物卡喉窒息的急救措施为

A、环甲膜穿刺

B、喉镜取异物

C、以上全部

D、Heimlich 手法

正确答案：C

22、通过心率监测，不能辅助判断的指标是

A、休克指数

B、血压变化

C、心肌耗氧量

D、心排血量

E、CO

正确答案：E

23、()1457. 2010 心肺复苏指南推荐的成人心肺复苏的按压/呼吸错误的是：

A、建议在通气过程采用环状软骨加压

B、取消看、听和感觉呼吸

C、避免过度通气

D、非专业人员可单纯胸外心脏按压

正确答案：A

24、患者男性，49 岁。特殊职业，在生产有机磷农药工作中违反操作规定，出现有机磷中毒症状，头晕、头痛、乏力，支气管分泌物增多、呼吸困难，逐渐出现烦躁不安、谵妄、抽搐及昏迷。有机磷农药中毒诊断的主要指标是

A、瞳孔缩小

B、呕吐物

C、意识障碍

D、典型症状

E、全血胆碱酯酶测定

正确答案：E

25、溺水急救首先应

- A、口对口人工呼吸
- B、保持呼吸道通畅
- C、给予强心药
- D、倒水处理
- E、胸外心脏按压

正确答案：B

26、患者男性，38岁，炎热夏天，在外连续工作6小时，出现剧烈头痛、头晕、眼花、耳鸣、呕吐、烦躁不安等症状，体温不高。考虑为

- A、热射病
- B、热痉挛
- C、中暑
- D、热衰竭
- E、日射病

正确答案：E

27、人工冬眠病人，护理中最重要的

- A、按时检查意识和生命体征
- B、降温不宜太快
- C、防止出现寒颤
- D、防止肺部感染
- E、不宜翻身

正确答案：A

28、II度II型房室传导阻滞伴心衰最适宜用

- A、洋地黄
- B、在人工心脏起搏下加洋地黄
- C、血管扩张剂
- D、洋地黄加利尿剂
- E、利尿剂

正确答案：B

29、以下都是高效消毒剂除外

- A、碘伏
- B、过氧乙酸
- C、过氧化氢
- D、金星消毒液

正确答案：A

30、甲亢危象的治疗，哪项是错误的

- A、应用利血平或心得安
- B、地塞米松静滴
- C、纠正水电解质失衡，物理降温
- D、防治感染
- E、口服复方碘或静滴碘化钠，停用抗甲状腺药

正确答案：E

31、应用止血带时错误的方法

- A、前臂和小腿不适于扎止血带
- B、上臂扎止血带时，应扎在下 1/3 处，以防损伤桡神经
- C、止血带与皮肤之间应加衬垫，以免损伤皮肤
- D、上止血带的伤员必须作标记，记上使用止血带日期、时间和部位并挂在醒目的部位，便于观察
- E、止血带应扎在伤口的近心端，并应尽量靠近伤口

正确答案：B

32、最容易出现皮肤弹性下降和眼窝凹陷的水、电解质代谢紊乱是

- A、高渗性脱水
- B、低渗性脱水
- C、高钾血症
- D、水中毒
- E、等渗性脱水

正确答案：B

33、提示胃穿孔最有意义的根据是

- A、腹腔试验穿刺
- B、休克征象
- C、突然腹痛
- D、气腹征象
- E、急性腹膜炎体征

正确答案：D

34、刘某，在海中游泳时不甚溺水，被送到急诊室，查体：神志不清，口流海水，呼吸微弱，心率 45/min，血压 90/60mmHg，医生不在场，护士处理正确的是

- A、立即心外按压
- B、立即呼叫医生等待医嘱

- C、立即头偏一侧，吸出口腔异物，吸氧
- D、先测生命体征
- E、立即心电监护

正确答案：C

- 35、间羟胺用药后血压上升不明显，须
- A、观察 20 分钟后再决定是否增加剂量
 - B、观察 30 分钟后再决定是否增加剂量
 - C、观察 60 分钟后再决定是否增加剂量
 - D、观察 5 分钟后再决定是否增加剂量
 - E、观察 10 分钟后再决定是否增加剂量

正确答案：E

36、灾害事故分类：一般事故界定范围伤病人数_____人以下。

- A、5
- B、9
- C、7
- D、10

正确答案：D

37、男，26 岁，服甲胺磷后昏迷半小时。查体：双肺布满湿罗音，为治疗肺水肿，首选的药物是

- A、硝普钠
- B、呋塞米
- C、阿托品
- D、西地兰
- E、度冷丁

正确答案：C

38、中毒性休克伴有肺水肿时可以输入下列哪种

- A、以上都可以
- B、生理盐水
- C、全血
- D、高渗葡萄糖

正确答案：D

39、患者男性，50 岁，发作性喘憋 7 年，严重发作持续 2 天，体检：呼吸困难，烦躁不安，发绀，心率 128 次/分，律齐，双肺呼吸音低，可闻及少量哮鸣音，未闻及湿罗音，下列哪些治疗时错误的

- A、用镇静剂如苯巴比妥
- B、静滴葡萄糖生理盐水
- C、静滴糖皮质激素
- D、静滴氨茶碱
- E、用抗生素预防感染

正确答案：A

40、正常人血清钾浓度为

- A、5.5-7.5mol/l
- B、3.5-5.5mol/l
- C、2.5-3.5mol/l
- D、4.5-6.5mol/l

正确答案：B

41、女，32岁，因车祸撞伤上腹部2h，腹痛，恶心、呕吐。查体：T37℃。P140次/min，Bp12/9kPa(90/68mmHg)，面色苍白，上腹部皮下瘀血，右侧重，腹胀，全腹有压痛及反跳痛，移动性浊音(+)，肠鸣音减弱，腹腔穿刺抽出不凝固的血，直肠指诊，指套上有暗红色血性大便。最可能损伤的脏器是：

- A、脾破裂
- B、十二指肠破裂
- C、肝破裂
- D、胃破裂

正确答案：C

42、左房室瓣（二尖瓣）狭窄，麻醉诱导时突发呼吸困难、咳嗽、发绀，血压12.0/10kPa（90/80mmHg），脉搏120次/分，提示：

- A、神经源性休克
- B、低血容量性休克
- C、心源性休克；
- D、过敏性休克
- E、感染性休克

正确答案：C

43、判断急性化脓性腹膜炎的主要体征是：

- A、腹胀加重
- B、频繁呕吐
- C、肠鸣音减弱

D、压痛和反跳痛

正确答案：D

44、患者，男，39岁，4小时前突然剧烈头痛，伴呕吐多次。体检：颈部轻度抵抗，克氏征（+），布氏征（+），体温37.2℃，血压140/80mmHg。其他神经系统检查阴性。诊断首先考虑：

A、脑炎

B、偏头痛

C、脑膜炎

D、蛛网膜下腔出血

E、脑出血

正确答案：D

45、小儿头面颈部的面积为

A、9-(12-年龄)

B、9+(12+年龄)

C、9-(10-年龄)

D、9+(12-年龄)

E、9+(10-年龄)

正确答案：D

46、急性左心衰竭的临床表现哪个不正确

A、突然发生呼吸窘迫，咳嗽、喘息，咯白色或粉红色泡沫痰，甚至不断涌出。

B、初期血压就下降。

C、病人被迫坐起，颜面发绀。两肺内早期可闻及哮鸣音，稍晚出现湿性罗音。

D、可有第三或第四心音。心率加快，呈奔马律。可有心房颤动或室性早搏等心律失常。

正确答案：B

47、下列哪种情况可采用人工气道

A、喉头水肿

B、有主动脉瘤压迫或侵犯气管

C、下呼吸道分泌物引起的气道堵塞

D、慢性阻塞性肺疾病（COPD）伴呼吸衰竭

E、颈椎骨折和脱位

正确答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/406124051025010050>