

2023-24 年山东省东明县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题内部题库（考点提分）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 地高辛的中毒血清浓度为()

- A: $>20\text{ng/ml}$
- B: $>50\text{ng/ml}$
- C: $>2\text{ng/ml}$
- D: $>5\text{ng/ml}$

答案：C

2. 噻嗪类利尿药中，属于水溶性的药物是()

- A: 氢氟噻嗪
- B: 氯噻嗪
- C: 苄噻嗪
- D: 氢氯噻嗪

答案：B

3. 华法林过量导致的出血可选用的拮抗剂是()

- A: 硫酸鱼精蛋白
- B: 维生素 K
- C: 维生素 B
- D: 氨甲苯酸

答案：B

4. 属于抗雄激素类，首选用于晚期前列腺癌的药物是

- A: 氟他胺
- B: 甲羟孕酮
- C: 他莫昔芬
- D: 乙烯雌酚

答案：A

5. 熊去氧胆酸的禁忌证不包括

- A: 严重肝功能不全者
- B: 胆道完全梗阻
- C: 哺乳期妇女
- D: 高血压患者

答案：D

6. （2019 年真题）主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而引起抗抑郁作用的药物是（）

- A: 吗氯贝胺
- B: 帕罗西汀
- C: 度洛西汀
- D: 马普替林

答案：B

7. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌证（）

- A: 梗阻性肥厚型心肌病
- B: 急性前壁心肌梗死
- C: 重度主动脉瓣和二尖瓣狭窄
- D: 收缩压<90mmHg 的严重低血压

答案：B

8. 属于留钾利尿药的是

- A: 依普利酮
- B: 依他尼酸
- C: 布美他尼
- D: 托拉塞米

答案：A

9. 可使后者疗效显著下降的是

- A: 氯丙嗪
- B: 维生素 C
- C: 红霉素
- D: 他莫昔芬

答案：B

10. 服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险为降低此风险,应采取的措施是 ()

- A: 不推荐 65 岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防
- B: 用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染
- C: 应长期合用质子泵抑制剂
- D: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用

答案：B

11. 作用广泛，主要用于急性心衰，不宜作为心衰常规治疗的药物是

- A: 地高辛
- B: 多巴胺
- C: 洋地黄毒苷
- D: 米力农

答案：B

12. 婴儿和哺乳期妇女禁用()作为泻药。

- A: 酚酞
- B: 硫酸镁
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 乳果糖

答案：A

13. 抑制碳酸酐酶，利尿作用弱的药物是

- A: 氯苯蝶啶
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米
- D: 氢氯噻嗪

答案：B

14. 抗生素类抗真菌药()

- A: 氟康唑
- B: 两性霉素
- C: 特比萘芬
- D: 阿莫罗芬

答案：B

15. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。若患者不能耐受万古霉素时，可选择替代的药物是（）

- A: 头孢哌酮

- B: 阿米卡星
- C: 替考拉宁
- D: 头孢曲松

答案: C

16. 门冬酰胺酶能抑制蛋白质的合成，使细胞停止于()，从而降低其对甲氨蝶呤的敏感性，限制甲氨蝶呤的骨髓毒性

- A: G
- B: G
- C: G
- D: M 期

答案: C

17. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

- A: 热带念珠菌
- B: 新型隐球菌
- C: 克柔念珠菌
- D: 白色念珠菌

答案: C

18. 属于 III 类抗心律失常药的是

- A: 胺碘酮

B: 利多卡因

C: 普罗帕酮

D: 奎尼丁

答案：A

19. 治疗冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛最为有效的药物是()

A: 比索洛尔

B: 硝酸异山梨酯

C: 氯沙坦

D: 氨氯地平

答案：D

20. 下列属于钾离子竞争性酸抑制剂的药物是

A: 奥美拉唑

B: 米索前列醇

C: 沃诺拉赞

D: 法莫替丁

答案：C

21. 四环素的抗菌作用机制()

A: 影响胞浆膜通透性

B: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成

C: 作用于细菌 70S 核糖体的 50S 亚基，抑制转肽酶

D: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性

答案：B

22. 常用于引产或催产，亦用于产后出血和子宫复原不全

A: 麦角新碱

- B: 缩宫素
- C: 地诺前列酮
- D: 普拉睾酮

答案：B

23. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

- A: 抑酸作用强大，持续时间长
- B: 停药后复发率低
- C: 能有效地抑制夜间基础胃酸分泌
- D: 很少发生耐药

答案：C

24. （2019 年真题）某患儿因高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。

关于奥司他韦预防用药的说法，正确的是（）

- A: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日两次，每次 75mg
- B: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg
- C: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg
- D: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg

答案：B

25. 对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

- A: 替硝唑
- B: 依米丁
- C: 氯喹
- D: 喹碘仿

答案：C

26. 在胃黏膜表面形成屏障的药物是

- A: 法莫替丁
- B: 奥美拉唑
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 谷丙胺

答案：C

27. 糖尿病合并发热、感染者可选用()

- A: 格列喹酮
- B: 格列吡嗪
- C: 胰岛素
- D: 格列齐特

答案：C

28. 属于促性腺激素释放激素类似物的是()

- A: 戈那瑞林
- B: 普拉睾酮
- C: 达那唑
- D: 米非司酮

答案：A

29. 可用于中、重度细菌性感染，半衰期长，可以一日 1 次给药的是

- A: 亚胺培南
- B: 厄他培南
- C: 西司他丁
- D: 美罗培南

答案：B

30. 特布他林属于

- A: 白三烯调节剂
- B: β 肾上腺素受体激动剂
- C: 黄嘌呤类药物
- D: M 胆碱受体阻断剂

答案：B

31. 与阿托品比较，东莨菪碱的特点是

- A: 对胃肠道平滑肌作用强
- B: 中枢镇静作用较强
- C: 对有机磷中毒解救作用强
- D: 对眼的作用强

答案：B

32. 兰索拉唑属于

- A: 胃泌素受体阻断药
- B: H_2 受体阻断药
- C: H^+ , K^+ -ATP 酶抑制剂
- D: M 受体阻断药

答案：C

33. 不溶于水，微溶于有机溶剂的是

- A: 博来霉素
- B: 依托泊苷
- C: 替尼泊苷
- D: 羟喜树碱

答案：D

34. 维生素 C 的主要适应证是

- A: 治疗厌食症
- B: 治疗脂溢性皮炎
- C: 防治坏血病
- D: 治疗佝偻病

答案：C

35. 可能导致牙龈增生的药物是

- A: 拉西地平
- B: 普伐他汀
- C: 普萘洛尔
- D: 依诺肝素

答案：A

36. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
- B: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀
- C: 服药过程中适当补充维生素 B
- D: 若出现低血糖反应，应立即饮用蔗糖水

答案：D

37. 可抑制骨髓造血功能，或引起“灰婴综合征”，新生儿禁用的抗菌药物是

- A: 氨基糖苷类
- B: 酰胺醇类(氯霉素)
- C: 四环素类
- D: 林可霉素类

答案：B

38. 抗菌谱广，对厌氧菌也有强大抗菌活性，对 β -内酰胺酶高度稳定的药物是()

- A: 氨曲南
- B: 美罗培南
- C: 克拉维酸
- D: 他唑巴坦

答案：B

39. 对沙眼、结核性眼病及某些病毒性眼病均有治疗作用的药物是()

- A: 左氧氟沙星
- B: 利福平
- C: 阿托品
- D: 卡替洛尔

答案：B

40. 患者女，孕 8 周，诊断为“甲状腺功能减退症”给予左甲状腺素钠片治疗对该患者的用药指导，错误的是（）

- A: 应于早餐后将一日剂量左甲状腺素钠片一次性用温水送服
- B: 孕期甲减可能对胎儿造成不良影响，服药期间应监测甲功
- C: 左甲状腺素钠极少通过胎盘治疗剂量下对胎儿无不良影响

D: 服用左甲状腺素钠片期间如出现心悸、多汗或体重下降,应及时就诊

答案: A

41. (2019 年真题) 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性, 在充分水化、利尿的同时, 还应给予的药物是 ()

A: 螺内酯

B: 氯化钾

C: 美司钠

D: 二甲双胍

答案: C

42. 雄激素可降低的体内物质是

A: 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)

B: 乳酸脱氢酶 (LDH)

C: 低密度脂蛋白 (LDL)

D: 高密度脂蛋白 (HDL)

答案: D

43. 克罗米通乳膏用于治疗

A: 寻常痤疮

B: 疥疮

C: 体、股癣

D: 蛲虫感染

答案: B

44. 对非磺酰脲类胰岛素促泌剂的描述正确的是

A: 此类药物需在餐前即刻服用

B: 格列美脲属于本类药物

C: 此类药物可降低 2 型糖尿病者的餐前血糖

D: 此类药物不能单独服用

答案：A

45. 某些慢性疾病使用地塞米松长期治疗，为减少外源性激素对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制，推荐给药时间是

A: 上午 8 时左右

B: 中午 12 时左右

C: 下午 4 时左右

D: 空腹

答案：A

46. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年。体检：血压 156 / 96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

A: 水肿

B: 干咳

C: 光过敏

D: 低血糖

答案：B

47. 利多卡因的电生理作用错误的是()

A: 显著减慢传导

B: ERP 相对延长

C: 缩短 APD

D: 降低自律性

答案：A

48. (2018 年真题) 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的调节血脂药是 ()

- A: 辛伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 非诺贝特
- D: 烟酸

答案: A

49. 肝功能不全、哺乳期妇女禁用 ()

- A: 氯霉素
- B: 利福平
- C: 四环素可的松
- D: 夫西地酸

答案: D

50. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用氨溴索的同时，不宜联合应用的药品是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 右美沙芬
- C: 感冒颗粒
- D: 利巴韦林

答案: B

51. 头孢曲松

- A: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染
- B: 肾毒性较大
- C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

答案：C

52. 关于艾塞那肽的描述，不正确的是

- A: 应注意是否有过敏性症状
- B: 适用于糖尿病酮症酸中毒
- C: 服药期间应警惕急性胰腺炎症状
- D: 可造成消化不良

答案：B

53. 为克服服药初期的类早孕反应，双炔失碳酯肠溶片中含有

- A: 炔雌醇
- B: 雌二醇
- C: 去氧孕烯
- D: 维生素 B6

答案：D

54. 患者，男，22 岁，诊断为风湿热，可选用

- A: 万古霉素
- B: 阿莫西林
- C: 苄星青霉素
- D: 双氯西林

答案：C

55. 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

- A: 万古霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 利奈唑胺
- D: 米诺环素

答案：A

56. 仅用于绝经后妇女,不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是()

- A: 阿法骨化醇
- B: 阿仑磷酸钠
- C: 骨化三醇
- D: 雷洛昔芬

答案：D

57. 肝功能不全的心衰患者可选用

- A: 普萘洛尔
- B: 美西律
- C: 地尔硫草
- D: 地高辛

答案：D

58. 抗肿瘤抗生素

- A: 顺铂
- B: 环磷酰胺
- C: 丝裂霉素
- D: 喜树碱类

答案：C

59. 属于维生素 K 类抗出血药的是

- A: 艾曲泊帕乙醇胺
- B: 酚磺乙胺
- C: 甲萘氢醌
- D: 氨甲环酸

答案：C

60. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

- A: 骨髓抑制
- B: 肺纤维化
- C: 出血性膀胱炎
- D: 药物性肝炎

答案：B

61. 低分子量肝素的作用靶点是

- A: 因子Ⅱa
- B: 因子Ⅸa
- C: 凝血酶Ⅲ（AT—Ⅲ）
- D: 因子Ⅹa

答案：C

62. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

- A: 泮托拉唑
- B: 氢氧化铝
- C: 雷尼替丁
- D: 复方碳酸钙

答案：A

63. 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162/80mmHg，心率 72 次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 碳酸钙 D
- B: 双氯芬酸
- C: 辛伐他汀
- D: 氨基葡萄糖

答案：B

64. 属于抗纤维蛋白溶解药的是

- A: 氨甲环酸
- B: 酚磺乙胺
- C: 艾曲泊帕乙醇胺
- D: 甲萘氢醌

答案：A

65. 减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状，其所激动的受体是

- A: α 受体
- B: H
- C: M 受体
- D: N 受体

答案：A

66. 下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

- A: 四环素类
- B: 阿莫西林
- C: 噻嗪类利尿剂

D: 氧化镁

答案: C

67. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

A: Cr

B: BUN

C: Hcy

D: CK

答案: D

68. 禁用于妊娠妇女和小儿的药物是()

A: 氟喹诺酮类

B: 氨基糖苷类

C: 头孢菌素类

D: 大环内酯类

答案: A

69. 属于第四代头孢菌素常用药物的是()。

A: 头孢吡肟

B: 头孢拉定

C: 头孢克洛

D: 头孢克肟

答案: A

70. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC 3.0×10^{12} / L，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 血小板数量
- B: 血清铁蛋白
- C: 血红蛋白测定
- D: 网织红细胞计数

答案：A

71. 用于抗乙肝病毒的药物是

- A: 拉米夫定
- B: 阿昔洛韦
- C: 扎那米韦
- D: 西多福韦

答案：A

72. 下述关于抗眼部细菌感染药物的描述中不正确的是()

- A: 全身给予抗菌药物是眼科细菌感染疾病的首选方法
- B: 对于衣原体感染的治疗主要是抗菌药物治疗
- C: 细菌性眼内炎可采用玻璃体腔内注射方式给予抗菌药物
- D: 对淋球菌性结膜炎可采用全身及眼局部抗菌药物治疗

答案：A

73. 可导致坏死性结肠炎的是

- A: β 受体阻断剂
- B: 利福平
- C: 阿糖胞苷

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 甲氨蝶呤

答案: C

74. 患者，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应选

- A: 奈替米星
- B: 阿莫西林
- C: 红霉素
- D: 庆大霉素

答案：D

75. 可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物

- A: 大环内酯类
- B: 四环素类
- C: 氟喹诺酮类
- D: 氨基糖苷类

答案：C

76. 氨基糖苷类抗生素对哪类细菌无效

- A: 革兰阴性菌
- B: 厌氧菌
- C: 结核杆菌
- D: 铜绿假单胞菌

答案：B

77. 葡萄球菌感染的角膜炎可选用

- A: 多黏菌素 B 滴眼液
- B: 1% 泼尼松滴眼液
- C: 夫西地酸滴眼剂
- D: 金霉素眼膏

答案：C

78. 属于抗雌激素类的是()

- A: 睾酮
- B: 甲地孕酮
- C: 己烯雌酚
- D: 他莫昔芬

答案：D

79. 属于广谱抗心律失常药物的是()

- A: 胺碘酮
- B: 地高辛
- C: 苯妥英钠
- D: 利多卡因

答案：A

80. 患者，男，63 岁，慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者。因近来夜间喘息加重就诊。对其因迷走神经张力过高所致的气道狭窄，宜选用的药物是

- A: 吸入型糖皮质激素
- B: 沙丁胺醇
- C: 白三烯调节剂
- D: 异丙托溴铵

答案：D

81. （2019 年真题）关于蒙脱石散的作用特点及临床使用的说法，错误的是（）

- A: 对伴有感染的腹泻患者，应联合应用有效的抗菌药物治疗

B: 不被胃肠道吸收，对中枢神经及心血管系统无不良影响

C: 腹泻患者宜在两餐之间服用

D: 直接服用或调成糊状、丸状服用

答案：D

82. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

A: 双歧杆菌三联活菌

B: 洛哌丁胺

C: 蒙脱石

D: 口服补液盐

答案：B

83. 阿托品对眼部的作用特点是()

A: 扩瞳，降低眼压

B: 缩瞳，降低眼压

C: 缩瞳，调节麻痹

D: 扩瞳，调节麻痹

答案：D

84. 可与硝酸酯类药物发生相互作用的是

A: 呋塞米

B: 丙酸睾酮

C: 伐地那非

D: 坎利酮

答案：C

85. 选择性雌激素受体调节剂可能增加静脉血栓栓塞事件的危险性，危险性最大的时期是

- A: 治疗初始时 4 个月内
- B: 治疗开始 6 个月后
- C: 治疗初始时 1 个月内
- D: 治疗初始时 2 个月内

答案：A

86. 属于非磺酰脲类胰岛素促泌剂的是

- A: 阿卡波糖
- B: 瑞格列奈
- C: 罗格列酮
- D: 艾塞那肽

答案：B

87. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。

医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 埃索美拉唑钠
- C: 美托洛尔

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 替米沙坦

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/406213022105011030>