

## 2024 年河北省涿鹿县《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题通关秘籍题库附答案 【夺分金卷】

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于促动力药的是()

- A: 胶体果胶铋
- B: 奥美拉唑
- C: 莫沙必利
- D: 胃蛋白酶

答案：C

2. 属于肾小管上皮细胞钠离子通道抑制剂的是()

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 阿米洛利
- D: 呋塞米

答案：C

3. 通过激动胰高血糖素样肽-1 受体降低血糖的药物

- A: 艾塞那肽
- B: 二甲双胍
- C: 胰岛素皮下注射
- D: 刺激胰岛  $\beta$  细胞释放胰岛素

答案：A

4. 阿司匹林抗血栓形成的机制是

- A: 环氧酶失活，减少 TXA<sub>2</sub> 生成，产生抗血栓形成作用
- B: 降低凝血酶活性
- C: 直接对抗血小板聚集
- D: 激活抗凝血酶

**答案：A**

5. 关于硝基呋喃类，下列叙述哪项是错误的

- A: 血浆药物浓度低
- B: 口服吸收好
- C: 抗菌谱广
- D: 耐药率低

**答案：B**

6. 目前首选的口服减肥药是

- A: 奥利司他
- B: 鲑降钙素
- C: 阿法骨化醇
- D: 阿仑膦酸钠

**答案：A**

7. 局部抗炎作用较弱的长效糖皮质激素是

- A: 氢化可的松
- B: 泼尼松
- C: 地塞米松
- D: 倍他米松

**答案：C**

8. 广谱肠道驱虫药，用于治疗钩虫（尤其是美洲钩虫）、蛔虫感染的药物是

- A: 吡喹酮
- B: 甲硝唑
- C: 三苯双脒
- D: 乙胺嘧啶

**答案：C**

9. 碘化物的主要不良反应是

- A: 血管神经性水肿
- B: 甲状腺素
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 粒细胞下降

**答案：A**

10. 关于枸橼酸铋钾用药注意事项的说法，错误的是

- A: 为了更好地保护胃黏膜，可与牛奶同服
- B: 服药期间口中可能带有氨味并可使舌苔及大便灰黑色
- C: 妊娠期妇女、肾功能不全者禁用
- D: 如有服用左甲状腺素，需间隔 2 小时服用

**答案：A**

11. 属于磷酸二酯酶抑制剂的是

- A: 替罗非班
- B: 替格瑞洛
- C: 双嘧达莫
- D: 氯吡格雷

**答案：C**

12. 止吐方案：每日化疗前，应用 5-HT

- A: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- B: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- C: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- D: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

**答案：B**

13. 阿卡波糖降血糖作用的机制是

- A: 拮抗胰岛高血糖素的作用
- B: 竞争性抑制  $\alpha$ -葡萄糖苷酶，减少碳水化合物的水解
- C: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性
- D: 增强胰岛素的作用

**答案：B**

14. 有良好的促动力作用，无心脏不良反应的是

- A: 奥关拉唑
- B: 碳酸钙
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 莫沙必利

**答案：D**

15. 常用于痤疮的治疗，因易引起前庭神经毒性，已不作为脑膜炎治疗药的是

- A: 青霉素
- B: 氯霉素
- C: 米诺环素
- D: 多西环素

**答案：C**

16. 钩端螺旋体病、梅毒、回归热的首选药的是()

- A: 克林霉素
- B: 青霉素
- C: 氯霉素
- D: 两性霉素 B

**答案：B**

17. 毛果芸香碱的作用特点不包括()

- A: 开放前房角降低眼压
- B: 减少房水生成
- C: 收缩睫状肌，使小梁网眼张开
- D: 缩小瞳孔，拉紧虹膜

**答案：B**

18. 抢救糖尿病合并酮症酸中毒患者

- A: 二甲双胍
- B: 静脉用胰岛素
- C: 刺激胰岛  $\beta$  细胞释放胰岛素
- D: 胰岛素皮下注射

**答案：B**

19. 下列药物除哪项外都属于钙拮抗剂

- A: 维拉帕米
- B: 硝苯地平
- C: 地尔硫
- D: 溴苄铵

**答案：D**

20. 对爆发性或严重的组织胞浆菌感染首选的药物是

- A: 伏立康唑
- B: 氟胞嘧啶
- C: 灰黄霉素
- D: 两性霉素 B

**答案：D**

21. 30 岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L。诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

- A: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离
- B: 选择适宜的病期、疗程和监测
- C: 尽量选择三价铁
- D: 注意预防铁负荷过重

**答案：C**

22. 使淋巴细胞溶解，致淋巴细胞耗竭

- A: 氟他胺
- B: 昂丹司琼
- C: 亚叶酸钙
- D: 地塞米松

**答案：D**

23. 成人使用乙胺嘧啶用于疟疾的预防，服用的时间是

- A: 应于进入疫区前 6~8 天开始服用，一般宜服至离开疫区后 6~8 天
- B: 应于进入疫区前 1~2 天开始服用，一般宜服至离开疫区后 1~2 天
- C: 应于进入疫区前 1~2 周开始服用，一般宜服至离开疫区后 1~2 周

D: 应于进入疫区前 1~2 周开始服用，一般宜服至离开疫区后 6~8 周

**答案: D**

24. 用药期间可引起眼泪、尿、粪、痰等呈橘红色的药物是

A: 乙胺丁醇

B: 异烟肼

C: 利福平

D: 链霉素

**答案: C**

25. 抗菌谱广，对厌氧菌也有强大抗菌活性，对  $\beta$ -内酰胺酶高度稳定的药物是()

A: 氨曲南

B: 美罗培南

C: 克拉维酸

D: 他唑巴坦

**答案: B**

26. (2019 年真题) 患者，女，32 岁，孕 2 周，既往有癫痫病史，长期服用卡马西平治疗，为防止引起新生儿出血，该患者妊娠晚期应当补充的维生素是()

A: 叶酸

B: 维生素 D

C: 维生素 B12

D: 维生素 K

**答案: D**

27. 头孢唑林

- A: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
- B: 用于非典型病原体感染
- C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- D: 肾毒性较大

**答案：D**

28. 为快速杀菌药的抗菌药是()

- A: 万古霉素和替考拉宁
- B: 万古霉素和氯霉素
- C: 氯霉素和替考拉宁
- D: 万古霉素和林可霉素

**答案：A**

29. 下述药物中不可用于治疗疥疮的是

- A: 林旦霜
- B: 硫黄软膏
- C: 过氧苯甲酰
- D: 苯甲酸苄酯

**答案：C**

30. 以下哪个选项不是二磷酸果糖的不良反应

- A: 尿潜血、血色素尿
- B: 乳酸中毒
- C: 低钠及低磷血症
- D: 低钾血症

**答案：C**

31. 对曲霉无效的药物是

- A: 伏立康唑
- B: 氟康唑
- C: 伊曲康唑
- D: 两性霉素 B

**答案：B**

32. 作用与第二代头孢菌素相似，对大多数超广谱  $\beta$ -内酰胺酶稳定的药物是

- A: 四环素
- B: 头孢米诺
- C: 红霉素
- D: 阿奇霉素

**答案：B**

33. 可使呋达帕胺利尿作用增强的是

- A: 考来烯胺
- B: 拟交感药
- C: 胺碘酮
- D: 多巴胺

**答案：D**

34. 镇静作用明显的 H

- A: 组胺
- B: 西咪替丁
- C: 苯海拉明
- D: 阿司咪唑

**答案：C**

35. 正常成人一次口服 20mg / kg，1 小时后血清中浓度达到最高，血浆半衰期为 2 小时，连续服药 7 日未见蓄积倾向，进入体内后在骨及肾脏中浓度最高，随尿液排出 8%~16%，随粪便排出 82%~94%的是

- A: 帕米膦酸二钠
- B: 唑来膦酸
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 依替膦酸二钠

**答案：D**

36. (2019 年真题) 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

- A: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用
- B: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦
- C: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用 ACEI 36 小时后方可转换
- D: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦

**答案：A**

37. (2021 年真题) 用于验光配镜屈光度检查前散瞳的药物是 ( )

- A: 雷珠单抗注射液
- B: 聚乙二醇滴眼液
- C: 毛果芸香碱滴眼液
- D: 硫酸阿托品眼用凝胶

**答案：D**

38. 雷尼替丁在使用中应注意

- A: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用
- B: 对食管有刺激性，需整片吞服
- C: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗

D: 糖尿病患者避免使用

**答案: D**

39. (2019 年真题) 患者女, 58 岁, 血糖升高 10 年, 口服二甲双胍治疗, 高血压病史 5 年, 未规律治疗, 近期查体: 血压 158/95mmHg, 尿常规示蛋白尿 (+++), 适宜该患者使用的降压药物是 ( )

A: 依那普利

B: 硝苯地平

C: 甲基多巴

D: 普萘洛尔

**答案: A**

40. 良性前列腺增生药物治疗的短期目标是

A: 延缓疾病临床进展

B: 缓解患者的下尿路症状

C: 预防急性尿潴留

D: 缓解患者的上尿路症状

**答案: B**

41. (2019 年真题) 患者, 男, 34 岁, 晨起出现上腹部剧烈疼痛, 考虑为胃肠道平滑肌痉挛, 适宜该患者使用的治疗药物是 ( )

A: 多潘立酮

B: 酚妥拉明

C: 山莨菪碱

D: 溴吡斯的明

**答案: C**

42. 抗酸作用较强, 有收敛、止血和引起便秘作用

- A: 氢氧化铝
- B: 氢氧化镁
- C: 碳酸钙
- D: 三硅酸镁

**答案：A**

43. 患者，男，55 岁，诊断为良性前列腺增生症，服用非那雄胺片治疗，最有可能发生与用药相关的不良反应是()。

- A: 性欲减退
- B: 脱发
- C: 体位性低血压
- D: 心悸

**答案：A**

44. 可用于鼻部血管收缩的肾上腺素  $\alpha$  受体激动药是

- A: 桃金娘油
- B: 羟甲唑啉
- C: 西地碘
- D: 复方薄荷油

**答案：B**

45. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，口服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 美托洛尔
- B: 替米沙坦
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 埃索美拉唑钠

**答案：C**

46. 可诱发和加重哮喘的是

- A: 普萘洛尔
- B: 硝酸甘油
- C: 胍乙啶
- D: 硝苯地平

**答案：A**

47. 异丙托溴铵的作用机制是

- A: 抑制磷酸二酯酶
- B: 阻断白三烯受体
- C: 阻断 M 受体
- D: 阻断  $\alpha$  受体

**答案：C**

48. 没有镇静和"宿醉"现象，不属于巴比妥类和苯二氮

A: 异戊巴比妥

B: 地西洋

C: 佐匹克隆

D: 阿普唑仑

**答案：C**

49. 四环素类首选用于()

- A: 伤寒、副伤寒
- B: 钩端螺旋体病
- C: 布鲁菌病
- D: 鼠疫、土拉菌病

**答案: C**

50. 其缓释混悬液制剂应空腹服用的是

- A: 阿奇霉素
- B: 氨曲南
- C: 红霉素
- D: 克拉霉素

**答案: A**

51. 替罗非班的作用机制是

- A: 抑制凝血因子 X
- B: 拮抗维生素 K
- C: 抑制凝血酶
- D: 阻断血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体

**答案: D**

52. 促进尿酸排泄的抗痛风代表药物是

- A: 塞来昔布
- B: 扑热息痛
- C: 别嘌醇
- D: 丙磺舒

**答案: D**

53. 原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血可选用

- A: 低分子肝素
- B: 尿激酶
- C: 氨甲环酸
- D: 维生素 K

**答案：C**

54. 与多柔比星合用或配伍可增加心脏毒性的药物是()

- A: 阿糖胞苷
- B:  $\beta$  受体阻断剂
- C: 甲氨蝶呤
- D: 利福平

**答案：B**

55. 阻碍体内睾酮转化为二氢睾酮及抑制白三烯、前列腺素合成，用来治疗良性前列腺增生症（BPH）的植物药是

- A: 依立雄胺
- B: 非那雄胺
- C: 度他雄胺
- D: 普适泰

**答案：D**

56. 在痛风发作的急性期，应当首选的抗痛风药是

- A: 秋水仙碱
- B: 苯溴马隆
- C: 二氟尼柳
- D: 别嘌醇

**答案：A**

57. 以上属于成瘾产妇的新生儿戒断症状的是

- A: 惊厥、震颤、反射加速、发热
- B: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐
- C: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏
- D: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗

**答案：A**

58. 可用于慢性活动性肝炎的治疗的是

- A: 复方氨基酸注射液（18AA）
- B: 复方氨基酸注射液（3AA）
- C: 精氨酸
- D: 赖氨酸

**答案：B**

59. 属于棘白菌素类的是

- A: 卡泊芬净
- B: 制霉菌素
- C: 氟胞嘧啶
- D: 特比萘芬

**答案：A**

60. 对急需抗凝处理的患者，以下哪种方案最优()

- A: 低分子量肝素
- B: 华法林
- C: 华法林+低分子量肝素
- D: 肝素

**答案：C**

61. 慢性充血性心力衰竭宜

- A: 快速洋地黄化
- B: 不宜使用洋地黄
- C: 常规剂量的洋地黄
- D: 停用洋地黄

**答案：C**

62. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

- A: 修复消化道黏膜
- B: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能
- C: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素
- D: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动

**答案：D**

63. 对革兰阳性菌作用强，而对革兰阴性菌作用弱的药物是

- A: 第三代头孢菌素
- B: 第一代头孢菌素
- C: 第四代头孢菌素
- D: 第二代头孢菌素

**答案：B**

64. (2017 年真题) 为避免引起大面积中毒性表皮坏死松解症,服用前提倡做人体白细胞抗原等位基因检测的抗癫痫药是 ( )

- A: 丙戊酸钠
- B: 托吡酯
- C: 氟硝西泮
- D: 卡马西平

**答案: D**

65. 下列属于非选择性  $\beta$  受体阻断剂的是

- A: 比索洛尔
- B: 普萘洛尔
- C: 阿替洛尔
- D: 美托洛尔

**答案: B**

66. 氨甲环酸的作用机制是 ( )

- A: 对抗纤维蛋白溶解
- B: 促使毛细血管收缩
- C: 刺激血小板生成
- D: 激活凝血因子

**答案: A**

67. 治疗强心苷中毒所引起的窦性心动过缓和轻度房室传导阻滞应选用

- A: 去甲肾上腺素
- B: 维拉帕米
- C: 麻黄碱
- D: 阿托品

**答案: D**

68. 关于糖皮质激素抗炎作用特点的描述，不正确的是

- A: 抑制白细胞和吞噬细胞移行血管外，减轻炎症浸润
- B: 促进肉芽组织生成，加速组织修复
- C: 直接收缩血管，减少渗出和水肿
- D: 稳定溶酶体膜，抑制致炎物的释放

**答案：B**

69. 与核糖体 30S 亚基结合，阻止氨基酰 tR-NA 进入 A 位的抗菌药是

- A: 四环素
- B: 青霉素
- C: 万古霉素
- D: 氯霉素

**答案：A**

70. 为预防甲氨蝶呤所致的肾毒性，在化疗期间，除大量水化和利尿外，还应同时给予的尿路保护剂是

- A: 呋塞米
- B: 氯喹酮
- C: 美司钠
- D: 坦洛新

**答案：C**

71. （2018 年真题）不属于血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）类药物作用特点是（）

- A: ACEI 对肾脏有保护作用
- B: ACEI 可引起反射性心率加快
- C: ACEI 禁用于双侧肾动脉狭窄者

D: ACEI 可防治高血压患者心肌细胞肥大

**答案: B**

72. 以下不属于胰岛素不良反应的是

A: 高钾血症

B: 脂肪萎缩与肥厚

C: 低血糖

D: 皮下硬结

**答案: A**

73. 易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物的  
是

A: 红霉素

B: 阿奇霉素

C: 克拉霉素

D: 氨曲南

**答案: A**

74. 下列药物中属于抗纤维蛋白溶解药的是

A: 氨甲环酸

B: 酚磺乙胺

C: 维生素 K1

D: 卡巴克络

**答案: A**

75. 属于  $\alpha$

A: 普适泰

B: 度他雄胺

C: 酚妥拉明

D: 特拉唑嗪

**答案: D**

76. 氨基糖苷类作用机制

A: 抑制细菌蛋白质合成

B: 抑制细菌糖代谢

C: 干扰细菌核酸代谢

D: 抑制细菌细胞壁合成

**答案: A**

77. 退乳药溴隐亭的临床应用注意不包括

A: 口服后个体差异较大

B: 用于治疗闭经或乳溢，可产生短期疗效，但不宜久用

C: 消化道溃疡患者慎用

D: 治疗期间禁止妊娠

**答案: D**

78. 下列哪种药物能抑制尿酸生成的是

A: 呋塞米

B: 秋水仙碱

C: 丙磺舒

D: 别嘌醇

**答案: D**

79. 属于  $\beta_2$  受体激动剂的平喘药是()

A: 沙美特罗

B: 茶碱

C: 噻托溴铵

D: 孟鲁司特

**答案: A**

80. 普通感冒患者,有单纯性咳嗽症状,宜选用的药物是()

A: 氯苯那敏片

B: 右美沙芬片

C: 茶碱缓释片

D: 对乙酰氨基酚滴剂

**答案: B**

81. 非选择性 NSAID 可引起胃黏膜损伤的原因是

A: 抑制 COX-2

B: 阻滞 ARB

C: 抑制 AC

D: 抑制 COX-1

**答案: D**

82. 下列药物中,能促进食物消化的是()

A: 胶体果胶铋

B: 乳酶生

C: 兰索拉唑

D: 雷尼替丁

**答案: B**

83. 关于黄体酮的叙述,下列说法正确的是

A: 是天然孕激素

B: 具有雄激素作用

C: 是短效类口服避孕药的组成成分

D: 是长效类口服避孕药的组成成分

**答案: A**

84. (2017 年真题) 可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是 ( )

A: 苯甲酸钠咖啡因

B: 纳洛酮

C: 氟马西尼

D: 阿托品

**答案: D**

85. 铁剂用于治疗

A: 小细胞低血红蛋白性贫血

B: 巨幼红细胞性贫血

C: 溶血性贫血

D: 再生障碍性贫血

**答案: A**

86. 关于替加环素的使用，错误的是

A: 8 岁以下儿童禁用替加环素

B: 替加环素抑制 CYP1A2、2C8、2C9、2C19、2D6 和 3A4 介导的药物代谢

C: 替加环素是 P—gp 的底物

D: 肾功能不全或接受血液透析患者无需对替加环素进行剂量调整

**答案: B**

87. 磺酰脲类药物最常见的不良反应

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

A: 眩晕嗜睡

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/406224003100011030>