

单选题 188 道

多选题 93 道

判断题 106 道

简答题 99 道

分析题 14 道

【单选题 188 道】

1. 比较红细胞和血红蛋白两组数据变异度的大小宜用 (D)
A. 极差
B. 方差
C. 标准差
D. 变异系数
2. 以下以第二级预防作为主要控制策略的疾病是 (B)
A. 肺结核、乙型肝炎等传染病
B. 肺癌、宫颈癌等恶性肿瘤
C. 矽肺、职业中毒等职业病
D. 碘缺乏症等地方病
3. 表示两种或多种事物的相对变化速度最好选用 (B)
A. 线图
B. 半对数图
C. 直方图
D. 直条图
4. 与普查相比, 抽样调查的主要优点是 (C)
A. 可以早期发现病人
B. 能得到可靠的人群信息
C. 节省资源
D. 可用于发病率特别低的疾病
5. 人体健康是指 (D)
A. 人体不患病
B. 对自然环境中各种因素有调节和适应能力
C. 自我感觉良好
D. 身心、社会等方面的健全与完美状态
6. 蛋白质生物学价值最高的食物是 (D)
A. 牛肉
B. 牛奶
C. 鸡蛋
D. 黄豆
7. 在一定范围的固定人群中, 短时间内突然发生大量具有相同症状和体征的病人。这种现象一般描述为 (A)
A. 短期波动
B. 季节性
C. 大流行
D. 地方性
8. 驱铅治疗的首选药物为 (A)
A. 依地酸二钠钙
B. 二巯基丁二酸钠
C. 二巯基丙醇
D. 二巯基丙磺酸钠
9. 标准正态分布曲线下中间 95% 的面积所对应的横轴尺度比的范围是 (C)
A. $-1.645 \sim +1.645$
B. $-1.282 \sim +1.282$
C. $-1.96 \sim +1.96$
D. $-2.58 \sim +2.58$
10. 污染水体中的甲基汞通过食物链导致水俣病, 主要是因为汞在环境中的 (D)
A. 生物降解作用
B. 生物转化作用
C. 生物积蓄作用
D. 生物富集作用
11. 毒蕈食物中毒时, 临床表现最严重, 死亡率最高的临床分型是 (D)
A. 胃肠毒型
B. 溶血型
C. 神经精神型
D. 肝肾损伤型
12. 艾滋病的主要传播途径是 (D)
A. 经日常生活媒介、性接触和血液传播
B. 经血液、蚊虫叮咬和母婴传播
C. 经吸食毒品、共用物品和性接触传播

D. 经性接触，血液和母婴传播

13. 流行病学与临床医学的主要区别在于（ B ）

A. 研究手段不同

B. 研究对象不同

C. 研究的病种不同

D. 研究范围不同

14. 预防性消毒是指（ C ）

A. 对现有或曾有传染源的场所进行的消毒

B. 对病人的排泄物，分泌物和污染物品、场所等及时进行的消毒

C. 在未发现传染源的情况下，对有可能被病原体污染的物品、场所等进行的消毒

D. 传染源离开后，对其居室环境进行的彻底消毒

15. 尘肺病的诊断依据主要为（ D ）

A. 职业史+临床表现

B. 临床表现+X 线胸片

C. 病史+临床表现

D. 职业史+X 线胸片

16. 人体必需氨基酸指的是（ C ）

A. 食物中含量最少的氨基酸

B. 在人体内由其它氨基酸转化合成的氨基酸

C. 在人体内不能合成或合成量不足的氨基酸

D. 食物中含量较多的氨基酸

17. SO₂ 被人体吸入可引起上呼吸道粘膜的炎症，主要是因为（ A ）

A. SO₂ 易溶于水

B. SO₂ 与飘尘有协同作用

C. SO₂ 可形成酸雨

D. SO₂ 可形成光化学烟雾

18. 引起肉毒梭菌食物中毒的食物主要是（ A ）

A. 家庭自制发酵食品、罐头食品

B. 剩米饭

C. 禽畜肉、蛋及其制品

D. 海产品

19. 某医生选择适当资料计算相应指标，进行 t 检验。应计算的指标是 C

A、变异系数 B、几何均数 C、均数 D、全距 E、中位数

20. 婴儿死亡率是衡量一个国家什么水平的敏感指标 A

A、卫生文化水平 B、经济水平 C、政治水平 D、教育水平 E、科技水平

21. 铅中毒时铅主要抑制 B

A、细胞呼吸酶活性 B、血红素合成酶活性 C、细胞色素氧化酶活性 D、胆碱酯酶活性 E、过氧化氢酶活性

22. 不属于环境污染引起的疾病是 A

A、地方病 B、传染病 C、食物中毒 D、职业病 E、公害病

23. X 线胸片诊断矽肺主要依据 D

A、肺门改变 B、肺纹理改变 C、胸膜改变 D、类圆形、不规则形小阴影和大阴影 E、肺气肿

24. 某县人口 50 万，约 80% 居民以河水为饮用水，该县设有一传染病科的综合医院。城市污水未经处理直接排入河水中。该县 1986 年 1 月～11 月份伤寒发病人数达 1063 例，超过该县历史（1958～1985 年）同期平均发病人数的 6.9 倍。初步调查，发现患者集中于河水排污口的下游地带。这一地区 B

A、工业用水管线泄漏，工业废水污染了水源 B、城市污水污染了水源 C、供水过程中有被投毒的可能 D、供水设施和净化消毒措施未能正常运转 E、以上都不是

25. 概率 $P(A) = 0$ 时表示事件 D

A、已经发生 B、可能发生 C、极可能发生 D、不可能发生 E、在一次抽样中不发生

26. 统计工作的步骤包括，除了 E

A、搜集资料 B、统计设计 C、分析资料 D、整理资料 E、得出结论

27. 某皮鞋厂制帮车间女工，工龄 3 年，近来常有头痛、头晕、乏力、月经过多等症状，多次化验检查 WBC 波动在 $(4 \sim 4.5) \times 10^9$ 次方/L，血小板低于 80×10^9 次方/L。如果考虑是某种职业中毒，该中毒的诊断分级为 B

A、观察对象 B、轻度中毒 C、中度中毒 D、重度中毒 E、亚急性中毒

28. 为预防缺钙应多食 C
A、低盐、高蛋白质 B、低盐、低胆固醇 C、奶及奶制品 D、动物性食品 E、合理热能，优质蛋白，富含铁，锌，碘
29. 频数表的两个特征是 C
A、计算指标与统计处理 B、正态分布与偏态分布 C、集中趋势与离散程度 D、分布类型与对称程度 E、集中程度与离散趋势
30. 铁的主要食物来源是 A
A、动物肝脏 B、奶及奶制品 C、蔬菜、水果 D、豆类 E、粮谷类
31. 铅对血红素合成的影响是由于铅主要抑制 A
A、血红素合成酶 B、 δ^- 氨基乙酰丙酸合成酶 C、粪卟啉原氧化酶 D、粪卟啉原脱羧酶 E、以上都不是
32. 腌制或酸渍的肉类、蔬菜食品中可能含有较高浓度的 D
A、黄曲霉毒素 B、多环芳烃类化合物 C、胺类 D、 N^- 亚硝基化合物 E、黄曲霉菌
33. 某厂喷漆工，工龄 5 年，近半年来出现头痛、头晕、乏力、恶心、牙龈出血等症状，实验室检查 WBC 3.5×10^9 次方/L，血小板 55×10^9 次方/L，该工人最可能患 C
A、慢性铅中毒 B、急性苯中毒 C、慢性苯中毒 D、慢性汞中毒 E、急性汞中毒
34. 急性苯中毒主要损害 B
A、呼吸系统 B、神经系统 C、造血系统 D、消化系统 E、心血管系统
35. 河豚毒素中毒的主要临床表现 B
A、呼吸数频，面色苍白 B、共济失调，全身麻痹瘫痪 C、视力模糊，眼睑下垂，复视 D、呕吐，腹痛，腹泻，绿色水样便 E、酒醉步，植物神经功能紊乱
36. 某独生女儿，偏食严重，只吃一些水果和谷类食物，最近发现手脚麻木，关节疼，并有“抽筋”现象。为加速症状的恢复，最好还应补充一些 A
A、维生素 D B、维生素 C C、维生素 B₂ D、维生素 B₆ E、维生素 PP
37. 沙门菌属食物中毒的主要临床表现 D
A、呼吸数频，面色苍白 B、共济失调，全身麻痹瘫痪 C、视力模糊，眼睑下垂，复视 D、呕吐，腹痛，腹泻，绿色水样便 E、酒醉步，植物神经功能紊乱
38. 高热，急性消化道疾病，消化道出血，大手术后病人适宜吃 D
A、普通饭 B、软饭 C、半流质食物 D、流质食物 E、固体食物
39. 最常见的食物中毒是 D
A、真菌性食物中毒 B、化学性食物中毒 C、有毒动植物食物中毒 D、细菌性食物中毒 E、原因不明的食物中毒
40. 急性苯中毒不出现哪项临床表现 D
A、恶心、呕吐 B、兴奋、眩晕 C、抽搐、昏迷 D、全血细胞减少 E、呼吸循环衰竭
41. 尘肺是指 A
A、长期吸入生产性粉尘而引起的以肺组织纤维化为主的全身性疾病
B、长期吸入生产性粉尘而引起的以呼吸系统症状为主的疾病
C、由于吸入游离二氧化硅粉尘引起的以肺组织纤维化化为主的疾病
D、由于吸入生产性粉尘而引起的肺内炎症性疾病
E、以上都不是
42. 预防地方性甲状腺肿流行的最有效措施是 A
A、食用碘盐 B、除去水中硫氰酸盐 C、煮沸饮水 D、降低饮用水的硬度 E、饮水除氟
43. 某男孩，近半年感觉疲倦，头晕，乏力，心悸，呼吸急促，查血红蛋白 90g/L，红细胞平均体积 82fl，原卟啉大于 500 μ g/L，其最可能的原因是 B
A、钙缺乏 B、铁缺乏 C、叶酸缺乏 D、锌缺乏 E、维生素 B₁₂ 缺乏

44. 与人类健康关系最为密切的空气物理因素有红外线, 可见光和 D

A、微波 B、宇宙射线 C、X 射线 D、紫外线 E、 γ 射线

45. 饮用水氯化消毒的目的是 B

A、改善水的性状 B、杀灭致病微生物 C、消灭寄生虫虫卵 D、保持水中余氯 E、杀灭大肠杆菌

46. 下列哪项不作为诊断矽肺的依据 C

A、矽尘作业职业史 B、生产场所粉尘浓度测定资料 C、胸透 D、国家发布实施的尘肺 X 线诊断标准
E、X 线胸片

47. 某厂仪表制造工, 工龄 8 年, 近几个月常出现头痛、头昏、烦躁、易怒等症状, 并有书写困难、口腔粘膜溃疡、牙龈红肿等体征, 此工人可能为【D】

A、急性苯中毒

B、急性铅中毒

C、急性汞中毒

D、慢性汞中毒

E、慢性铅中毒

48. 毒物在体内的生物转化过程, 不包括【D】

A、氧化

B、还原

C、水解

D、电解

E、结合

49. 我国居民膳食中, 热能的主要食物来源是【E】

A、动物肝脏

B、奶及奶制品

C、蔬菜、水果

D、豆类

E、粮谷类

50. 生产性毒物进入机体最主要途径是【C】

A、皮肤

B、消化道

C、呼吸道

D、口腔粘膜

E、眼结膜

51. 某独生女儿, 偏食严重, 只吃一些水果和谷类食物, 最近发现手脚麻木, 关节疼, 并有“抽筋”现象。产生这些症状的主要原因【B】

A、血清锌下降

B、血清钙下降

C、血清钾下降

D、血清钠下降

E、血清磷下降

52. 防止粮食霉变最有意义的措施是【E】

A、加碱破坏

B、碾轧加工

C、控制粮食水份含量

D、挑除霉粒

E、控制粮食水份含量及温度

53. 目前我国粮食污染最严重的毒素是【A】

A、黄曲霉毒素

- B、黄变米毒素
 - C、岛青霉毒素
 - D、杂色曲霉素
 - E、展青霉毒素
54. 现有一批花生米，查出黄曲霉素 B1 含量为 $30 \mu\text{g} \cdot \text{kg}$ ，已超出国家规定的允许量，其中有的颗粒已明显发霉，你应如何处理【C】
- A、作为动物性牲畜饲料
 - B、加碱洗晾干，再检测其黄曲霉素 B1 含量
 - C、挑出霉粒，再测含量，如不超过 $20 \mu\text{g} \cdot \text{kg}$ 可食用
 - D、深埋土中，不能食用
 - E、再加不含有黄曲霉素 B1 的花生稀释
55. 某地某年 8 月发生了一起由食用用蛋、奶糖制作的雪糕而引起的食物中毒，症状为腹痛，腹泻，大便如水样黄绿色便，少数病人有浓血便，部分病人体温为 $38\sim 39^{\circ}\text{C}$ ，多数人潜伏期为 $12\sim 24$ 小时，你认为最可能是哪种食物中毒【D】
- A、葡萄球菌肠毒素中毒
 - B、副溶血性孤菌食物中毒
 - C、变形杆菌食物中毒
 - D、沙门菌属食物中毒
 - E、肉毒毒素中毒
56. 以下是食物中毒的主要预防措施除了【C】
- A、注意卫生，防止食品污染
 - B、低温保藏，控制细菌繁殖及毒素形成
 - C、对从业人员进行预防接种
 - D、食用前彻底加热杀死病原体及破坏毒素
 - E、加强有毒动植物及化学毒物的管理，执行卫生法规及管理条例
57. 一食堂，就餐者就餐 1 小时后，陆续出现唇、指甲以及全身皮肤青紫等症状。根据中毒症状，中毒的原因最可能是【D】
- A、钡盐中毒
 - B、赤霉病毒中毒
 - C、磷化锌中毒
 - D、亚硝酸盐中毒
 - E、黄变米中毒
58. 可能接触苯的作业【C】
- A、制革
 - B、电镀
 - C、喷漆
 - D、补牙
 - E、炼焦
59. 某厂喷漆工，工龄 5 年，近半年来出现头痛、头晕、乏力、恶心、牙龈出血等症状，实验室检查 $\text{WBC} 3.5 \times 10^9$ 次方/L，血小板 55×10^9 次方/L，该工人最可能患【C】
- A、慢性铅中毒
 - B、急性苯中毒
 - C、慢性苯中毒
 - D、慢性汞中毒
 - E、急性汞中毒
60. 测定某地 130 名正常成年男子样本红细胞数，要估计该地正常成年男子红细胞均数，95%可信限范围是【D】

A、 $\mu \pm 1.96SX$

B、 $X \pm$

$1.96 \sigma X$

C、 $X \pm 2.58SX$

D、 $X \pm 1.96SX$

E、 $\mu \pm 2.58 \sigma X$

61. 正氮平衡就是为新增或修复组织的需要，有一部分氮将【B】

A、在体内消耗掉

B、在体内储留

C、被机体吸收

D、被机体利用

E、以上都不是

62. 下列哪一种食物优质蛋白含量最高【C】

A、大米

B、小米

C、大豆

D、肉类

E、玉米

63. 营养素目前分为五大类，除了【B】

A、蛋白质

B、水

C、脂肪

D、碳水化合物

E、无机盐和维生素

64. 可吸入颗粒物是指能长时间漂浮于空气中很容易进入呼吸道的颗粒物，一般直径小于或等于【B】

A、 $5 \mu m$

B、 $10 \mu m$

C、 $2 \mu m$

D、 $1 \mu m$

E、 $15 \mu m$

65. 慢性苯中毒主要损害【C】

A、呼吸系统

B、神经系统

C、造血系统

D、消化系统

E、心血管系统

66. 下列哪种疾病不属于职业病【B】

A、接尘作业工人所患矽肺

B、煤矿井下工人所患消化性溃疡

C、林业工人所患森林脑炎

D、水银温度计制造工所患汞中毒

E、煤矿井下工人所患滑囊炎

67. 疾病过程中传染性最强的是 B

A. 潜伏期

B. 临床症状期

C. 恢复期

D. 以上都不对

68. 恢复期病原携带者指 B
- A. 潜伏期排出病原体
 - B. 临床症状消失后仍排出病原体
 - C. 整个感染过程均无明显症状和体征而排出病原体者
 - D. 无病原体排出者
69. 经食物传播错误的是 D
- A. 吃污染食物者发病，不食者不发病；
 - B. 一次性大量污染，可形成爆发；
 - C. 停止供应该食物后，爆发即可平息；
 - D. 潜伏期较长
70. 以下不属于血脂异常的是 D
- A. 甘油三酯(TG) ↑
 - B. 胆固醇(TC) ↑
 - C. 低密度脂蛋白(LDL) ↑
 - D. 高密度脂蛋白(HDL) ↑
71. 急性中毒属于大气污染对人体健康的 A
- A. 直接危害
 - B. 间接危害
 - C. 以上都对
 - D. 以上都不对
72. 温室效应属于大气污染对人体健康的 B
- A. 直接危害
 - B. 间接危害
 - C. 以上都对
 - D. 以上都不对
73. 脊髓灰质炎属于___介水传染病 B
- A. 细菌性
 - B. 病毒性
 - C. 寄生虫性
 - D. 以上都不对
74. 水俣病与___有关 B
- A. 苯
 - B. 汞
 - C. 铅
 - D. 氟
75. 关于氟骨症表现说法错误的是 C
- A. 神经衰弱
 - B. 肢体变形
 - C. 动重静轻的酸痛感
 - D. 胃肠功能紊乱
76. 由于职业性有害因素造成的腰背痛、肩颈痛属于 B
- A. 职业病
 - B. 工作有关疾病
 - C. 职业性外伤
 - D. 以上都不对
77. CO 属于___窒息性气体 B
- A. 单纯性

- B. 化学性
 - C. 以上都对
 - D. 以上都不对
78. 脂类营养价值的评价指标不包括 C
- A. 必需脂肪酸的含量
 - B. 消化率
 - C. 水溶性维生素的含量
 - D. 脂溶性维生素的含量
79. 婴儿钙缺乏会出现 B
- A. 骨质软化症
 - B. 佝偻病
 - C. 骨质疏松症
 - D. 以上都不对
80. 维生素 A 缺乏可造成 C
- A. 佝偻病
 - B. 脚气病
 - C. 夜盲症
 - D. 坏血病
81. 黄曲霉毒素的毒性作用主要针对 B
- A. 肾脏
 - B. 肝脏
 - C. 胃
 - D. 食管
82. 反映计量资料集中趋势的指标是： A
- A. 平均数
 - B. 标准差
 - C. 标准误
 - D. 频率
 - E. 全距
83. 在列频数表时，分的组段数一般为： B
- A. 5~10 个
 - B. 10~15 个
 - C. 10~30 个
 - D. 15~20 个
 - E. >20 个
84. 计算抗体滴度的平均滴度习惯上用： B
- A. 中位数
 - B. 几何均数
 - C. 众数
 - D. 算术均数
 - E. 百分位数
85. 表示一组观察值分布的离散程度大小最常用的指标是： D
- A. 全距
 - B. 离均差
 - C. 方差
 - D. 标准差
 - E. 离均差平方和
86. 比较两组观察值单位不同时的变异程度大小要用： D
- A. 离均差
 - B. 标准差
 - C. 标准误
 - D. 变异系数
 - E. 方差

87. 变异系数越大说明: E

- A. 标准差越大
- B. 平均数越大
- C. 标准差, 平均数都大
- D. 平均数小
- E. 以均数为准变异程度大

88. 标准差说明: A

- A. 所有个体值对均数离散程度的大小
- B. 某一样本对均数的离散程度的大小
- C. 所有样本均数对总体均数离散程度的大小
- D. 某一样本均数对总体均数离散程度大小
- E. 某个观察值对总体均数离散程度大小

89. 下列哪项不属于职业性有害因素评价工作 D

- A 生产环境监测
- B 健康监护
- C 职业流行病学调查
- D 阈限值制定
- E 实验室测试和危险度评定

90. 下列哪项不属于生产环境职业有害因素控制措施 C

- A 从卫生和安全角度设计生产工艺和设备
- B 减低劳动强度, 减少接触时间
- C 正确选择厂址、合理安排车间布局
- D 避免使用有毒物质
- E 密闭、隔离、通风, 车间整洁, 安全贮运

91. 下列哪项不属于个体防护措施 D

- A 正确选择和使用个人防护用品
- B 遵守安全操作规程
- C 良好的个人卫生习惯
- D 按时接受职业性体检
- E 限制接触时间

92. 粉尘是指能够较长时间浮游在空气中的 B

- A 液滴
- B 固体微粒
- C 烟
- D 雾
- E 细菌

93. 粉尘对人体有下列作用 E

- A 致纤维化
- B 刺激
- C 中毒
- D 致敏
- E 以上全部

94. 呼吸性粉尘是指直径多大的粉尘 E

- A $>15\mu\text{m}$
- B $>10\mu\text{m}$
- C $=10\mu\text{m}$

D $<8\mu\text{m}$

E $<5\mu\text{m}$

95. 尘肺是一种 B

A 肺部疾病

B 以纤维化为主的疾病

C 纤维化疾病

D 粉尘引起的免疫性疾病

E 炎症

96. 下列何者不是尘肺 C

A 煤肺

B 石棉肺

C 棉尘肺

D 煤矽肺

E 矽肺

97. 有下列疾病的人，不得从事粉尘作业 E

A 活动性肺结核

B 支气管哮喘

C 慢性胃炎

D 严重心脏疾病

E 以上全部

98. 矽肺的 X 线表现有 E

A 类圆形小阴影

B 不规则形小阴影

C 大阴影

D 胸膜和肺门改变

E 以上全有

99. 矽肺诊断所必备的条件是 D

A 确切的二氧化硅粉尘接触史

B 确凿的 X 线胸片表现

C 动态观察资料和该单位的矽肺流行病学调查情况

D 确切的二氧化硅粉尘接触史；确凿的 X 线胸片表现；动态观察资料和该单位的矽肺流行病学调查情况

E 肺组织活检

100. 生产性噪声按其产生的来源来分，可分为 A

A 机械性噪声、流体动力性噪声和电磁性噪声

B 稳态噪声、非稳态噪声、脉冲噪声

C 交通噪声、生活噪声、工业噪声

D 低频噪声、中频噪声、高频噪声

E 持续性噪声、脉冲噪声、电磁性噪声

101. 人耳能感觉到的声频范围是 B

A $<20\text{Hz}$

B $20\sim20000\text{Hz}$

C $>20000\text{Hz}$

D $200\sim2000\text{Hz}$

E $>2000\text{Hz}$

102. 噪声引起的听觉器官损害特点是早期表现为 B

A 耳蜗底部受损

B 高频听力下降

- C 低频听力下降
 - D 语频听力下降
 - E 以上都是
103. 职业性噪声聋的诊断原则 D
- A 有明确的职业噪声接触史
 - B 排除其他致聋原因
 - C 纯音测定为感音性耳聋
 - D 以上都是
 - E 以上都不是
104. 噪声对其他系统的影响还包括 E
- A 神经系统
 - B 消化系统
 - C 生殖系统
 - D 心血管系统
 - E 以上都是
105. 防止噪声危害最根本的措施是 C
- A 制定合理的噪声卫生标准
 - B 控制噪声传播和反射
 - C 控制和消除噪声源
 - D 使用有效的个人防护用品
 - E 厂区厂房的合理规划
106. 局部振动病的典型表现为 A
- A 发作性手指变白
 - B 感应迟钝
 - C 血管痉挛和变形
 - D 肌无力、肌萎缩
 - E 听力下降
107. 高温作业的主要类型有 E
- A 高温强辐射作业
 - B 高温高湿作业
 - C 夏季露天作业
 - D 以上都不是
 - E 以上都是
108. 某纺织女工，45 岁，经检查听阈提高 20dB，10-20 小时后恢复听力，此听力损害属于 C
- A. 噪声性耳聋
 - B. 听觉适应
 - C. 听觉疲劳
 - D. 爆震性耳聋
109. 炼钢、陶瓷、铸造工种属于何种作业 D
- A. 高温低辐射作业
 - B. 高气湿作业
 - C. 高温高湿作业
 - D. 干热作业
110. 高温作业工人患病率较高的疾病 D
- A. 心血管疾病
 - B. 泌尿系统疾病
 - C. 神经系统疾病
 - D. 心血管和消化系统疾病
111. 矽肺是由于长期吸入哪种粉尘所致 C
- A. 石棉
 - B. 滑石
 - C. 石英
 - D. 煤尘
112. 矽肺常见和最主要的 X 线表现 B
- A. 肺纹理紊乱
 - B. 圆形小阴影

- C. 不规则小阴影 D. 大阴影
113. 矽肺最常见的并发症 D
A. 肺炎 B. 肺心病
C. 肺部感染 D. 肺结核
114. 下列哪一选项不是预防尘肺的技术措施 D
A. 改革工艺 B. 湿化作业
C. 通风 D. 戴防尘口罩
115. 确定矽肺病分期哪项不是必需的依据 C
职业史 B. 肺部 X 线变化
C. 临床症状 D. 现场调查资料
116. 驱铅的首选药是： A
A. 依地酸二钠钙 B. 二巯基丙磺酸钠 C. 二巯基丁二酸钠 D. 二巯基丙醇
117. 下列哪个行业接触铅的机会最大 A
A、电池制造 B、印染
C、塑料生产 D、制鞋行业
118. 呼吸性粉尘是指直径小于 C
A、15 微米 B、10 微米 C、5 微米 D、3 微米
119. 消除粉尘危害的主要途径是 A
A、改革工艺、革新设备 B、湿式作业
C、密闭、抽风、除尘 D、加强个人防护
120. 下列哪一种气体不属于化学窒息气体 D
A、CO B、HCN C、H₂S D、NO₂
121. 下列哪一种气体属于化学窒息气体 C
A、氯气 B、氨气 C、一氧化碳 D、一氧化氮
122. 具有腐败臭鸡蛋味的气体是 A
A、硫化氢 B、氰化氢 C、一氧化碳 D、苯胺
123. 矽肺胸片中，圆形小阴影的病理基础是 A
A、小结节 B、间质纤维化 C、团块状纤维化 D、大结节
124. 尘肺分期的诊断主要依靠 D
A、临床症状 B、肺通气量 C、生化指标检测 D、X 线胸片
125. 最常见的尘肺类型是 A
A、矽肺 B、硅酸盐肺 C、煤尘肺 D、金属尘肺
126. 急性苯中毒主要损害 B
A、肝脏 B、中枢神经系统 C、肾脏 D、造血系统
127. 诊断职业病最重要的前提条件是 A
A、职业史 B、临床表现 C、现场调查 D、实验室检查
128. 下列哪项不是汞中毒的表现 D
A、口腔炎 B、震颤
C、易兴奋 D、腹泻
129. () 不属于职业病。 A
A、矿工的消化性溃疡 B、矿工的尘肺
C、矿工的石棉肺 D、矿工的恶性间皮瘤
130. 不属于单纯窒息性气体的是 D
A、氮气 B、二氧化碳 C、甲烷 D、硫化氢
131. 有苦杏仁味的气体是 C
A、氨气 B、硫化氢 C、氰化氢 D、一氧化碳

132. 生产过程中的职业性有害因素按性质可分为 B
- A. 异常气象条件、噪声与震动、辐射线
 - B. 化学性因素、物理性因素、生物性因素
 - C. 生产过程性有害因素、劳动过程有害因素、劳动环境有害因素
 - D. 细菌、病毒、霉毒
 - E. 劳动组织不合理、劳动强度过大、工具性因素
133. 不属于生产过程中职业性有害因素的是 E
- A. 生产性毒物
 - B. 生产性粉尘
 - C. 非电离辐射
 - D. 细菌
 - E. 劳动组织不合理
134. 构成职业性有害因素致病模式的三个因素是 A
- A. 劳动者、职业性有害因素、作用条件
 - B. 易感者、病原、作用途径
 - C. 易感者、接触机会、接触强度
 - D. 接触方式、劳动者、有害因素种类
 - E. 以上都不是
135. 不属于我国现行法定职业病分类中物理因素所致职业病的是 E
- A. 中暑
 - B. 手臂振动病
 - C. 减压病
 - D. 高原病
 - E. 外照射急性放射病
136. 不符合工作有关疾病概念含义的是 E
- A. 职业性有害因素只是该疾病的发病因素之一
 - B. 职业性有害因素是疾病的促发因素
 - C. 不包括法定职业病
 - D. 控制职业性有害因素接触强度就可降低发病率
 - E. 消除职业性有害因素就可避免发病
137. 职业性接触苯者所患再生障碍性贫血属于 A
- A. 职业病
 - B. 工作有关疾病
 - C. 职业性外伤
 - D. 职业特征
 - E. 以上都不是
138. 铅主要沉积在 E
- A. 肾脏
 - B. 血液
 - C. 脑
 - D. 肝脏

E. 骨骼

139. 目前国内驱铅治疗的常用解毒剂是 D

- A. 二巯基丙磺酸钠
- B. 亚硝酸钠一硫代硫酸钠
- C. 二巯基丁二酸
- D. 依地酸二钠钙
- E. 二巯基丙醇

140. 慢性铅中毒急性发作的典型症状是 A

- A. 腹绞痛
- B. 垂腕
- C. 周围神经炎
- D. 肌肉震颤
- E. 精神症状

141. 金属汞在车间空气中的存在形态是 C

- A. 烟
- B. 固体
- C. 蒸气
- D. 雾
- E. 气体

142. 慢性汞中毒的三大主要临床症状为 B

- A. 脑衰弱综合征、口腔-牙龈炎、腐蚀性胃肠炎
- B. 震颤、口腔-牙龈炎、脑衰弱综合征
- C. 口腔-牙龈炎、间质性肺炎、皮炎
- D. 间质性肺炎、肾炎、皮炎
- E. 震颤、肾炎、口腔-牙龈炎

143. 苯污染作业场所空气的形式是 A

- A. 蒸气
- B. 气体
- C. 液体
- D. 雾
- E. 烟

144. 苯在体内的主要蓄积部位是 B

- A. 骨皮质
- B. 骨髓
- C. 血液
- D. 脑
- E. 肾脏

145. 下列可接触到苯的作业是 E

- A. 吹玻璃
- B. 下水道疏通

- C. 粪坑清理
- D. 电镀
- E. 喷漆

146. 慢性苯中毒主要损害 C

- A. 消化系统
- B. 血液系统
- C. 造血系统
- D. 循环系统
- E. 神经系统

147. 急性苯中毒主要损害 A

- A. 中枢神经系统
- B. 循环系统
- C. 血液系统
- D. 泌尿系统
- E. 呼吸系统

148. 慢性苯中毒可出现 D

- A. 巨幼红细胞性贫血
- B. 低色素性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 缺铁性贫血

149. 使血液运氧功能发生障碍的毒物是 D

- A. CO₂
- B. SO₂
- C. HCl
- D. CO
- E. H₂S

150. 对我国工人健康威胁最大的职业病是 A

- A. 尘肺
- B. 职业性哮喘
- C. 噪声聋
- D. 接触性皮炎
- E. 以上都不是

151. 矽肺的特征性病理改变是 A

- A. 矽结节
- B. 肺间质纤维化
- C. 圆形小阴影
- D. 肺泡结构破坏
- E. 肺脏体积增大、含气量减少

152. 蓄电池制造工，男，41岁，从事工作以来出现头痛、头晕、肌肉关节酸痛，继而发展到四肢末端呈手套和袜套样的感觉减退，其原因可能是 C
- A. 汞中毒
B. 急性铅中毒
C. 慢性铅中毒
D. 镉中毒
E. 铬中毒
153. 患者，女性，38岁，自从事铅作业以来，经常出现轻度类神经征，伴有腹胀、便秘。尿铅 $1.25 \mu\text{mol/L}$ ，尿中 ALA $75 \mu\text{mol/L}$ ，此患者可能是 B
- A. 观察对象
B. 慢性轻度铅中毒
C. 慢性中度铅中毒
D. 慢性重度铅中毒
E. 正常
154. 女性，32岁，某温度计厂烘表工，近4年来常感头痛、头昏、心烦、易怒、记忆力明显下降，近1年来出现手指震颤，在做精细活时尤为明显。其最可能接触的职业性有害因素是 D
- A. 铅
B. 苯
C. 锰
D. 汞
E. 锌
155. 某男，33岁，热水瓶厂喷漆工，近五年来常感头昏乏力，失眠，多梦，牙龈出血，皮下偶可见到紫癜，其可能与接触何种毒物有关 E
- A. CS₂
B. CC₁₄
C. 正己烷
D. 二甲苯
E. 苯
156. 某皮革加工厂鞣革车间出现多例患者，其临床表现为头痛、头昏，有明显的黏膜刺激症状，并出现咳嗽、胸闷、眼结膜水肿，体检时，肺部可闻干性啰音，X线胸片显示肺纹理增多、增粗。其最有可能接触的生产性毒物是 A
- A. H₂S
B. 硫化钠
C. 鞣酸
D. 二硫化碳
E. 以上都不是
157. 某男性炉前工，在一个无通风设备的环境中连续工作4h，出现剧烈的头痛、头昏、四肢无力，有轻度的意识障碍，但无昏迷。引起该患者出现上述表现的毒物最可能是 D
- A. H₂S
B. NO₂
C. CS₂
D. CO

E. S02

158. 男性, 36 岁, 家庭装修工人, 一次在油漆完地板后出现了兴奋, 面部潮红, 眩晕等酒醉样症状, 有轻微的恶心、呕吐, 其他无异常, 经治疗后康复。该患者最有可能是 A
- A. 急性苯中毒
B. 急性一氧化碳中毒
C. 慢性苯胺中毒
D. 慢性苯中毒
E. 以上都不是
159. 某男性, 高温作业工人, 现场体检结果为收缩压升高, 舒张压稳定而致脉压差增大, 无不适主诉, 则该工人处于 B
- A. 机体蓄热阶段
B. 生理适应阶段
C. 生理性脱水阶段
D. 机体缺盐阶段
E. 以上都不是
160. 女性, 38 岁, 某皮鞋厂仓库保管员, 办公室设在仓库内, 近年来常感头痛、头昏、乏力、失眠、记忆力减退、易感冒、月经过多、牙龈出血, 皮下有紫癜而入院, 根据患者的临床表现, 主要应询问 B
- A. 既往史
B. 接触史
C. 个人嗜好
D. 药物史
E. 家族史
161. 某男性工人, 在东北某森林地区从事野外伐木工作, 工龄 5 年, 近来常感手部疼痛, 麻木, 无力。该工人从事作业中最主要存在的职业性有害因素是 A
- A. 局部振动
B. 全身振动
C. 噪声
D. 高温、强热辐射
E. 森林脑炎病毒
162. 男性, 40 岁, 某印刷厂工人, 因持续性腹绞痛, 阵发性加剧而入院。患者自诉近五年来经常有腹绞痛发作, 部位多在脐周, 发作时尚能坚持工作。但近一年来, 腹痛发作频繁, 发作时大汗淋漓, 面色苍白, 在地上打滚, 并伴有头痛、头昏、乏力、关节酸痛。体查: 一般情况尚可, 体温正常, 面色苍白, 牙龈有色素沉着, 眼底动脉痉挛, 腹部平软, 肝脾未扪及, 肠鸣音正常, 诊断为慢性铅中毒. 对此患者, 首选的解毒剂是 B
- A. 二巯基丁二酸钠
B. 依地酸二钠钙
C. 巯乙胺
D. 二巯基丙磺酸钠
E. 二巯基丙醇
163. 对职业性铅中毒的预防措施最有效的是 B

- A. 上岗前健康检查
- B. 消除和控制生产环境中铅的浓度
- C. 合理使用防毒用具
- D. 加强健康教育
- E. 加强健康监护

164. 女性, 35 岁, 温度计制造厂的烘表厂, 由于温度掌握不好, 温度计破裂, 经常有汞蒸气外逸。该工人接触 5 年后出现了头痛、头昏、记忆力下降, 接着出现了易激动, 无故烦躁、发怒、爱哭等症状, 继而出现眼睑、手指的震颤、口腔粘膜有轻度的溃疡、牙龈酸痛、红肿、有轻微的压痛。实验检查: 尿汞(冷原子吸收光谱法) 含量 0.02mg/L。如欲诊断为慢性汞中毒, 主要还需了解 C

- A. 生活环境中汞的浓度
- B. 一般情况
- C. 生产场所空气中汞浓度
- D. 个体的营养状况
- E. 汞进入体内的途径

165. 某男性工人, 曾在某金矿任掘进工 10 年, 2 年前调离接尘岗位, 调离时体检正常, 因近来咳嗽、咳痰, 自疗无效而就诊。该工人当年接触的最主要的粉尘类型是 A

- A. 矿物性粉尘
- B. 金属性粉尘
- C. 硅酸盐粉尘
- D. 含金粉尘
- E. 以上都不是

166. 现代医学模式是 B

- A. 生物医学模式
 - B. 生物心理社会医学模式
 - C. 生理心理社会医学模式
 - D. 分子生物医学模式
 - E. 自然哲学医学模式
- 当今我国预防医学研究的对象是 E
- A 致病因素的高危人群
 - B 对疾病抵抗力弱的人群
 - C 有职业致病因素接触的人
 - D 低收入、无医疗支付能力的人群
 - E 全社会的人群

167. 下列哪一项不是第 1 级预防措施 E

- A. 自我保健
- B. 健康教育
- C. 定期健康检查
- D. 环境保护
- E. 早期治疗

168. 气体、蒸汽和气溶胶形态的环境污染物最易通过哪条途径进入体内 B

- A. 皮肤
- B. 呼吸道
- C. 消化道
- D. 汗腺

169. 从世界人类疾病谱变化可以看出, 当前许多国家中影响人们健康和引起死亡的疾病主要是心血管疾病、脑血管疾病和恶性肿瘤这 3 大危害, 其主要诱因是 D

- A. 机体的免疫力降低
- B. 人们生活水平的提高
- C. 家族的遗传
- D. 环境因素

170. 常见的居室内空气污染物有以下各项, 除了 C

- A. 致癌物
- B. 甲醛
- C. 亚硝酸胺
- D. 病原微生物
- E. 一氧化碳

171. “温室效应”是因大气中下列哪项成分含量增高引起的 C

- A. 二氧化硫
- B. 氮氧化物
- C. 二氧化碳
- D. 一氧化碳

172. 苯的急性毒性作用主要损害的系统是 B
A. 呼吸系统 B. 神经系统 C. 造血系统 D. 心血管系统
173. 20 世纪 50 年代中期，日本熊本县水俣湾被石油化工厂废水污染，并通过水鱼人食物链在人体内蓄积，引起居民中大量出现以感觉障碍、共济运动失调、视野缩小、听力障碍、语言障碍、眼球运动异常为主要症状和体征的疾病，引起该病的原因可能是 A
A. 汞 B. 镉 C. 铅 D. 砷
174. 在常温下即可蒸发的金属是 B
A. 铅 B. 汞 C. 锡 D. 锰
175. 某工业区在生产时产生了环境污染，影响和妨碍人们的休息和睡眠，该污染为
A. SO_2 B. CO_2 C. 尘埃 D. 噪声
176. 某居民家用燃煤取暖，几小时后出现眩晕、头痛、恶心、疲乏等症状，并伴有心前区紧迫感和针刺样疼痛，据你所学知识，该居民最有可能是 B
A. SO_2 中毒 B. CO 中毒 C. NO_2 中毒 D. O_2 中毒
177. 造成酸雨的最主要的原因是大气中的 B
A. 气性污染物 B. SO_2 污染物 C. CO_2 污染物 D. NO_x 污染物
178. 营养素是指食物中含有的可给人体提供能量、构成机体成分和组织修复、维持生理调节功能的化学成分，不属于营养素的是（ A ）
A. 有机盐 B. 蛋白质 C. 无机盐 D. 脂肪 E. 碳水化合物
179. 奶类含量低的营养素是（ B ）
A. 钙 B. 铁 C. 蛋白质 D. 脂肪 E. 乳糖
180. 耐盐最强的食物中毒病原是（ A ）
A. 副溶血性弧菌 B. 沙门菌 C. 大肠杆菌
D. 葡萄球菌 E. 肉毒梭菌
181. 某男孩，2 岁，查体发现方颅，枕秃，串珠胸，夜间经常啼哭，最可能的原因是（ D ）
A. 受惊吓 B. 锌缺乏 C. 维生素 A 缺乏
D. 钙缺乏 E. 铁缺乏
182. 某大学，同宿舍的 8 名同学聚餐，吃了一种鱼后，出现皮肤潮红、头晕、头痛、心悸、胸闷、血压下降，荨麻疹或哮喘症状，引起中毒最可能的病原是（ A ）
A. 河豚毒素 B. 霉菌毒素 C. 组胺
D. 有机磷农药 E. 沙门菌
183. 2001 年 5 月，某单位 10 位同事在海鲜馆聚会，吃完海产品 5h 后，陆续有 8 人出现腹痛、频繁腹泻、里急后重不明显，继而出现恶心、呕吐，重症者出现脱水，少数出现休克、意识障碍，3d 后中毒症状逐渐好转，发生食物中毒的最可能原因是（ E ）
A. 沙门菌 B. 葡萄球菌肠毒素 C. 肉毒毒素
D. 李斯特菌 E. 副溶血性弧菌

184. 某患者，平时经常吃瘦肉、鸡蛋、牛奶，不吃蔬菜、水果、粗粮。该患者最可能出现的主要症状是（ C ）
A. 贫血 B. 记忆力减退 C. 便秘 D. 消瘦 E. 乏力
185. 预防医学的对象（ D ）
A. 个体 B. 病人 C. 健康人 D. 确定的群体
186. 生态健康模式是（ E ）
A. 环境—健康 B. 环境—人群 C. 环境—生物
D. 环境—人群—健康 E. 环境—生物—健康
187. 在疾病三级预防中，健康促进的重点在（ A ）
A. 第一级预防甚至更早阶段 B. 第二级预防 C. 第三级预防 D. 第二和第三级预防 E. 第一和第二级预防
188. 以下各项中不适合采取第一级预防的是（ C ）
A. 职业病 B. 心血管疾病 C. 病因不明，难以觉察预料的疾病
D. 脑卒中 E. 糖尿病

【多选题 93 道】

1. 预防医学的研究对象包括 ABCD
A. 患者
B. 隐性感染者
C. 健康人
D. 有发病风险的人
2. 护理人员与预防医学的关系包括 ABCD
A. 作为公共卫生突发事件的第一报告人
B. 疾病监测的前哨
C. 日常各种个体化预防服务和疾病管理服务的提供者
D. 在保障公众健康中起到非常重要的作用
3. 我国新时期的卫生工作方针包括 BCDE
A. 以城市为重点
B. 预防为主, 中西医并重
C. 依靠科技与教育
D. 动员全社会参与
E. 为人民健康服务
4. 以下属于一级预防内容的有 BCDE
A. 采取及时的、有效的治疗措施，防止病情恶化
B. 开展健康教育，注意合理营养和体格锻炼，培养良好的行为和方式
C. 有组织地进行预防接种，提高人群的免疫水平
D. 预防遗传性疾病，做好婚前教育和禁止近亲结婚
E. 做好妊娠和儿童期的卫生保健工作
5. 传染病流行的三个环节 ABC
A. 传染源
B. 传播途径
C. 人群易感性
D. 疫源地

6. 传染源包括 ABC
 - A. 病人
 - B. 病原携带者
 - C. 受感染的动物
 - D. 流行地区的健康人
7. 造成人群易感性升高的因素 ABD
 - A. 新生儿增加;
 - B. 易感人口迁入;
 - C. 计划免疫
 - D. 免疫人口死亡;
 - E. 病原体发生变异
8. 传染病责任报告单位及报告人包括 ABCD
 - A. 公立及私立医院的医生护士
 - B. 乡村医生
 - C. 个体开业医生
 - D. 采血机构工作人员
9. 属于甲类传染病的有 AB
 - A. 鼠疫
 - B. 霍乱
 - C. 痢疾
 - D. 破伤风
10. 针对动物传染源可采取 ABCD
 - A. 彻底消灭
 - B. 捕杀、焚烧或深埋
 - C. 隔离治疗
 - D. 预防接种和检疫
11. 关于传染病接触者说法正确的有 ABC
 - A. 指与传染源接触并有受感染可能者
 - B. 检疫期为最后接触日至该病的最长潜伏期
 - C. 可在指定场所进行观察, 限制活动范围, 实施诊察、检验和治疗
 - D. 一定要隔离
12. 关于慢性非传染性疾病说法正确的是 BCD
 - A. 特指某种疾病
 - B. 起病时间长
 - C. 缺乏明确的病因证据
 - D. 一旦发病即病情迁延不愈的非传染性疾病
13. 高血压的预防与控制说法正确的有 ACDE
 - A. 限制钠盐摄入量
 - B. 减少新鲜蔬菜、瓜果的摄入, 补充钾、镁离子
 - C. 限制饮酒及戒酒: <30ml/d
 - D. 减轻体重, 适度的体力活动和体育运动
 - E. 戒烟及保持良好的心理状态
14. 以下属于室内空气污染的室外来源的是 CD
 - A. 室内建筑装饰材料
 - B. 烹调及燃料燃烧
 - C. 质量不合格的生活用水
 - D. 邻居室内装饰材料

15. 职业性有害因素的来源包括 ABC
- A. 生产过程
 - B. 劳动过程
 - C. 生产环境
 - D. 生活环境
16. 关于急性铅中毒说法正确的是 ABD
- A. 多由消化道摄入引起
 - B. 面色苍白、口内金属味、恶心、呕吐、腹胀
 - C. 无明显腹痛
 - D. 严重者可发生中毒性脑病
17. 以下属于一氧化碳中毒表现的有 ABD
- A. 急性缺氧的症状与体征
 - B. 脑水肿
 - C. 面颊部呈青紫色
 - D. 面颊部呈樱桃红色
18. 以下属于膳食营养素参考摄入量的有 ABCD
- A. 平均需要量
 - B. 推荐摄入量
 - C. 适宜摄入量
 - D. 可耐受最高摄入量
19. 食物蛋白质营养价值的评价指标有：ABD
- A. 蛋白质的含量
 - B. 蛋白质的消化率
 - C. 必需脂肪酸的含量与比值
 - D. 蛋白质的生物学价值
20. 属于膳食纤维的生理功能的是 ABC
- A. 增强大肠功能
 - B. 减慢胃排空时间
 - C. 减慢餐后血糖的迅速升高
 - D. 提供能量
21. 关于水溶性维生素说法正确的是 ABD
- A. 体内储存较少
 - B. 容易出现缺乏症
 - C. 摄取过多可引起中毒
 - D. 在加工或烹饪时易丢失
22. 以下属于预后较好的毒蕈中毒类型是 AB
- A. 胃肠炎型
 - B. 神经精神型
 - C. 溶血型
 - D. 肝损伤型
23. 以下不属于食物中毒的有
- A. 暴饮暴食所致急性胃肠炎
 - B. 食源性寄生虫病
 - C. 食物过敏
 - D. 有毒食物的慢性损害
24. 我国医药卫生体制改革的原则 ABCD

- A. 坚持以人为本
- B. 坚持立足国情
- C. 坚持公平与效率统一，政府主导与发挥市场机制作用相结合
- D. 坚持统筹兼顾

25. 符合传染病流行趋势 ABC

- A. 老传染病卷土重来
- B. 新传染病不断涌现
- C. 以上都对
- D. 以上都不对

26. 传染病发展过程分为哪几期？ ABC

- A. 潜伏期
- B. 临床症状期
- C. 恢复期
- D. 以上都不对

27. 病原携带者的类型包括 ABC

- A. 潜伏期病原携带者
- B. 恢复期病原携带者
- C. 健康病原携带者
- D. 以上都不对

28. 经空气传播方式有哪些？ ABC

- A. 飞沫传播
- B. 飞沫核传播
- C. 尘埃传播
- D. 直接接触

29. 空气传播的流行病学特征 ABCD

- A. 传播途径易实现，易爆发流行；
- B. 冬春季高发；
- C. 儿童多见；
- D. 受居住条件和人口密度的影响。

30. 经水传播方式有哪些？ ABD

- A. 饮用水污染
- B. 疫水接触传播
- C. 以上都不对
- D. AB 都正确

31. 经食物传播的流行病学特征 ABCD

- A. 吃污染食物者发病，不食者不发病；
- B. 一次性大量污染，可形成爆发；
- C. 停止供应该食物后，爆发即可平息；
- D. 潜伏期较短。

32. 经节肢动物传播的方式有？ AB
- A. 机械性传播
 - B. 生物性传播（吸血传播）
 - C. 直接接触
 - D. 间接接触
33. 属于常见的慢性非传染性疾病类型的有 ABCDE
- A. 高血压
 - B. 血脂异常
 - C. 冠心病
 - D. 糖尿病
 - E. 恶性肿瘤
34. 属于高血压发病的危险因素的有 ABCDE
- A. 食盐的过度摄入
 - B. 蔬菜和水果摄入量少（钾、镁离子摄入少）
 - C. 肥胖、体力活动减少
 - D. 大量饮酒
 - E. 精神高度紧张等
35. 高血压的预防与控制措施有 ABCD
- A. 限制钠盐摄入量：<10g/d
 - B. 增加新鲜蔬菜、瓜果的摄入，补充钾、镁离子
 - C. 限制饮酒及戒酒：<30ml/d
 - D. 减轻体重
 - E. 高强度体力活动和体育运动
36. 血脂异常的危险因素有 ABCD
- A. 饱和脂肪（奶油、动物脂肪）的过度摄取
 - B. 身体活动不足
 - C. 超重与肥胖
 - D. 吸烟
37. 血脂异常的预防与控制措施有 ABCD
- A. 膳食指导
 - B. 减轻体重指导
 - C. 体力活动及运动指导
 - D. 戒烟指导
38. 恶性肿瘤的危险因素有 ABCD
- A. 人口老龄化
 - B. 不健康的生活方式
 - C. 环境因素
 - D. 遗传因素
39. 大气污染的人为来源 BCD
- A. 森林火灾

- B. 燃料的燃烧生产过程中排放
 - C. 生活炉灶和采暖锅炉
 - D. 汽车废气
40. 影响大气中污染物浓度的因素有 ABCD
- A. 排出量
 - B. 排出高度
 - C. 距污染源的距離
 - D. 风向、风速
41. 大气污染对人体健康的影响属于直接危害的有 ABC
- A. 煤烟型烟雾事件；
 - B. 光化学烟雾事件 ；
 - C. 生产事故
 - D. 温室效应
42. 室内空气污染的室内来源有 ABCD
- A. 人类活动
 - B. 建筑装饰材料
 - C. 烹调及燃料燃烧
 - D. 生物性污染
43. 室内空气污染的室外来源有 ABCDE
- A. 大气
 - B. 房基地
 - C. 质量不合格的生活用水
 - D. 人为带入室内
 - E. 邻居家传来
44. 甲醛对健康的影响有 ABCD
- A. 刺激眼睛和呼吸道粘膜
 - B. 变态反应
 - C. 免疫功能异常
 - D. 损伤细胞内遗传物质
45. 属于细菌性介水性传染病的有 ABC
- A. 霍乱
 - B. 伤寒
 - C. 痢疾
 - D. 脊髓灰质炎
 - E. 阿米巴痢疾
46. 水俣病的典型表现有 ABCD
- A. 末梢感觉减退
 - B. 视野向心性缩小
 - C. 听力障碍

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/407014033102010004>