

2023-2024 年云南省永德县《执业药师之西药学专业二》考试完整版（考点梳理）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 乳酶生是

- A: 胃肠解痉药
- B: 生乳剂
- C: 干燥活乳酸杆菌制剂
- D: 抗酸药

答案：C

2. 可诱发和加重哮喘的是

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 硝酸甘油
- D: 胍乙啶

答案：A

3. （2021 年真题）适用于膀胱过度兴奋引起的尿频、尿急或紧迫性尿失禁症状治疗的药物是（）。

- A: 坦洛新
- B: 托拉塞米
- C: 托特罗定
- D: 度他雄胺

答案：C

4. 下列不属于雌激素作用部位的是

- A: 阴道
- B: 子宫
- C: 输卵管
- D: 肾脏

答案：D

5. 减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状其所激动的受体是（）

- A: H 受体
- B: M 受体
- C: α 受体
- D: N 受体

答案：C

6. 丙磺舒与水杨酸盐和阿司匹林合用（）

- A: 子宫内膜突破性出血
- B: 代谢加快而失效
- C: 抑制排酸作用
- D: 代谢加速而导致意外怀孕

答案：C

7. （2015 年真题）属于二肽基肽酶-4 抑制剂的是（）。

- A: 罗格列酮
- B: 二甲双胍
- C: 西格列汀
- D: 阿卡波糖

答案：C

8. 治疗高脂血症达到中等强度（每日剂量可降低 LDL30%~50%），所需药物剂量最小的是

- A: 匹伐他汀
- B: 辛伐他汀
- C: 氟伐他汀
- D: 洛伐他汀

答案：A

9. 可阻断钠通道，用于治疗室性心律失常的药品是

- A: 氯沙坦
- B: 硝酸甘油
- C: 利多卡因
- D: 氨氯地平

答案：C

10. 法莫替丁可用于治疗

- A: 心肌梗死
- B: 十二指肠溃疡
- C: 十二指肠穿孔
- D: 急慢性胃炎

答案：B

11. 下列有关奎尼丁的叙述，不正确的是

- A: 可用于强心苷中毒
- B: 抑制 Na⁺内流和 K⁺外流
- C: 具有抗胆碱和仅受体阻断作用
- D: 可用于治疗心房扑动和心房颤动

答案：A

12. 骨髓抑制最严重的是()

- A: 顺铂
- B: 卡铂
- C: 奥沙利铂
- D: 亚叶酸钙

答案: B

13. 黄体酮属于

- A: 雌激素
- B: 皮质激素
- C: 孕激素
- D: 雄性激素

答案: C

14. 下列哪项不是胰岛素的正确使用方法

- A: 未使用的胰岛素应在 2℃~8℃ 冷藏保存
- B: 混悬型胰岛素可以静脉注射
- C: 药物过量须及时给予葡萄糖或口服糖类
- D: 每次注射需要更换不同部位

答案: B

15. 下述属于非依赖型中枢性镇咳药的是

- A: 右美沙芬
- B: 苯丙哌林
- C: 可待因
- D: 氨溴索

答案: A

16. 阿糖胞苷的作用机制是()

- A: 胸腺核苷合成酶抑制剂
- B: DNA 多聚酶抑制剂
- C: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- D: 核苷酸还原酶抑制剂

答案: B

17. 缺铁性贫血患者通常口服铁剂治疗，如有条件进行铁蛋白测定，停药应在血清铁蛋白上升到

- A: $30\sim 50\mu\text{g/L}$
- B: $10\sim 15\mu\text{g/L}$
- C: $3\sim 5\mu\text{g/L}$
- D: $20\sim 30\mu\text{g/L}$

答案: A

18. 对丙咪嗪过敏的患者禁用

- A: 氨己烯酸
- B: 苯妥英钠
- C: 丙戊酸钠
- D: 卡马西平

答案: D

19. 维生素 D 缺乏时会导致()

- A: 角膜软化症
- B: 脚气病
- C: 成人佝偻病
- D: 坏血病

答案：C

20. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌的糖肽类抗菌药物是

- A: 罗红霉素
- B: 克拉霉素
- C: 红霉素
- D: 万古霉素

答案：D

21. 患者，男性，48 岁，醉酒呕吐后出现发热、咳脓痰 1 周，头孢唑林治疗 4 天后体温稍下降，但痰量仍较多，有臭味，考虑厌氧菌感染，应加用以下哪种药物

- A: 阿米卡星
- B: 阿奇霉素
- C: 氟康唑
- D: 甲硝唑

答案：D

22. 下列药物除哪项外都属于钙拮抗剂()

- A: 硝苯地平
- B: 维拉帕米
- C: 地尔硫
- D: 溴苄胺

答案：D

23. 下述质子泵抑制剂中对氯吡格雷疗效影响最小的是

- A: 右兰索拉唑
- B: 埃索美拉唑

C: 奥美拉唑

D: 泮托拉唑

答案: A

24. (2017 年真题) 重症肌无力、癫痫禁用的 ()

A: 哌拉西林

B: 左氧氟沙星

C: 米诺环素

D: 甲硝唑

答案: B

25. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。

医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

A: 甲氧氯普胺

B: 莫沙必利

C: 胰酶

D: 多潘立酮

答案: C

26. 属于 α 受体激动剂，缓解鼻黏膜充血肿胀的药物是

A: 克罗米通

B: 过氧化氢

C: 酮替芬

D: 麻黄碱

答案: D

27. 口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

- A: 妥布霉素
- B: 异烟肼
- C: 庆大霉素
- D: 新霉素

答案：C

28. 维生素 B12 主要用于治疗的疾病是

- A: 再生障碍性贫血
- B: 巨幼细胞性贫血
- C: 缺铁性贫血
- D: 慢性失血性贫血

答案：B

29. 长期使用糖皮质激素不会导致

- A: 骨质疏松
- B: 糖尿病
- C: 高钾血症
- D: 高血压

答案：C

30. 作用于远曲小管近端的中效利尿药是

- A: 氯苯蝶啶
- B: 呋塞米
- C: 乙酰唑胺
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

31. 对抗新产生的血栓应首选

- A: 右旋糖酐
- B: 尿激酶
- C: 肝素
- D: 华法林

答案：B

32. 下列关于紫杉醇的描述，错误的是

- A: 与多西他赛相比，神经毒性和心脏毒性都较轻
- B: 广谱、天然抗肿瘤药
- C: 长期应用可产生抗药性，出现多药耐药性现象
- D: 应预防由紫杉醇所致的超敏反应

答案：A

33. 患者，男性，46 岁，经常头痛，头晕近 8 年。2 天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压 230 / 120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为 202 / 120mmHg，且气急不能平卧，心率 108 次 / 分，早搏 3 次 / 分。两肺底有湿啰音。

- A: 紧急时可静脉注射
- B: 可使用微量输液泵
- C: 使用 5%葡萄糖注射液配制后保存与应用不应超过 24 小时
- D: 在避光输液瓶中使用

答案：A

34. 容易引起球后神经炎的抗结核药物是

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福平

C: 异烟肼

D: 链霉素

答案: A

35. 对军团菌有效的药物是

A: 链霉素

B: 两性霉素 B

C: 阿奇霉素

D: 甲硝唑

答案: C

36. 肥胖糖尿病患者选用()

A: 二甲双胍

B: 格列本脲

C: 丙硫氧嘧啶

D: 胰岛素

答案: A

37. 可使前者作用加强或延长的是

A: 红霉素

B: 他莫昔芬

C: 氯丙嗪

D: 维生素 C

答案: C

38. 关于法莫替丁用药注意事项的说法, 错误的是

A: 与西咪替丁相比, 对性激素的影响较轻

B: 以原形从肾脏排泄, 肾功能不全患者易造成药物在体内蓄积

C: 抑制肝脏细胞色素 P450 酶的活性，从而影响茶碱、华法林、地西泮等药物的代谢

D: 肾功能不全患者需要减少给药剂量或延长给药间隔

答案：C

39. 小剂量碘主要用于

A: 黏液性水肿

B: 单纯性甲状腺肿

C: 抑制甲状腺素的释放

D: 呆小病

答案：B

40. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食，增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg / d 治疗。

A: BUN

B: CK

C: Cr

D: AST

答案：B

41. 属于 M 期细胞周期特异性的抗肿瘤药是

A: 阿糖胞苷

B: 氮芥

C: 顺铂

D: 长春碱

答案：D

42. 茶碱属于

- A: 白三烯调节剂
- B: 黄嘌呤类药物
- C: β 肾上腺素受体激动剂
- D: M 胆碱受体阻断剂

答案：B

43. 毒性低，但胃肠刺激症状较常见的药物是()

- A: 对氨基水杨酸
- B: 吡嗪酰胺
- C: 异烟肼
- D: 利福平

答案：A

44. 降低肾素活性最强的药物是

- A: 硝苯地平
- B: 卡托普利
- C: 可乐定
- D: 普萘洛尔

答案：D

45. 患者，男性，46 岁，经常头痛，头晕近 8 年。2 天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压 230 / 120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为 202 / 120mmHg，且气急不能平卧，心率 108 次 / 分，早搏 3 次 / 分。两肺底有湿啰音。

- A: 硫氰酸盐不超过 50 $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 2 $\mu\text{mol} / \text{ml}$
- B: 硫氰酸盐不超过 100 $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 3 $\mu\text{mol} / \text{ml}$
- C: 硫氰酸盐不超过 20 $\mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 1 $\mu\text{mol} / \text{ml}$

D: 硫氰酸盐不超过 $200 \mu\text{g} / \text{ml}$ ，氰化物不超过 $4 \mu\text{mol} / \text{ml}$

答案：B

46. 可与克拉霉素、兰索拉唑联合抗幽门螺杆菌治疗的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 苄星青霉素
- C: 青霉素
- D: 头孢唑林

答案：A

47. (2018 年真题) 关于奥司他韦作用特点的说法, 错误的是 ()

- A: 应严格掌握奥司他韦适应证, 不能用于流感的预防
- B: 1 岁以上儿童可以使用奥司他韦
- C: 治疗流感时, 首次使用奥司他韦应当在流感症状出现后的 36 小时以内
- D: 奥司他韦可用于甲型和乙型流感的治疗

答案：A

48. 属于吗啡的前药, 过量或长期使用易产生成瘾性的是

- A: 氨溴索
- B: 右美沙芬
- C: 苯丙哌林
- D: 可待因

答案：D

49. 治疗轻度尿崩症可选用

- A: 螺内酯
- B: 呋塞米

C: 乙酰唑胺

D: 氢氯噻嗪

答案: D

50. 葡醛内酯属于

A: 抑酸剂

B: 促胃肠动力药

C: 胃黏膜保护剂

D: 肝胆疾病辅助用药

答案: D

51. 大环内酯类的主要清除途径是

A: 主要经肾脏排泄

B: 主要经呼吸道排泄

C: 经肝、肾双途径清除

D: 主要经肝脏清除

答案: D

52. 又称为腺嘌呤，是生物体内辅酶与核酸的组成和活性成分，具有刺激骨髓白细胞增生作用的是

A: 鲨肝醇

B: 维生素 B₄

C: 丙酸诺龙

D: 小檗胺

答案: B

53. 可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是()

A: 维拉帕米

B: 胺碘酮

C: 美托洛尔

D: 地尔硫

答案: B

54. 下列不属于治疗前列腺增生的药物是

A: 特拉唑嗪

B: 西地那非

C: 非那雄胺

D: 坦洛新

答案: B

55. 治疗可能引起中枢神经系统毒性，包括精神状态改变、肌阵挛和癫痫发作，故不应用于治疗脑膜炎的是

A: 西司他丁

B: 亚胺培南

C: 美罗培南

D: 厄他培南

答案: B

56. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A: 2 天

B: 6 天

C: 4 天

D: 8 天

答案: C

57. 配制静脉输液时,应选择氯化钠注射液或乳酸钠林格注射液稀释,不得使用葡萄糖注射液稀释的抗真菌药是()

- A: 卡泊芬净
- B: 两性霉素 B
- C: 伏立康唑
- D: 氟康唑

答案: A

58. 糖尿病合并轻中度肾功能不全者可选用()

- A: 格列齐特
- B: 胰岛素
- C: 格列吡嗪
- D: 格列喹酮

答案: D

59. (2015 年真题) 患者, 男, 56 岁。有高血压病史 4 年。体检: 血压 156/96mmHg, 无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者若长期服用依那普利片, 除应监测血压、心、肾功能外。还应监测的指标是 ()。

- A: 血钾
- B: 血钠
- C: 血氯
- D: 血钙

答案: A

60. 用于缺血性心脏病、血栓栓塞性疾病、心肌缺血的诊断试验的药物是

- A: 双嘧达莫
- B: 硝酸甘油
- C: 硝苯地平
- D: 普萘洛尔

答案：A

61. 抑制核苷酸还原酶

- A: 甲氨蝶呤
- B: 羟基脲
- C: 氟尿嘧啶
- D: 阿糖胞苷

答案：B

62. 可用于习惯性流产的药品是()

- A: 戊酸雌二醇
- B: 地屈孕酮
- C: 他莫昔芬
- D: 依普黄酮

答案：B

63. 发热需采用非甾体抗炎药时，应首选

- A: 布洛芬
- B: 阿司匹林
- C: 双氯芬酸
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

64. 可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁用的抗菌药物是

- A: 四环素类
- B: 酰胺醇类(氯霉素)
- C: 氨基糖苷类
- D: 林可霉素类

答案：C

65. (2016 年真题) 属于促胰岛素分泌剂的是

- A: 那格列奈
- B: 艾塞那肽
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：A

66. (2019 年真题) 依托泊苷注射液的溶媒选择要求是 ()

- A: 先用乳酸钠注射液溶解，再用氯化钠注射液或 5%葡萄糖注射液进一步稀释
- B: 5%葡萄糖注射液稀释
- C: 先用氯化钠注射液溶解，再用 5%葡萄糖注射液进一步稀释
- D: 氯化钠注射液稀释

答案：D

67. (2015 年真题) 可抑制鲨烯环氧酶的活性，属于丙烯胺类抗皮肤真菌药的是 ()。

- A: 阿莫罗芬
- B: 制霉菌素
- C: 特比萘芬

D: 联苯吡唑

答案: C

68. 艾司奥美拉唑的活性形式是

A: 巴柳氮

B: 亚磺酰胺

C: 奥沙拉嗪

D: 美沙拉嗪

答案: B

69. 钩端螺旋体病、梅毒、回归热的首选药的是()

A: 氯霉素

B: 青霉素

C: 两性霉素 B

D: 克林霉素

答案: B

70. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC3.

$0 \times 10^{12} / L$ ，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，

MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

A: 维生素 C 与本品同服，有利于吸收

B: 服用铁剂时可以喝果汁，但不能喝牛奶

C: 进食促进铁剂的吸收

D: 口服型铁剂服用时间还根据个体反应而定

答案: C

71. 可以与青霉素 G 混合的是

- A: 维生素 C
- B: 葡萄糖注射液
- C: 维生素 B 族
- D: 生理盐水

答案：D

72. 甲状腺危象选用 ()

- A: 胰岛素
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 二甲双胍
- D: 格列本脲

答案：B

73. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 蔗糖铁
- B: 叶酸
- C: 琥珀酸亚铁
- D: 硫酸亚铁

答案：A

74. (2021 年真题) 属于细胞血凝素抑制剂的抗流感病毒药物是 ()

- A: 阿比多尔
- B: 法匹拉韦
- C: 博洛昔韦
- D: 奥司他韦

答案：A

75. (2015 年真题) 属于胰岛素增敏剂的是 () 。

- A: 阿卡波糖
- B: 罗格列酮
- C: 二甲双胍
- D: 西格列汀

答案: B

76. (2016 年真题) 可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

- A: 维生素 B12
- B: 硫酸亚铁
- C: 重组人促红素
- D: 人血白蛋白

答案: C

77. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是 () 。

- A: 依折麦布
- B: 阿昔莫司
- C: 阿托伐他汀
- D: 非诺贝特

答案: C

78. 激动 β 受体，对慢性心力衰竭疗效较好 ()

- A: 氨力农
- B: 地高辛
- C: 硝普钠
- D: 多巴酚丁胺

答案: D

79. 某患儿高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。关于奥司他韦预防用药的说法，正确的建（）

A: 应于密切接触流感患的 2 天以内预防服用，每急日两次，每次 75mg

B: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg

C: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg

D: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg

答案：D

80. 属于第三代喹诺酮类药物的是

A: 吡哌酸

B: 诺氟沙星

C: 莫西沙星

D: 萘啶酸

答案：B

81. 下述不属于抗血小板类药物的是

A: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体激动剂

B: 血栓素 A₂ (TXA₂) 抑制剂

C: 非特异性纤溶酶原激活剂

D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：C

82. 长春新碱

A: 干扰 RNA 转录

B: 干扰核酸生物合成

C: 影响蛋白质合成和功能

D: 直接破坏 DNA 结构和功能

答案：C

83. (2019 年真题) 服药后尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物均可显橘红色的药物是 ()

A: 利福平

B: 乙胺丁醇

C: 吡嗪酰胺

D: 链霉素

答案：A

84. 可能降低甲氨蝶呤血浆药物浓度的药物是

A: 磺胺类

B: 碳酸氢钠

C: 顺铂

D: 丙磺舒

答案：B

85. 伴有前列腺增生的哮喘患者不宜选用的药物是

A: 白三烯受体阻断剂

B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: 长效 B₂ 受体激动剂

D: M 胆碱受体阻断剂

答案：D

86. (2020 年真题) 消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 吲哚美辛
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 塞来昔布

答案：D

87. 在痛风急性期，应禁用的抗痛风药是

- A: 别嘌醇
- B: 布洛芬
- C: 秋水仙碱
- D: 舒林酸

答案：A

88. 患者，女，45 岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是

- A: 双氯芬酸
- B: 格列齐特
- C: 硝苯地平
- D: 雷尼替丁

答案：A

89. 关于他扎罗汀治疗银屑病的叙述，错误的是

- A: 成人每晚(睡前半小时)1 次，一般 12 周，使用面积应不超过 20% 体表面积
- B: 不用于 18 岁以下银屑病患者
- C: 育龄期妇女用药前 2 周，应进行血清或尿液妊娠试验
- D: 对严重的银屑病效果显著

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/408124011062007022>