2024年甘肃省永昌县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题内部题库（夺分金卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.增加胃肠蠕动，影响同服药物吸收

A：青霉素+丙磺舒

B：多潘立酮+维生素C

C：四环素+硫酸亚铁

D：西咪替丁+格列本脲

答案：B

2.依据"处方"的含义及其重要意义，属于处方的医疗文书是

A：病区领药单

B：药品出库单

C：临床诊断书

D：病区用药医嘱单

答案：D

3.（2018年真题）患者，女，53岁，冠心病史2年，目前服用硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙。近三个月因胃痛心境低落、有自杀倾向就诊，临床诊断为消化性溃疡、抑郁症。给予奥美拉唑肠溶片40mgqdpo文拉法辛缓释片150mgqdpo，谷维素片10mgtidpo治疗，患者用药后出现血压升高可能导致该患者血压升高的药物是（）

A：文拉法辛缓释片

B：奥美拉唑肠溶片

C: 阿托伐他汀钙片

D: 硝酸异山梨酯片

答案：A

4.（2019年真题）患者，女，27岁，确诊慢性乙型肝炎3年，近日化验结果:HBV-DNA2×105opies/ml，ALT122U/L。予以抗病毒治疗首选的药物是

A: 阿糖腺苷

B: 泛昔洛韦

C: 恩替卡韦

D: 利巴韦林

答案：C

5.归属于药历“用药记录”项下的是

A: 临床诊断

B: 主要实验室检查数据

C: 医保和费用支付情况

D: 联合用药

答案：D

6.类风湿关节炎的治疗目标除了控制症状，更为关键的是应用改善病情的药物，以延缓病情发展，避免致残。下列属于改善病情的抗风湿药是

A: 泼尼松

B: 抗疟药

C: 对乙酰氨基酚

D: 阿达木单抗

答案：B

7.脑梗死的分期恢复期

A: 1个月内

B: 1～3个月

C: 2周

D: 1~6个月

答案：D

8.可使驾驶员出现定向力障碍的药物是

A: 东莨菪碱

B: 吲达帕胺

C: 哌替啶

D: 右美沙芬

答案：C

9.(儿童用药特点)儿童病情危重抢救时多采用

A: 口服给药

B: 皮下注射

C: 局部给药

D: 静脉给药

答案：D

10.从饮食、运动上严格管理，最适合于

A: 骨质疏松

B: 焦虑障碍

C: 高血压

D: 糖尿病

答案：D

11.适用于早期、轻度症状者的是

A: 左旋多巴

B: 苯海索

C: 恩托卡朋

D: 司来吉兰

答案：D

12.含有右美沙芬的抗感冒药禁用于

A: 患有心脏病、高血压、甲状腺功能亢进、青光眼、前列腺增生的患者

B: 有血小板减少症、有出血倾向者、上消化道出血和(或)穿孔病史者

C: 疲劳和生活规律紊乱者

D: 妊娠初期及哺乳期妇女

答案：D

13.患者，男，65岁，慢性咳嗽、喘息10余年，活动后症状明显，近7天症状加重入院，伴便秘，每周2次排便。既往有高血压病史12年；长期口服硝苯地平控释片30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温36．6℃，P82次／分，R22次／分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规WBC11．2×109／L，肺功能FEV1／FVC60％，FEV155％。治疗方案如下：氨溴索注射液30mgtidivgtt，莫西沙星氯化钠注射液0.4gbidivgtt，异丙托溴铵溶液0.5mgbid雾化吸入，布地奈德混悬液1mgbid雾化吸入

A: 氨溴索注射液

B: 异丙托溴铵注射液

C: 布地奈德混悬液

D: 硝苯地平控释片

答案：B

14.关于TIA的药物治疗说法不正确的是

A: 对伴发房颤、风湿性二尖瓣病变的患者建议选用华法林抗凝治疗

B: 对反复发生TIA的患者应首先考虑选用抗血小板药物

C: 抗凝治疗为非心源性TIA的常规治疗

D: 小剂量肠溶阿司匹林能一定程度上降低卒中再发

答案：C

15.美国食品药品监督管理局(FDA)根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为A、B、C、D、X五个级别。头孢曲松属于()

A: A级

B: C级

C: D级

D: B级

答案：D

16.患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15kg。1天前开始发热，体温39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热20h左右出现腹泻，每间隔2～3小时排1次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 洛哌丁胺

B: 鞣酸蛋白

C: 药用炭

D: 小檗碱

答案：A

17.可出现痤疮样皮疹的是（）

A: 博来霉素

B: 阿霉素

C: 吉非替尼

D: 氟尿嘧啶

答案：C

18.给药1次后可提供长达1年的药物是

A: 探亲避孕药

B: 甲地孕酮硅胶环

C: 长效复方口服避孕药

D: 口服低剂量孕激素避孕药

答案：B

19.下列通用名与别名的组合中不是同一种药品的是（）

A: 氨甲苯酸与止血敏

B: 利可君与利血生

C: 醋酸氯己定与洗必泰

D: 桂利嗪与脑益嗪

答案：A

20.(肾功能不全者的药物排泄机制)心力衰竭导致药物经肾排泄减少

A: 肾小球滤过减少

B: 肾血流量减少

C: 肾小管分泌减少

D: 肾小管重吸收增加

答案：B

21.当创伤应激严重时，由葡萄糖与脂肪提供NPC的比例是

A: NPC7：3

B: NPC5：5

C: 150kcal：1gN

D: 100kcal：1gN

答案：B

22.对中重度痤疮伴感染显著者推荐使用

A: 0.1%阿达帕林凝胶

B: 红霉素-过氧苯甲酰凝胶

C: 0.03%维A酸乳膏剂

D: 10%过氧苯甲酰凝胶

答案：A

23.从疗效和费用等因素考虑，应首选的DMARDs是

A: 来氟米特

B: 柳氮磺吡啶

C: 青霉胺

D: 甲氨蝶呤

答案：D

24.重度癌性疼痛宜选用的药物是

A: 阿司匹林

B: 吗啡

C: 多奈哌齐

D: 可待因

答案：B

25.因不良反应很小，可在老年人群中使用的治疗失眠症的药物为

A：米氮平

B：艾司唑仑

C：佐匹克隆

D：雷美尔通

答案：D

26.万络（罗非昔布）撤市是发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了3倍；此例体现了药物警戒的作用包括

A：药品上市前风险评估

B：发现与规避假、劣药流入市场

C：发现药品说明书问题

D：药品上市后风险评估

答案：D

27.对胃肠刺激较小，体内分解为两种解热镇痛药、作用时间长的是

A：吲哚美辛

B：贝诺酯

C：阿司匹林

D：布洛芬

答案：B

28.运动员长期使用可促进肌肉发达，但易导致不孕和心脑血管疾病的兴奋剂是

A：人促红细胞生成素

B：可待因

C：氢氯噻嗪

D：苯丙酸诺龙

答案：D

29.（2015年真题）静脉注射青霉素的适宜溶媒是（）。

A：复方氯化钠注射液

B：5%葡萄糖注射液

C：0.9氯化钠注射液

D：50%葡萄糖注射液

答案：C

30.可引起儿童良性颅压增高、囟门隆起的药物是

A：氯霉素

B：维生素A

C：苯妥英钠

D：抗组胺药

答案：B

31.属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的药物是

A：甲基多巴

B：非诺贝特

C：依折麦布

D：辛伐他汀

答案：D

32.儿童退热的用药选择和单次用量,正确的是()

A：对乙酰氨基酚25~50mg/kg

B：阿司匹林30~60mg/kg

C: 对乙酰氨基酚 10~15mg/kg

D: 布洛芬 0.4~0.6g（12岁以上儿童）

答案：C

33.需要用10%酒精或植物油冲洗是清除（）

A: 皮肤污染酚类毒物

B: 眼内污染毒物

C: 毛发被毒物污染

D: 眼内进入固体腐蚀性颗粒

答案：A

34.口服给药方便、安全、经济，以下患者中，最适宜口服给药的是

A: 胃肠反应大的患者

B: 吞咽困难的老年人

C: 病情危重的患者

D: 慢性病或轻症患者

答案：D

35.告知"人促红素可引起纯红细胞再生障碍性贫血"属于

A: 药物相互作用

B: 禁忌证

C: 新药信息

D: 药品不良反应

答案：D

36.患儿，3岁，因发热就诊，体温38.8℃。药师应推荐的治疗药物是

A: 20%安乃近滴鼻剂

B: 布洛芬混悬液

C：阿司匹林肠溶片

D：塞来昔布缓释片

答案：B

37.患者，男，62岁，以“咳嗽、咳痰、胸闷、呼吸困难”为主诉就医，问诊“有吸烟史30年，2年前从水泥厂退休”。肺功能检查FEV1占预计值35%。诊断为慢性阻塞性肺疾。针对该患者，治疗方案应选择

A：联合使用福莫特罗+倍氯米松

B：单一、规律使用布地奈德吸入粉雾剂

C：单一、规律口服泼尼松片

D：单一、规律使用沙丁胺醇气雾剂

答案：A

38.能促使体格强壮、肌肉发达、增强爆发力，并缩短体力恢复时间的兴奋剂

A：利尿剂

B：蛋白同化激素

C：β-受体阻断剂

D：精神刺激剂

答案：D

39.HMG-CoA还原酶抑制剂

A：吉非贝齐

B：阿昔莫司

C：考来烯胺

D：辛伐他汀

答案：D

40.代表乙型肝炎病毒e抗原的是

A：HBcAb

B：HBeAg

C：HBsAb

D：HBeAb

答案：B

41.可用于了解肾小球滤过功能的是

A：肌酐

B：胆固醇

C：淀粉酶

D：尿素氮

答案：D

42.一些药品吸收二氧化碳发生碳酸化，归属于

A：空气

B：日光

C：湿度

D：温度

答案：A

43.静脉滴注红霉素的适宜溶媒是

A：复方氯化钠注射液

B：50%葡萄糖注射液

C：0.9%氯化钠注射液

D：5%葡萄糖注射液

答案：D

44.处方外文缩写OU代表()

A：左耳

B：右耳

C：左眼

D：双眼

答案：D

45.有磺胺类过敏史者禁用的药物是

A：硫酸锌滴眼液

B：酞丁安滴眼液

C：可的松滴眼液

D：磺胺醋酰钠滴眼液

答案：D

46.适用于静脉推注的抗肿瘤药为

A：塞替派

B：甲氨蝶呤

C：阿糖胞苷

D：氮芥

答案：D

47.治疗反复性偏头痛推荐应用的处方药是

A：谷维素

B：麦角胺咖啡因

C：阿司匹林

D：苯妥英钠

答案：B

48.依据权威的专科诊疗指南是

A：药物治疗的有效性

B：药物治疗的规范性

C：药物治疗的安全性

D：药物治疗的方便性

答案：B

49.（2015年真题）患者，男，50岁，血压170/95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是（）。

A：β受体阻滞剂+ARB

B：利尿剂+AR

C：利尿剂+CCB

D：α受体阻滞剂+ACEI

答案：C

50.抗胆碱能药

A：苯海索

B：左旋多巴

C：司来吉兰

D：恩托卡朋

答案：A

51.1级高血压标准是

A：收缩压140～159mmHg和(或)舒张压90～99mmHg

B：收缩压160～179mmHg和(或)舒张压100～109mmHg

C：收缩压120～139mmHg和(或)舒张压80～89mmHg

D：收缩压≥180mmHg和(或)舒张压≥110mmHg

答案：A

52.下列药物中，能解救含亚硝酸盐的食物中毒的是

A：维生素K1

B：普萘洛尔

C：亚甲蓝

D：维生素B6

答案：C

53.目前推荐的绝经期激素补充治疗的窗口期是()

A：绝经后10年之内或60岁以前

B：绝经后5年之内或大于60岁

C：绝经后5年之内

D：大于60岁

答案：A

54.可能导致γ-谷氨酰转移酶升高的药物是

A：阿司匹林

B：氯氮平

C：胰岛素

D：苯妥英钠

答案：D

55.血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST)的正常值参考范围是

A：速率法：成人<40U/L

B：速率法：<40U/L

C：成人<60U/L

D：<40U/L

答案：A

56.引起心悸、心绞痛发作的药物是

A：碘和碘化物

B：胰岛素

C：左甲状腺素

D：丙硫氧嘧啶

答案：C

57.能监测用药过程错误的真实发生率的是

A：直接观察

B：岗位工作问责

C：计算机检测方法

D：病历审查

答案：A

58.血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

A：男性＜40U/L

B：成人＜50U/L

C：男性11～50U/L

D：成人＜40U/L

答案：D

59.以下属于急性肾盂肾炎表现的是（）

A：约30%可出现血尿

B：尿液常浑浊、有异味

C：可出现排尿不适、下腹痛和排尿困难

D：老年人表现不典型，可仅表现为纳差、淡漠、谵妄等

答案：D

60.治疗咳嗽应依据咳嗽的频率和程度选药，剧咳者宜首选的止咳非处方药是

A：吗啡

B：右美沙芬

C：可待因

D：苯丙哌林

答案：D

61.（2018年真题）患者，男58岁，高血压病史5年，吸烟史40年，日均40支，6小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立，家属发现其说话迟钝含混，右侧嘴唇变浅，意识清楚，到某院急诊BP190/120mmHg，血常规基本正常，行头部MRI检查后，诊断为急性脑梗死。

A：甘露醇注射液250mlq6hiv

B：尼莫地平注射液20mgqdiv

C：呋塞米片200mgqdpo

D：胞二磷胆碱注射液200mgqdiv

答案：A

62.关于肝功能不全患者用药，叙述不正确的是

A：明确诊断，合理选药

B：避免或减少使用肝毒性大的药物

C：肝功能不全而肾功能正常的患者可选用对肝毒性小，并且从肾脏排泄的药物

D：口服肝毒性较大时可改为注射给药

答案：D

63.以下药物中，用于治疗细菌感染性腹泻应首选的是

A：维生素

B：抗生素

C：黄连素

D：谷维素

答案：C

64.滥用人血白蛋白及肿瘤辅助治疗药，应评判为

A：无适应证用药

B：有禁忌证用药

C：过度治疗用药

D：联合用药不适宜

答案：C

65.有潜在的肺毒性的是

A：呋喃妥因

B：双嘧达莫

C：苯巴比妥

D：氯苯那敏

答案：A

66.某男性，27岁，间断上腹痛3年，表现为餐后痛，约1～2h后缓解，以冬春季多发。

A：PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

B：PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂

C：PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁

D：法莫替丁+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

答案：A

67.对照的系列病例观察属于

A：四级证据

B：一级证据

C：三级证据

D：二级证据

答案：A

68.每1疗程期间应停药3天的是

A：秋水仙碱

B：泼尼松

C：别嘌醇

D：苯溴马隆

答案：A

69.由于药物的利尿作用，服用后需要大量饮水以防止脱水的是

A：氨茶碱

B：苯溴马隆

C：依替膦酸二钠

D：莫西沙星

答案：A

70.糖尿病患者服用后可使血糖降低或升高的药物是

A：培氟沙星

B：加替沙星

C：头孢哌酮

D：培高利特

答案：B

71.下列药学服务的对象中，不属于药学服务特殊人群的是

A：特殊体质者

B：血液透析者

C：住院患者

D：小儿、老年人

答案：C

72.关于口服避孕药的使用，下列说法不正确的是（）

A：口服避孕药引起的不规则阴道出血，如流血偏多者，每晚在服用避孕药同时加服雌激素直至停药

B：应用复方短效口服避孕药者，停药后即可妊娠

C：口服避孕药引起的类早孕反应，一般不需特殊处理，坚持服药数个周期后可自然消失

D：口服避孕药中的雌激素可使HDL-C降低

答案：D

73.患者，男，28岁，2天前因淋雨后出现发热，体温最高达39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病，可首选的抗菌药物是：

A：头孢哌酮舒巴坦

B：亚胺培南西司他丁

C：头孢拉定

D：阿米卡星

答案：C

74.药品质量缺陷，包括

A：药品名称音似

B：须冷藏药品

C：片剂药品受潮裂片

D：药品名称形似

答案：C

75.ADR报表内容填写不齐全、等待补充，或因果关系难以定论，缺乏文献资料佐证；可评价为

A：可能无关

B：很可能

C：待评价

D：可能

答案：C

76.（2018年真题）患者,男,65岁,诊断为高血压（2级）,同时有哮喘病史,不宜选用的药物是（）

A：卡托普利

B：普萘洛尔

C：多沙唑嗪

D：非洛地平

答案：B

77.“以快速、准确地获得问询问题答案”的咨询服务方法步骤是

A：形成答案并以口头形式提供给询问者

B：对问题进行确定并归类

C：对文献进行评价、分析和整理

D：确立有效的检索方法、查阅文献

答案：C

78.以下选项中，属于长效类巴比妥类镇静催眠药的是()。

A：苯巴比妥

B：异戊巴比妥

C：戊巴比妥

D：异丁巴比妥

答案：A

79.阿托品

A：可使驾驶员视物模糊或辨色困难

B：可使驾驶员出现眩晕和幻觉

C：可使驾驶员出现定向力障碍

D：可导致驾驶员多尿或多汗

答案：A

80.老年人服用可能出现认知功能受损、谵妄、跌倒的药物是

A：苯二氮䓬类药

B：甲氧氯普胺

C：哌替啶

D：双嘧达莫

答案：A

81.对局部发生水疱和糜烂者可选用

A：赛庚啶

B：10%樟脑软膏

C：10%氧化锌软膏

D：溃疡膏

答案：C

82.患者，男，53岁。因心前区疼痛6年，加重伴呼吸困难10小时入院。入院前6年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续3～5min，休息后减轻。入院检查：体温37．8℃，心率130次／分，血压80／40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: 发作时可含服作用较快的硝酸酯制剂，首次服用硝酸甘油时，应注意可能发生直立性低血压

B: 他汀类药物能有效降低TC和LDLC，其主要不良反应是头痛、面色潮红、心率反射性加快和低血压等

C: 阿司匹林是常用药，主要不良反应为胃肠道出血或阿司匹林过敏

D: 稳定性心绞痛患者，合并高血压、糖尿病、心力衰竭的患者可选用卡托普利、依那普利等药物

答案：B

83.（2019年真题）患者，男，34岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制，可选用的解救药物是

A: 纳洛酮

B: 亚甲蓝

C: 维生素K

D: 二巯丙醇

答案：A

84.治疗口腔溃疡时，贴敷于溃疡处，每处1片，一日不得超过3片的药物是()

A: 西地碘含片

B: 地塞米松粘贴片

C: 甲硝唑口腔粘贴片

D: 冰硼咽喉散

答案：B

85.属于单胺氧化酶抑制剂的药品是

A: 吗氯贝胺

B: 度洛西汀

C: 雷尼替丁

D: 奥美拉唑

答案：A

86.患者，男，53岁。因心前区疼痛6年，加重伴呼吸困难10小时入院。入院前6年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续3～5min，休息后减轻。入院检查：体温37.8℃，心率130次/分，血压80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: ACEI、AR

B: β受体阻断药、钙拮抗剂、ACEI

C: 硝普钠、利尿药、ACEI

D: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞药、ACEI

答案：B

87.属于治疗荨麻疹的过敏活性物质阻释剂的是

A: 赛庚啶

B: 酮替芬

C: 异丙嗪

D: 去氯羟嗪

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/415001132121012033