

农药合理使用准则（苹果）

农药类型	通用名	商品名	剂型	防治对象	每亩每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每生长季最多施药次数	安全间隔期 (d)	残留限量 mg/kg
杀虫、杀螨剂	敌敌畏 DDVP	敌敌畏	80%乳油	食心虫、卷叶蛾、蚜虫、叶螨、刺蛾、尺蠖、金纹细蛾	1000~1500 倍	喷雾	2	20	0.1
	辛硫磷 phoxim	辛硫磷	50%乳油	蚜虫、尺蠖、刺蛾、卷叶蛾等	1000~1500 倍	喷雾	2	20	0.05
	三氯氟氰菊酯 lambdacyhalothrin	功夫 功夫菊酯	2.5%乳油	桃小食心虫、蚜虫、叶螨	4000~5000 倍 (5.0~6.2mg/L)	喷雾	2	30	全果 0.2
	氟氯菊酯 biphenrin	天王星 虫螨灵	10%乳油	桃小食心虫、叶螨、蚜虫等	3000~5000 倍 (20~33mg/L)	喷雾	2	30	全果 1.0
	溴氰菊酯 deltamethrin	敌杀死	2.5%乳油	桃小食心虫、蚜虫、金纹细蛾、卷叶蛾	1250~2500 倍 (10~20mg/L)	喷雾	3	30	0.1
	氰戊菊酯 fenvalerate	速灭杀丁 杀灭菊酯	20%乳油	桃小食心虫、金纹细蛾	2000~4000 倍 (50~100mg/L)	喷雾	3	30	0.2

氯氰菊酯 cypermethrin	安绿宝 灭百可	10% 乳油	桃小食 心虫	1500~2000 倍 (20~25mg/L)	喷 雾	3	30	2.0
高效氯氰菊酯 beta-permethrin	高灭 灵	4.5% 乳油	桃小食 心虫、尺 蠖、叶螨	1500~2000 倍	喷 雾	2	30	2.0
顺式氰戊菊酯 esfenvalerate	来福 灵	5%乳 油	桃小食 心虫、 蚜虫、卷 叶蛾	2000~3125 倍 (16~25mg/L)	喷 雾	3	30	0.2
甲氰菊酯 fenpropathrin	灭扫 利	20% 乳油	桃小食 心虫、金 纹细蛾、 叶螨	2000~3000 倍 (67~ 100mg/L)	喷 雾	1	30	0.1
灭幼脲	灭幼 脲三 号	25% 悬浮剂	金纹细 蛾、桃小 食心虫 等	1000~2000 倍	喷 雾	2	30	
除虫脲 diflubenzuron	敌灭 灵	25% 可湿性 粉剂	桃小食 心虫、尺 蠖等	1000~2000 倍 (125~ 250mg/L)	喷 雾	3	21	1.0
定虫隆 chlorfluazuron	抑太 宝	5%乳 油	桃小食 心虫、卷 叶蛾等	1000~2000 倍	喷 雾	2	20	
虫酰肼 tebufenozide	米满	20% 悬浮剂	桃小食 心虫、卷 叶蛾等	1000~1500 倍	喷 雾	2	20	
苏云金杆菌 Bt	苏云 金杆 菌Bt	乳剂	桃小食 心虫、卷 叶蛾、刺 蛾等	500 倍	喷 雾	2	15	
噻虫嗪 thiamthoxam	阿克 泰	25% 水溶性 散剂	蚜虫、叶 螨	5000~10000 倍	喷 雾	2	20	0.1

四嗪秦 dofentazine	阿波 罗 螨死 净	50% 悬浮剂	叶螨	5000~6000 倍 (83~ 100mg/L)	喷 雾	2	30	全果 0.5
氟虫脲 flufenoxuron	卡死 克	5%乳 油	叶螨	667~1000 倍 (50~75mg/L)	喷 雾	2	30	全果 0.2
阿维菌素 abamectin	害极 灭 爱福 丁 齐 螨 素	1.0% 乳油	叶螨 金纹细 蛾	5000 倍	喷 雾	2	30	
吡虫啉 imidacloprid	蚜虱 净 一遍 净 大功 臣	10% 可湿性 粉剂	蚜虫、叶 螨、潜叶 蛾	5000 倍	喷 雾	2	20	
苦参碱	苦参 碱	0.3 水 剂	蚜虫、叶 螨	800~1000 倍	喷 雾	2	15	
啶虫脒 acetamiprid	莫比 朗 塞特 生	20% 乳油	蚜虫	2000~2500 倍 (12~15mg/L)	喷 雾	1	30	0.5
抗蚜威 pirimicarb	抗蚜 威 辟蚜 雾	50% 可湿性 粉剂	蚜虫	1200~2000 倍	喷 雾	1	30	0.5
吡啶啉 pyridaben	吡螨 灵	20% 可湿性 粉剂	叶螨	2000~4000 倍	喷 雾	2	20	
	吡螨 净	15% 乳油		2000~3000 倍				

	噻嗪酮 hexthiazox	尼索朗	5%乳油	叶螨	1500~2000 倍 (25~33mg/L)	喷雾	2	30	全果 0.5
--	-------------------	-----	------	----	----------------------------	----	---	----	-----------

			5%可 湿性粉 剂		2000 倍 (25 mg/L)				
	吡蚜胺 tebufenpyrad	必蚜 立克	10% 可湿性 粉剂	叶蚜	2000~3000 倍 (33~50 mg/L)	喷 雾	3	30	全果 0.9
	三唑锡 azocyclotin	倍乐 霸	25% 可湿性 粉剂	叶蚜	1000~1330 倍 (185~ 250mg/L)	喷 雾	3	20	2.0
	唑蚜酯 fenproximate	霸蚜 灵 杀蚜 王	5%悬 浮剂	叶蚜	2000~3000 倍 (17~25mg/L)	喷 雾	2	20	全果 1.0
				锈壁虱	1000~2000 倍 (25~50mg/L)				
杀 菌 剂	多氧霉素 polyoxin	宝丽 安 多抗 霉素	10% 可湿性 粉剂	轮纹病、 落叶斑 点病	1000~1500 倍 (67~ 100mg/L)	喷 雾	3	20	
	氟苯啶醇 fenarimol	乐必 耕	6%可 湿性粉 剂	黑星病、 炭疽病、 白粉病	1000~1500 倍 (40~60mg/L)	喷 雾	3	21	全果 0.1
	菌毒清	菌必 清 灭菌 清	5%水 剂	腐烂病、 枝干轮 纹病	30~50 倍	芽 前 涂 抹			1.0
	腐必清	腐必 清	原油	腐烂病、 枝干轮 纹病	2~3 倍	芽 前 涂 抹			
	异菌脲 iprodione	扑海 因	50% 可湿性 粉剂	轮纹病、 斑点落 叶病	1000~1500 倍 (333~ 500mg/L)	喷 雾	3	20	10
	百菌清 chlorothalonil	百菌 清	75% 可湿性 粉剂	轮纹病、 炭疽病、 白粉病	600~800 倍	喷 雾	4	20	1.0
	三唑酮 triadimefon	粉锈 宁	15% 乳油	白粉病	1500~2000 倍	喷 雾	2	20	0.2

	代森锰锌 mancozeb	大生 代森 锰锌	80% 可湿性 粉剂	轮纹病、 斑点落 叶病	800 倍 (1000mg/L)	喷 雾	3	20	二硫 化碳 3, 乙撑 硫脲 0.05
	波尔多液	波尔 多液	倍量或 多量	轮纹病、 炭疽病、 斑点落 叶病	200 倍	喷 雾	2	20	
	石硫合剂	石硫 合剂		白粉病、 霉心病、 叶螨、介 壳虫类	3~5 波美度	芽 前 喷 雾			
					0.3~0.5 波美 度	喷 雾			
	甲基硫菌灵 thiophanate	甲 基 硫 菌 灵 甲基 托布 津	70% 可湿性 粉剂	轮纹病、 炭疽病、 斑点落 叶病	1000~1500 倍	喷 雾	2	20	5.0
	恶醚唑 difenoconazole	世 高	10% 水分 散颗 粒剂	斑点落 叶病	1500~3000 倍 (33~66 mg/L)	喷 雾	2	20	
	氟硅唑 flusilazol	福星	40% 乳油	黑星、白 粉病、轮 纹病、炭 疽病	6000~8000 倍	喷 雾	2	21	0.2
	多菌灵 carbendazim	多菌 灵	50% 可湿性 粉剂	轮纹病、 炭疽病、 霉心病	600~800 倍	喷 雾	2	20	0.5
除 草	草甘磷 glyphosate	镇 草 宁 农 达	10% 水剂	灭生性 内吸型 除草剂	30~50 倍 (二 年生杂草) 60~150 倍 (一 年生杂草)	喷 雾	严禁 使药 液接 触树 体, 以防 药害	30	0.1

剂									
	百草枯 paraquat	克无踪 对草快	20% 水剂	灭生性 触杀型 除草剂	80~250 倍	喷雾		30	0.2

附录 C（规范性附录）

农药合理使用准则（梨）

农药类型	通用名	商品名	剂型	防治对象	每亩每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每生长期最多施药次数	安全间隔期(d)	残留限量 mg/kg
杀虫、杀螨剂	三氯氟氰菊酯 lambdacyhalothrin	功夫 功夫菊酯	2.5%乳油	梨木虱、梨小食心虫、梨网蝽	2000~4000 倍	喷雾	2	21	0.2
	高效氯氟氰菊酯 beta-permethrin	高灭灵	4.5%乳油	梨木虱、蚜虫、食心虫	2000~3000 倍	喷雾	3	21	0.2
	氯氟菊酯 permethrin	安绿宝 灭百可	10%乳油	梨小食心虫、椿象、梨木虱、黄粉蚜	2000~4000 倍	喷雾	3	21	2.0
	甲氧菊酯 fenpropathrin	灭扫利	20%乳油	梨小食心虫、梨圆蚧、梨木虱、黄粉蚜	2000~3000 倍	喷雾	2	30	0.1

	氰戊菊酯 fenvalerate	速灭 杀丁 杀灭 菊酯	20%乳 油	梨小食 心虫、椿 象、梨木 虱、黄粉蚧	2000~4000 倍	喷 雾	3	20	0.2
--	-------------------------	--------------------------	-----------	------------------------------	----------------	--------	---	----	-----

溴氰菊酯 deltamethrin	敌杀 死	25%乳 油	梨木虱、梨 网蝽、梨小 食心虫、梨 茎蜂、黄粉 蛾、梨圆蚧 等	1500~2500 倍	喷 雾	2	20	0.1
吡虫啉 imidacloprid	蚜虱 净 一遍 净 大功 臣	10%可 湿性粉 剂	梨木虱、 蚜虫、叶 螨	5000~6000 倍	喷 雾	2	20	
辛硫磷 phoxim	辛硫 磷	50%乳 油	梨木虱、 梨网蝽、 梨小食 心虫、梨 茎蜂等	1000 倍	喷 雾	3	20	0.05
氟虫脲 flufenoxuron	卡死 克	5%乳 油	叶螨	667~1000 倍	喷 雾	2	30	0.2
四螨嗪 dofentazine	阿波 罗 螨死 净	50%悬 浮剂	叶螨	5000~6000 倍 (83~ 100mg/L)	喷 雾	2	30	全果 0.5
抗蚜威 pirimicarb	抗蚜 威 辟蚜 雾	50%可 湿性粉 剂	蚜虫	1500~2000 倍	喷 雾	1	30	0.5
啉虫脒 acetamiprid	塞特 生	20%乳 油	蚜虫	2000~2500 倍 (12~ 15mg/L)	喷 雾	1	30	0.5
噻虫嗪 thiamthoxam	阿克 泰	25%水 溶性散 粒剂	蚜虫、梨 木虱	5000~ 10000 倍	喷 雾	2	20	0.1

	灭幼脲	灭幼脲三号	20%悬浮剂	梨星毛虫、梨蜡象、梨小食心虫、梨茎蜂等	1000~1500倍	喷雾	2	30	
杀 菌 剂	啶菌脲 imibenconazole	霉能灵	5%可湿性粉剂	黑星病	1000~1200倍 (43~50 mg/L)	喷雾	2	21	
	氟硅唑 flusilazol	福星	40%乳油	黑星病	8000~10000倍 (40~50 mg/L)	喷雾	2	21	0.2
	氟苯啶啉醇 fenarimol	乐必耕	6%可湿性粉剂	黑星病	1000~1500倍 (40~60mg/L)	喷雾	3	21	全果 0.1
	烯唑醇 diniconazole	速宝利	12.5%可湿性粉剂	黑星病	3000~4000倍 (31~42mg/L)	喷雾	3	21	全果 0.1
	代森锰锌 mancozeb	大生 代森锰锌	80%可湿性粉剂	黑星病、轮纹病、	1200~1500倍	喷雾	3	20	二硫化碳 3, 乙撑硫脲 0.05
	甲基硫菌灵 thiophanate	甲基硫菌灵 甲基托布津	70%可湿性粉剂	轮纹病、褐腐病、黑星病	1500~2000倍	喷雾	2	20	5.0
	恶霉唑 difenoconazole	世高	10%水分散颗粒剂	黑星病	4000~6000倍 (16~33 mg/L)	喷雾	2	20	

	异菌脲 iprodione	扑海因	50%可湿性粉剂	黑星病	1000~1500 倍 (333~500mg/L)	喷雾	3	20	10
	多菌灵 carbendazim	多菌灵	50%可湿性粉剂	轮纹病、黑星病	600~800 倍	喷雾	2	20	0.05
	啮安唑 imibenconazole	霉能灵	15%可湿性粉剂	黑星病	3000~3500 倍 (43~50mg/L)	喷雾	3	28	1.0
	石硫合剂	石硫合剂		黑星病、叶螨、梨圆蚧	3~5 波美度	芽前喷雾			
	百菌清 chlorothalonil	百菌清	75%可湿性粉剂	黑星病、黑斑病、轮纹病	500 倍	喷雾	3	25	1.0
除 草 剂	草甘磷 glyphosate	镇草宁 农达	10% 水剂	灭生性内吸型除草剂	30~50 倍 (二年生杂草) 60~150 倍 (一年生杂草)	喷雾	严禁使药液接触树体,以防药害	30	0.1
	百草枯 paraquat	克无踪 对草快	20% 水剂	灭生性触杀型除草剂	80~250 倍	喷雾		30	0.2

附录 D (规范性附录)

农药合理使用准则 (葡萄)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/415134020034011323>