

# 学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

## N2 级护理人员理论知识模拟题库含答案

1、进行肌肉/皮下注射时，对于神经性损伤的预防措施，以下说法错误的是：（）

- A、 避免注射刺激性强的药物
- B、 尽量选用刺激性小、PH 值接近碱性的药物
- C、 避开神经、血管丰富之处
- D、 熟练掌握注射技术

答案：B

2、哮喘发作时应用肾上腺素受体激动药,最适宜的药物是()

- A、 异丙肾上腺素
- B、 麻黄碱
- C、 去甲肾上腺素
- D、 沙丁胺醇
- E、 肾上腺素

答案：D

3、以下药物静脉推注前务必要稀释的是()

- A、 腺苷
- B、 毛花苷 C
- C、 利多卡因
- D、 普罗帕酮
- E、 呋塞米

答案：B

4、留置尿管时气囊内注入液体要适量，以（）5ml 为宜，防止牵拉变形进入尿道

- A、 5-15
- B、 10-15
- C、 5-20
- D、 10-20

答案：A

5、下列哪种情况不需预防应用抗生素

- A、 结肠手术
- B、 胃癌根治术
- C、 髂内动脉瘤手术
- D、 慢性阑尾炎阑尾切除术
- E、 胰十二指肠切除术

答案：D

6、进展期胃癌最早出现的症状是()

- A、上腹痛
- B、严重消瘦
- C、腹泻、便秘
- D、恶心、呕吐
- E、呕血,黑便

答案：A

7、刘某,男,71岁。因克雷伯杆菌肺炎并发败血症入院,入院后为及时发现并处理感染性休克,护士应密切观察的项目中不包括()

- A、心率,脉搏
- B、咳痰量、性质及气味
- C、皮肤,黏膜有无发绀、肢端温度
- D、有无尿量减少
- E、精神和意识状态

答案：B

8、上消化道出血量较大时,患者排(),严重者有晕厥、出汗和口渴等失血过多的表现。

- A、稀便
- B、陶土色便
- C、蛋花样便
- D、柏油样便

答案：D

9、表面麻醉常用局部麻醉药为

- A、1%普鲁卡因
- B、0.5%利多卡因
- C、1%利多卡因
- D、0.1%丁卡因
- E、1%丁卡因

答案：E

10、临床表现为原有神经压迫症状加重或出现呼吸肌麻痹、感觉运动及大小便功能障碍的是()

- A、原发性脊髓神经损伤
- B、继发性脊髓神经损伤
- C、原发性脊髓神经压迫

D、继发性脊髓神经压迫

答案：B

11、输血前后及两袋血之间应输入的溶液是( )

A、5%葡萄糖溶液

B、5%葡萄糖盐水

C、0.9%氯化钠

D、复方氯化钠溶液

答案：C

12、每次鼻饲完后，可协助患者取( )，以防止潴留于胃内的食物反流入食管。

A、高枕卧位或半坐卧位

B、中凹卧位

C、头低足高位

D、侧卧位

答案：A

13、正常止血取决于以下哪项因素()

A、血小板的质和量及血管壁的正常

B、皮肤的完整性和凝血因素的正常

C、血小板的质和量及凝血因素的正常

D、血小板的质和量,血管壁及凝血因素的正常

E、机体正常免疫功能

答案：D

14、肠内营养时辅以( )可解决胃轻瘫、反流等问题，一般在喂养前半小时由鼻饲管注入。

A、胃肠动力药

B、抑制胃酸药

C、预防应激性溃疡药

D、助消化药

答案：A

15、扩张型心肌病的主要体征是()

A、肝大

B、水肿

C、心尖搏动明显向左下移位

D、心律失常

E、脉搏细弱

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/415210242242011221>