

@专属教育

考试复习专用

考试参考习题—系统复习
备考题库训练—习题强化
考前模拟测试—模拟演练
通关宝典梳理—真题体验
技巧提升冲刺—技能技巧

注：文本内容应以实际为准，下载前需仔细预览

@助你一战成名

临清市人民医院招聘试题及解析

说明：本题库收集历年及近期考试真题，全方位的整理归纳备考之用。

一、单项选择题（在下列每题四个选项中只有一个是符合题意的，将其选出并把它的标号写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。）

1、心指数是指在空腹、安静条件下的（）。

- A、心排血量/体表面积
- B、心排血量/体重
- C、每搏心输出量/心排血量
- D、心排血量/心室充盈血量

【答案】A

【解析】以单位体表面积计算心输出量称为心指数。即心排血量/体表面积。中等身材的成年人心指数大约为 $3.0\sim 3.5L/(\text{min}\cdot \text{m}^2)$ ，在安静和空腹情况下测定的心指数称为静息心指数，可作为比较不同个体心功能的评定指标。

2、女性，68岁。有慢支肺气肿病史20余年，突然气促、呼吸困难加重半天入院。胸部X线片提示右侧肺压缩。予插管引流5日后患者自觉症状无明显好转，水封瓶液面仍随呼吸波动。进一步考虑的治疗是（）。

- A、加用负压吸引装置
- B、胸膜固定术
- C、剖胸手术
- D、胸腔镜下手术

【答案】A

【解析】患者胸部X线片未提示有胸腔积液征象，故可排除血气胸及脓血胸。患者肺压缩面积不大，张力性气胸可能性较小。经插管引流5日后仍未复张，提示胸膜破口较大且未能闭合，故考虑为交通性气胸。患者呼吸困难明显，且为慢阻肺、肺功能不全者，故治疗可考虑负压吸引。

3、心性水肿最先出现的部位是（）。

- A、四肢
- B、面部
- C、眼睑
- D、下垂部位

【答案】D

【解析】右心衰竭时，全身体循环静脉瘀血，毛细血管流体静压升高，因受重力影响，距心脏水平面垂直距离越远的部位的外周静脉压与毛细血管静脉压增高越明显，因此首先在下垂部位出现水肿。肾性水肿先表现

为眼睑或面部水肿；肝性水肿则以腹水为多见。故选 D。

4、下列哪项属于既往史（）。

- A、病因与诱因
- B、预防注射
- C、诊疗经过
- D、工业毒物接触史

【答案】B

【解析】既往史又称过去病史，即就医时医生向患者问询的患者既往的健康状况和过去曾经患过的疾病等方面的问题。既往患病情况包括包括外科手术史、预防注射史、过敏史及系统回顾等。故选 B。

5、关于抗结核药物副作用，错误的是（）。

- A、利福平：肝功损害
- B、乙胺丁醇：视神经炎
- C、链霉素：耳鸣耳聋
- D、吡嗪酰胺：肝功损害、肾功损害

【答案】D

【解析】吡嗪酰胺的副作用主要是高尿酸血症、肝损害、食欲缺乏、关节痛和恶心。

6、慢性呼吸衰竭缺氧明显伴二氧化碳潴留时，采用氧疗的给氧浓度，下列哪项正确（）。

- A、小于 65%
- B、小于 55%
- C、小于 25%
- D、小于 35%

【答案】D

【解析】缺氧伴明显 CO₂ 潴留的氧疗，其原则为应给予低浓度（<35%）持续给氧。由于高碳酸血症，人体呼吸中枢化学感受器对 CO₂ 反应性差，主要依靠低氧血症对颈动脉窦、主动脉体化学感受器的驱动作用来维持正常呼吸。如长期给予高浓度氧吸入，使血中 PaO₂ 迅速上升，外周的化学感受器失去对低氧的刺激，患者呼吸会变慢、变浅，导致 CO₂ 排出减少，PaCO₂ 迅速上升而呈 CO₂ 麻醉。

7、急性阑尾炎与右侧输尿管结石的鉴别点为（）。

- A、输尿管绞痛可向外阴放射
- B、急性阑尾炎有转移性右下腹痛史
- C、输尿管结石腹部平片中可显示有结石
- D、急性阑尾炎有右下腹压痛及肌紧张

【答案】ABCD

【解析】急性阑尾炎表现为转移性右下腹痛，右下腹有固定的压痛区和不同程度的腹膜刺激征。右侧输尿管

结石向下移动时可引起右下腹部痛，有时可与阑尾炎混淆。但输尿管结石发作时呈剧烈的绞痛，难以忍受，疼痛沿输尿管向外阴部、大腿内侧放射。腹部检查，右下腹压痛和肌紧张均不太明显，腹部平片有时可发现泌尿系有阳性结石，而尿常

8、MBR 的实测值与正常平均值比较，正常变动范围是（）。

- A、±（10%~15%）
- B、±（15%~25%）
- C、±（3%~5%）
- D、±（5%~8%）

【答案】A

【解析】MBR 的实测值与正常平均值比较相差在±（10%~15%）以内的，都属于正常范围。

9、医学伦理学作为学科出现的标志是（）。

- A、《黄帝内经》
- B、《千金要方》
- C、《希波克拉底誓言》
- D、《医学伦理学》

【答案】D

【解析】医学伦理学作为学科出现的标准。帕茨瓦尔的《医学伦理学》标志着医学伦理学作为学科出现。故选 D。

10、患者，男，20 岁。咳嗽伴低热，盗汗，乏力 1 个月。X 线显示右肺上云雾状阴影。应首先考虑的是（）。

- A、原发性肺结核
- B、结核性胸膜炎
- C、浸润型肺结核
- D、血行播散型肺结核

【答案】C

【解析】原发型肺结核常见于小儿，多无症状，少数有呼吸音减弱，偶可闻及干性或湿性啰音；血行播散型肺结核有寒战、高热，体温可达 40℃ 以上，多呈弛张热或稽留热，血白细胞可减少，血沉加速；浸润型肺结核表现为肺部有渗出、浸润及不同程度的干酪样病变，多数发病缓慢，早期无明显症状，后渐出现发热、咳嗽、盗汗、胸痛、消瘦、咳痰及咯血；

11、下列哪条通路不属于锥体外系（）。

- A、网状脊髓束
- B、顶盖脊髓束
- C、红核脊髓束

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/415330210023011342>