

畜牧、兽医科学-特种经济动物养殖

- 1、如何进行梅花鹿的选种配种？
- 2、怎样防治梅花鹿的巴氏杆菌病？
- 3、梅花鹿的饲料种类？
- 4、怎样防治熊蛔虫病？
- 5、如何进行熊胆汁加工？
- 6、提高熊繁殖力的措施有哪些？
- 7、家养狐狸的饲料种类？
- 8、狐狸的饲料如何加工调制？
- 9、狐狸犬温热的防治？
- 10、新引进的犬应采取的管理措施？

- 11、犬的饲料种类？
- 12、养鸽场基本卫生防疫工作有哪些？
- 13、绿头野鸭的繁殖特点？
- 14、种用绿头野鸭的饲养管理特点？
- 15、饲养育成绿头野鸭应注意哪些问题？
- 16、肉鸽的一般饲养管理方法有哪些？
- 17、如何搞好林麝的饲养管理工作？
- 18、提高林麝繁殖力的措施有哪些？
- 19、我国人工饲养量最大的一种麝是（）；林麝配种公母比例一般为（）。
- 20、林麝性成熟期为（）个月；发情季节（）；妊娠期（）天，产仔季节在（）。

21、黑熊的性成熟期为，公熊（）岁左右，母熊（）岁左右；发情配种季节为（）；妊娠期为（）；产仔季节为（）。

22、黑熊繁殖年限为（）年，繁殖适龄期为（）岁。

23、狐的妊娠期平均为（）天；狐的寿命为（）年，繁殖年限为（）年；目前我国人工养殖的狐种类有（）。

24、选择种用肉犬应以犬的（）等几个方面综合考虑。

25、母犬每年有2个发情期，多数集中在（）；和（）

26、种用肉犬的初配年龄一般在（）年以后；利用年限为（）年。

27、乳鸽是指（）；乳鸽是靠（）喂养大的。

28、鸵鸟通常包括（）共三种；鸵鸟孵化期为（）天；孵化温度在 37.7°C — 36.8°C ；鸵鸟的性成熟期公为（）月龄，母为（）月龄。

29、种用七彩山鸡的利用年限一般以（）年为宜，种蛋的保存时间以（）效果最好；七彩山鸡的孵化期为（）天。

30、绿头野鸭的孵化期为（）天。

31、绿头野鸭的开产日龄为（）天；年产蛋量（）枚。

32、蛇的寿命（），幼蛇出生后一般（）年达到性成熟。

33、经济动物

34、特种经济动物

35、简述特种经济动物具有的特点。

36、简述特种经济动物的分类。

37、在我国国家养鹿的目的是获取（）。

38、我国目前饲养鹿的品质：梅花鹿、（）。

39、（）性的鹿生产鹿茸。

40、简述鹿的繁殖生理特点。

41、群公、群母

42、简述公鹿在配种期的饲养管理。

43、简述鹿常见的疾病。

44、四大动物香料

45、简述麝的繁殖特性。

46、简述种用公麝的饲养管理。

47、简述麝香的鉴别。

48、简述肉犬的品种。

49、简述犬的异常的发情。

50、简述犬的妊娠诊断。

51、水貂在全世界的自然分布区：北纬（ ）℃以北的地区。在北回归线以南，水貂不能正常繁殖。

52、彩色水貂和标准水貂：通常将黑色或黑褐色水貂称标准色（），而将其它毛色的水貂称为彩色水貂。

53、简述水貂的繁殖特性。

54、刺激性排卵：有些动物（）发育成熟后不能立即排卵，必须在交配的刺激后才能发生排卵，骆驼，猫等。

55、水貂常见的红爪病：又叫维生素（）缺乏症，因母貂妊娠期饲料中缺乏维生素 C 或维生素 D 遭到破坏引起的一种仔貂营养性疾病。

56、简述常见的人工饲养葫芦品种。

57、简述狐狸的生活习性。

58、简述狐狸繁殖特性。

59、简述狐狸的发情鉴定。

60、果子狸别名：花面狸、（）、乌脚狸、（），属于食肉目，灵猫科。

61、果子狸生活习性：（）、亚热带，隐穴居、（），常独处，有冬眠的习性，季节性发情。

62、果子狸性成熟期为（）日龄，怀孕期为 90-100 天。

63、丝毛乌骨鸡：原产我国主产区在江西泰和县，其形态鸡冠呈桑椹或草莓形，色紫黑或黑红；头顶有白色缨头，特别是母鸡尤为发达；有绿耳，具有丝状胡须（），丝羽，毛脚，五爪，乌皮、乌肉，乌骨十大特征。

64、雪峰乌骨鸡：皮、肉骨（）。毛色呈杂色，全黑色、全白色。

65、乌骨鸡繁殖特点：具有较强的就巢性，一般每产 20 枚就巢一次，成年乌骨鸡（）就巢，每次持续 15 天，在人工饲养小群公母比例 1:8-10 只，大群公母比例（）只。

66、雉鸡具有较高的（）、（）、（）。雉鸡又称野鸡、山鸡、环颈雉。

67、雉鸡的品种：七彩雉鸡（）、黑化雉鸡（），黑化雉鸡又称孔雀蓝雉鸡。

68、简述雉鸡育雏阶段的光照应遵循的原则。

69、火鸡又名“（）”，经济价值是肉用。

70、布特火鸡这种重型品种是目前世界上（）的火鸡，最重达到 37 公斤。

71、简述肉鸽的生活习性。

72、简述肉鸽品种。

73、简述肉鸽疫病。

74、鸵鸟是现存鸟类中体型最大的鸟，也是世界上现有鸟类中唯一的（）鸟。

75、非洲鸵鸟的个体最大，体高（）米，鸵鸟的性成熟：雌鸟在（）岁，雄鸟在 3-4 岁。雄性的交配次数 4—6 次 / 天。鸵鸟蛋是世界上最大的。重 1.2—1.7 kg，个别 2 kg。孵化期为 42 天。

76、鹌鹑性成熟早，生长发育快，（）强，一般母鹌 6 周龄左右开产，一年产蛋（）枚，年产蛋总重为体重的 20-25 倍。代谢旺盛，基础体温 41—42℃。

77、鸕鹚性成熟期为（）天，年产蛋量为 100-120 枚，野生状态下公母比例为 1：1，家养 1：3.

78、野鸭是各种野生鸭的通称，属（）科、（）属。我国是野鸭最早驯化地。

79、简述野鸭生活习性。

80、简述鳖的生活习性。

81、简述蛇的生活习性。

82、外套膜按形状可分为（），（），（）和四孔型。

83、瓣鳃纲鳃的构造分为（），（），（），（）四种类型。

84、贝类的生活类型有（），（），（），（），（），（），凿穴型，寄生和共生型。

85、附着型贝类投放附着基一般为（），（），（）等。

86、牡蛎直接养殖方法有（），（），（），插竹养殖等。

87、扇贝人工育苗三种方式有：（），（），（）。

88、贻贝分苗方法有：（），（），（），间苗。

89、幼虫的变态标志---出现（）。

90、瓣鳃纲贝类饵料主要是（）。

91、贝类寿命分布曲线与其他动物一样呈（）字型曲线，即幼年老年死亡率高，成贝期死亡率低。

92、贝类投放附着基的标志～出现（）。

93、贻贝苗种足丝分泌时间长短影响因素主要为水温，一般水温高，分泌足丝（），所需时间短。

94、皱纹盘鲍属于（）

95、下列哪项不是贝类固着型的身体特征（）。

A. 左右两壳不对称，固着壳大

- B. 成体足退化或消失
- C. 贝壳较厚，表面有棘、刺等
- D. 有发达水管，且感官发达

96、贝类养殖过程中水质管理最为有效的方式是（）。

- A. 倒池
- B. 清底
- C. 换水
- D. 充气

97、利用浮筏和垂下式采苗器，在潮下带浅海采集扇贝等附着型贝类的贝苗，也称（）。

- A. 潮间带采苗
- B. 筏式采苗
- C. 池塘式采苗
- D. 半人工采苗

98、贝类食性不包括（）。

- A. 肉食性
- B. 滤食性
- C. 捕食性
- D. 吸吮性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/416001043100010233>