

2023-24 年黑龙江省四方台区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库附参考答案（实用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 肾损害
- B: 便秘
- C: 口干
- D: 共济失调

答案：A

2. 药品不良事件简写为

- A: ADR
- B: ADE
- C: AE
- D: DUI

答案：B

3. (用药与尿液检查异常)氨丁三醇可能引起

- A: 尿胆红素
- B: 尿液 pH 增高
- C: 尿蛋白
- D: 尿液隐血

答案：B

4. 中度药品不良反应是指

- A: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害
- B: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害
- C: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无须治疗
- D: 没有临床症状，无须治疗

答案：A

5. 医师用药咨询的内容是

- A: 减肥、补钙、补充营养素
- B: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品
- C: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- D: 抗菌药物的合理使用

答案：D

6. 一 2 型糖尿病患者，伴高血压、高胆固醇血症，如有胃部不适或感冒即需联合用药。对该患者的用药教育应该是适宜餐后服用的药品是

- A: 阿司匹林
- B: 普伐他汀
- C: 格列美脲
- D: 呋塞米

答案：A

7. 降低夜间的眼压作用强，尤其用于其他降眼压药不能耐受的患者的药物是

- A: 拉坦前列素
- B: 溴莫尼定

C: 毛果芸香碱

D: 噻吗洛尔

答案：A

8. 慎用雷尼替丁的原因是

A: 引起嗜睡

B: 引起多尿或多汗

C: 致使视力模糊

D: 致使定向力障碍

答案：D

9. 患者，男，58 岁，因心前区疼痛 5 年，加重伴呼吸困难入院。入院前 6 年常感心前区疼痛，疼痛性质系紧缩性或压迫感，多于劳累、餐后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg；呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻及湿啰音，心界向左侧扩大，心音减弱。入院诊断为冠心病。

A: β 受体阻断剂、钙通道阻滞剂、ACEI/ARB

B: 硝普钠、利尿药、ACEI/AR

C: ACEI/AR

D: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞剂、ACEI/ARB

答案：A

10. 分娩前应用可引起新生儿循环障碍和灰婴综合征的药物是

A: 氯霉素

B: 丙硫氧嘧啶

C: 维生素 D

D: 维生素 A

答案：A

11. (2018 年真题) 患者, 女, 34 岁, 因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊, 化验结果显示 TSH 增高 FT3、FT4 减低, 临床诊断为甲状腺功能减退使用左甲状腺素钠 100 μ gqd 治疗。药师对该患者的用药指导, 正确的是 ()

- A: 早餐前半小时, 顿服
- B: 晚餐后顿服
- C: 睡前顿服
- D: 早餐后半小时, 顿服

答案: A

12. 癌症患者出现突发性刺痛、戳痛时, 可选用

- A: 芬太尼注射剂
- B: 加巴喷丁
- C: 布洛芬混悬液
- D: 丁溴东莨菪碱片

答案: B

13. 患者, 男, 56 岁, 诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查: HbeAg (+), HBV-DNA ≥ 20000 IU/ml。ALT 200 U/L。现需要启动抗病毒治疗, 采用干扰素 α 和核苷 (酸) 类抗病毒药物。

- A: 恩替卡韦
- B: 替比夫定
- C: 阿德福韦
- D: 拉米夫定

答案: A

14. 在药物经济学研究方法中，可以为总体医疗费用的控制和医疗资源优化配置提供基本信息的是

- A: 成本-效益分析
- B: 最大效果分析
- C: 最小成本分析
- D: 成本-效用分析

答案：C

15. 属于高选择性 $\alpha_4\beta_2$ 尼古丁-乙酰胆碱受体部分激动/部分拮抗药，可帮助吸烟者缓解戒断症状，减少对吸烟的渴求和满足感，但存在癫痫发作罕见不良反应的戒烟药物是

- A: 伐尼克兰
- B: 安非他酮
- C: 可乐定
- D: 尼古丁替代药物

答案：A

16. 抗真菌药

- A: 血红蛋白量增多
- B: 嗜酸性粒细胞减少
- C: 中性粒细胞减少
- D: 血小板减少

答案：C

17. 呋塞米

- A: 宜餐前服用
- B: 宜睡前服用
- C: 宜餐后服用

D: 宜清晨服用

答案: D

18. 以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛者的首选处方药是

A: 卡马西平

B: 地西泮

C: 舒马曲坦

D: 苯噻啶

答案: A

19. 对混合型血脂异常，必须联用他汀类和贝特类，最佳的给药方案是

A: 早晨用他汀类，晚上用贝特类

B: 晚上联合服用他汀类和贝特类

C: 早晨用贝特类，晚上用他汀类

D: 早晚联合服用他汀类和贝特类

答案: C

20. 不能用于治疗缺铁性贫血的药物是

A: 乳酸亚铁

B: 去铁胺

C: 葡萄糖酸亚铁

D: 硫酸亚铁

答案: B

21. 属于公众用药咨询的是

A: 注射剂溶媒的正确选择

B: 抗菌药物的合理应用

C: 减肥、补钙、补充营养素

D: 栓剂、气雾剂的正确使用方法

答案：C

22. 治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中，宜选用的药物是（）

A: 达比加群酯

B: 氯吡格雷

C: 尿激酶

D: 依诺肝素钠

答案：B

23. 患者，女，29 岁，孕 25+6 周，近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状。化验结果为 Hb71g / L。诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

A: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量

B: 口服，每次 5ml，一日 3 次

C: 快速静脉注射

D: 先少量缓慢静注，观察无过敏反应，1 小时后继续静脉注射余下剂量

答案：D

24. 使尿液呈碱性，可增加抗菌活性、减轻肾毒性，食醋则会加重其毒性作用的是

A: 氨基糖苷类

B: 林可霉素类

C: 头孢菌素类

D: 大环内酯类

答案：A

25. (2016 年真题) 患者，男，45 岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗 1 个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是 ()。

- A: 很可能
- B: 可能
- C: 肯定
- D: 可能无关

答案：C

26. 可中和碘类物质中毒的洗胃液是

- A: 活性炭混悬液
- B: 1: 5000 高锰酸钾
- C: 淀粉溶液
- D: 3% 鞣酸溶液

答案：C

27. 服药后宜多饮水的药物是

- A: 胃黏膜保护剂
- B: 镇静催眠药
- C: 磺胺类药物
- D: 微生态制剂

答案：C

28. 可引起粪便红细胞增多的是

- A: 阻塞性黄疸
- B: 急性胰腺炎
- C: 溶血性黄疸

D: 细菌性痢疾

答案：D

29. 对该患者进行初始经验性抗感染治疗,宜选用的药物是 ()

A: 阿奇霉素

B: 阿莫西林克拉维酸钾+阿奇霉素

C: 左氧氧沙星+阿奇霉素

D: 多西环素

答案：B

30. 中度贫血的评价指标是血红蛋白 (Hb) 含量为 (g / L)

A: 90~120

B: 30~60

C: <30

D: 60~90

答案：D

31. 药师应掌握处方中常用的外文缩写,“每晚”用药的缩写是 ()

A: prn

B: qn

C: qd

D: qid

答案：B

32. 患者,女,58岁,既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。

日前体检:身高 160cm,体重 70kg;白细胞 $8.0 \times 10^9/L$

A: 低血糖

B: 乳酸酸中毒

C: 心力衰竭

D: 肌痛

答案: B

33. 结核杆菌生命力顽强，且易产生耐药性，临床采用标准化学治疗方案

A: 3HRZE / 9HR

B: 2HRZE / 4HR

C: 2HRE / 7HR

D: 2HRZE / 4HR

答案: A

34. 可导致儿童昏迷及惊厥的药物是

A: 氯霉素

B: 苯妥英钠

C: 抗组胺药

D: 维生素 A

答案: C

35. 患者，男，65 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次，阿卡波糖 0.1g. 一日 3 次。罗格列酮 4mg，一日一次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

A: 阿司匹林

B: 阿卡波糖

C: 二甲双胍

D: 罗格列酮

答案: D

36. 一级信息源资料的最突出的特点是

- A: 查阅时需要利用所提供参考文献去验证
- B: 提供的信息丰富、详实
- C: 提供的信息最新
- D: 内容广泛、使用方便

答案：C

37. 抗菌谱广，属于碳青霉烯类的药物是

- A: 氨曲南
- B: 克拉维酸
- C: 头孢哌酮
- D: 亚胺培南

答案：D

38. 患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片 20mgbid，甲硝唑片 0.4gbid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbid。

- A: 维生素 A 缺乏
- B: 维生素 B12 缺乏
- C: 维生素 B2 缺乏
- D: 维生素 B6 缺乏

答案：B

39. 抗肿瘤药物所引起的骨髓抑制，需要使用 G-CSF 的指征为

- A: $WBC < 1.0 \times 10^9/L$
- B: $WBC < 1.5 \times 10^9/L$

C: $WBC < 2.0 \times 10^9/L$

D: $WBC < 0.5 \times 10^9/L$

答案：C

40. 以下属于急性肾盂肾炎的表现的是

A: 约 30% 可出现血尿

B: 尿液常浑浊，有异味

C: 老年人表现不典型，可仅表现为纳差、淡漠、谵妄等

D: 可出现排尿不适、下腹痛和排尿困难

答案：C

41. 非甾体抗炎药的不良反应，引起荨麻疹、瘙痒、剥脱性皮炎等皮肤损害

A: 塞来昔布

B: 美洛昔康

C: 保泰松

D: 布洛芬

答案：B

42. 下列药品中，属于药品类易制毒化学品的兴奋剂是

A: 可待因

B: 芬太尼

C: 螺内酯

D: 麻黄碱

答案：D

43. 骨髓造血功能较为活跃，某些药物可引起贫血、粒细胞减少、过敏性紫癜等

- A: 运动系统
- B: 血液系统
- C: 水盐代谢
- D: 内分泌系统

答案：B

44. 患者，女，51 岁，临床诊断为“胃食管反流病”，CrCl: 45ml / min，以下哪种药物需要调整给药剂量

- A: 兰索拉唑
- B: 法莫替丁
- C: 硫糖铝
- D: 多潘立酮

答案：B

45. 通过拮抗 α 受体而用于前列腺增生症治疗的药物是

- A: 特拉唑嗪
- B: 黄酮哌酯
- C: 前列康
- D: 非那雄胺

答案：A

46. 羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂（他汀类）所致药源性损伤为

- A: 肝损害
- B: 胃肠系统损害
- C: 肺损害
- D: 肾损害

答案：A

47. 属于胃黏膜保护剂的是

- A: 替普瑞酮
- B: 三硅酸镁
- C: 奥美拉唑
- D: 哌仑西平

答案：A

48. 苯二氮（𠯪卓）类中毒血压下降时可给予

- A: 间羟胺
- B: 阿托品
- C: 有机硫类
- D: 地西泮

答案：A

49. （2015 年真题）用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药是（）。

- A: 乙胺丁醇
- B: 链霉素
- C: 吡嗪酰胺
- D: 利福平

答案：D

50. 单核细胞正常值参考范围是

- A: 0.01~0.05
- B: 0.20~0.40
- C: 0~0.01
- D: 0.03~0.08

答案：D

51. (2018 年真题) 干眼症可选用 ()

- A: 色甘酸钠滴眼液
- B: 氧氟沙星滴眼液
- C: 玻璃酸钠滴眼液
- D: 七叶洋地黄双苷滴眼液

答案: C

52. 能够给予当即解答的就当即解答

- A: 特别关注特殊人群
- B: 解释的技巧
- C: 保护患者的隐私
- D: 及时回答不拖延

答案: D

53. 可引起嗜酸性粒细胞减少的药物不包括

- A: 甲基多巴
- B: 头孢氨苄
- C: 坎地沙坦
- D: 氢化可的松

答案: B

54. (2016 年真题) 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三酯血症，临床上给予非诺贝特进行治疗，该药正确的用量为 ()。

- A: 0.2g, qd
- B: 0.1g, tid
- C: 0.5g, qd
- D: 0.5g, tid

答案: B

55. 适用于早期、轻度症状者

- A: 司来吉兰
- B: 苯海索
- C: 左旋多巴
- D: 恩托卡朋

答案：A

56. 下列症状不属于高血压临床表现的是

- A: 头痛
- B: 心悸
- C: 头晕
- D: 口干

答案：D

57. (2017 年真题) 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20IU/L，血肌酐 (Cr) 1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g；肌酐清除率 ≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

- A: 34ml/min
- B: 25.5ml/min
- C: 40ml/min
- D: 30ml/min

答案：B

58. 阿莫西林等水溶性药物血浆中游离药物浓度较成人低，其机制是

- A: 胃酸分泌少
- B: 胃排空快
- C: 肝脏的相对重量约为成人的 2 倍
- D: 体液及细胞外液容量大

答案：D

59. (2018 年真题) 可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是 ()

- A: 链霉素
- B: 乙胺丁醇
- C: 对氨基水杨酸钠
- D: 异烟肼

答案：B

60. 患者，男性，30 岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

- A: 钙通道阻滞剂
- B: 抗胆碱能药物
- C: B 受体激动剂
- D: B 受体阻断剂

答案：D

61. 常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

- A: 呋塞米
- B: 利血平
- C: 阿米替林
- D: 阿洛司琼

答案：C

62. 在日常饮食因素中，对高血压患者用药疗效影响最大的是

- A: 食盐
- B: 高糖
- C: 食醋
- D: 饮茶

答案：A

63. 糖尿病急性并发症为

- A: 糖尿病酮症酸中毒
- B: 肾动脉硬化
- C: 周围神经病变
- D: 糖尿病肾痛

答案：A

64. 发热血常规检查白细胞计数低于正常值，可能有

- A: 麻疹
- B: 感冒
- C: 病毒感染
- D: 细菌感染

答案：C

65. 华法林不会在乳汁中出现的机制是

- A: 呈弱碱性
- B: 解离度大
- C: 呈弱酸性
- D: 在母体血浆中处于结合状态

答案：D

66. 有关血清丙氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 血清丙氨酸氨基转移酶增高的程度与肝细胞被破坏的程度呈正比
- B: 丙氨酸氨基转移酶是一组催化氨基酸之间氨基转移反应的酶类
- C: 丙氨酸氨基转移酶(ALT)与谷丙转氨酶(GPT)是两个反映肝脏功能的指标
- D: 丙氨酸氨基转移酶只存在于肝脏中

答案：A

67. 抗结核联合治疗方案中可出现橘红色尿的药物是()

- A: 吡嗪酰胺
- B: 乙胺丁醇
- C: 左氧氟沙星
- D: 利福平

答案：D

68. 牙齿黄染及牙釉质发育不全

- A: 氯霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 庆大霉素
- D: 米诺环素

答案：D

69. 收录 5500 余种药物专论、4 万多篇参考文献的是

- A: 《美国药典药物信息》
- B: 《中国国家处方集》
- C: 《马丁代尔药物大典》

D: 《药物事实与比较》

答案: C

70. 以下药品中，最容易受湿度影响而变质的是

- A: 水溶性基质栓
- B: 肝素等生物制品
- C: 胰岛素制剂
- D: 滴眼剂

答案: A

71. 伪膜性肠炎

- A: 真菌
- B: 白细胞增多
- C: 红细胞
- D: 上皮细胞

答案: D

72. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 药用炭
- B: 小檗碱
- C: 鞣酸蛋白
- D: 洛哌丁胺

答案：D

73. 老年糖尿病患者不建议使用

A: α -葡萄糖苷酶抑制剂

B: 双胍类

C: 长效磺脲类

D: 噻唑烷二酮类

答案：C

74. 患者，男，50 岁，血压 170 / 95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是

A: β 受体阻断剂+ARB

B: 利尿剂+AR

C: 利尿剂+D-CCB

D: α 受体阻断剂+ACEI

答案：C

75. 提示"药物都应保存在原始包装中，并不要将瓶外的标签撕掉"，是针对

A: 药品贮存

B: 特殊剂型用法

C: 药品有效期

D: 特殊装置药品

答案：A

76. 患者，男，体检发现尿血红蛋白阳性，特向药师咨询，怀疑为药物所致，以下可导致尿血红蛋白阳性的药物是

A: 氯丙嗪

- B: 秋水仙碱
- C: 庆大霉素
- D: 两性霉素 B

答案：B

77. 倍他洛尔所致的主要不良反应是

- A: 支气管痉挛
- B: 血钠升高
- C: 外周血肿
- D: 血尿酸升高

答案：A

78. 运动员禁用药物中，蛋白同化激素产生的危害是

- A: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患
- B: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖
- C: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡
- D: 易造成人体严重脱水、肾衰竭

答案：A

79. 老年患者对低血糖的耐受能力差，不建议使用的降糖药是

- A: α -葡萄糖苷酶抑制剂
- B: 磺酰脲类促胰岛素分泌剂
- C: 胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 类似物
- D: 二肽基肽酶-4 (DPP-4) 抑制剂

答案：B

80. (2017 年真题) 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20IU/L，血肌酐 (Cr) 1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g；肌酐清除率 ≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

- A: 每 12 小时 1g
- B: 每 24 小时 1g
- C: 每 8 小时 2g
- D: 每 24 小时 0.5g

答案：B

81. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

- A: 与吸附剂合用须间隔 2~3h
- B: 复方消化酶送服时不宜用热水
- C: 胰酶口服时应嚼碎
- D: 多潘立酮可能引起心脏相关风险

答案：C

82. 属于苯二氮卓类药物的是

- A: 米氮平
- B: 阿戈美拉汀
- C: 唑吡坦
- D: 艾司唑仑

答案：D

83. 患者，男，12 岁，因纳差、恶心、呕吐、腹泻就诊，主诉里急后重，每小时排便 3~4 次，水样便，初步诊断为急性感染性腹泻，处方如下：

- A: 存在适应证不适宜用药
- B: 存在给药时间不合理
- C: 存在禁忌人群用药
- D: 存在重复用药

答案：C

84. 1 个半衰期给药 1 次；如需要立即达到稳态，可首剂加倍针对

- A: 半衰期 8~24 小时
- B: 半衰期小于 30 分钟
- C: 半衰期大于 30 小时
- D: 半衰期大于 24 小时

答案：A

85. 遭遇蛇类咬伤，最应首先采取的应急措施是

- A: 就地取材在伤口的远心端捆扎
- B: 就地取材将伤口捆扎
- C: 用布带等在伤口的近心端 5Cm 处捆住
- D: 用绳索等在伤口的近心端捆扎

答案：C

86. (2019 年真题) 患者，男，28 岁，外出进餐后出现腹泻，一日 6 次，水样便，无发热和腹痛症状。宜选用的药物是

- A: 奥美拉唑肠溶胶囊

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 干酵母片

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/416045140104011030>