北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试试题》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：骨盆骨折最危险的并发症是（　）。A.盆腔内出血

B.膀胱破裂

C.尿道断裂

D.骶丛神经损伤

E.直肠损伤

2、单项选择题：发育性髋关节脱位的治疗，下列正确的是（　）。A.早期宜行针灸、理疗等保守治疗，待发生畸形时再手术治疗

B.婴儿期治疗效果欠佳，年龄越小，效果越差

C.2岁以内行闭合复位，石膏固定，若整复失败可手术整复

D.6岁以上一般采用姑息手术以减少腰前凸，减轻髋痛和腰痛

E.切开复位前一般需关节造影X线定位

3、单项选择题：男，42岁，劳累后右髋骨轻微酸痛1年余，加重半个月，X线片发现右股骨颈及粗隆间膨胀性改变，中央透亮，边缘有硬化带，无骨折，考虑为骨囊肿，采取以下哪项措施（　）。A.截肢+化学治疗

B.化疗治疗+免疫治疗

C.中药治疗

D.病灶刮除并植骨

E.病段切除+人工假体移植

4、单项选择题：脊髓损伤四肢瘫，患者最常见的死亡原因为（　）。A.体温失调

B.泌尿系感染

C.呼吸道感染

D.高钙血症

E.压疮

5、单项选择题：出生后8个月女孩，体检时发现左侧下肢较右侧短，左侧腹股沟纹深而高，双侧大腿皮纹不对称，左侧下肢外旋幅度小。Ortolani试验阳性。复位后可能发生的最严重的并发症为（　）。A.股骨骨折

B.骨性关节病

C.神经损伤

D.股骨头缺血性坏死

E.复位后再脱位

6、单项选择题：22岁男患，运动中摔倒，诉左髋痛，检查左髋部叩痛，患肢无外旋畸形，X线片示左股骨颈中段骨折，患侧股骨颈略短，Pauwels角60°，侧位片远折端无移位。本例为下列哪种类型（　）。A.左股骨颈，经颈内收型骨折

B.左股骨颈，经颈外展型骨折

C.左股骨颈，无移位完全型骨折

D.左股骨颈经颈内收、嵌插型骨折

E.左股骨颈中段不完全内收型骨折

7、单项选择题：20岁男性，踢球时左膝损伤，关节内侧疼痛、肿胀，活动受限。保守治疗1个月后症状减轻，但时有关节交锁及打软现象。四头肌内侧头明显萎缩、内侧关节间隙压痛，McMurray征（+）、抽屉试验（-）、侧方应力试验（-）。最有可能的诊断是（　）。A.前十字韧带断裂

B.内侧半月板损伤

C.内侧副韧带断裂

D.关节内游离体

E.骨软化症

8、单项选择题：超过12小时的手部切割伤，最适当的处理是（　）。A.清创、闭合伤口，吻合神经及肌腱

B.清创、闭合伤口，神经、肌腱待二期修复

C.彻底清创，即使伤口不能闭合，亦修复神经、肌腱

D.应争取闭合伤口，同时修复肌腱

E.闭合伤口，同时修复神经

9、单项选择题：尤文肉瘤X线特征（　）。A.X线片示：骨端膨胀性溶骨性破坏

B.X线片示：短骨膨胀，有蜂窝状骨吸收区夹杂钙化斑块

C.X线片示：长骨干骺端骨破坏和日光射线现象，有Codman三角

D.X线片示：骨膜板层状或葱皮状反应性骨形成和骨破坏

E.X线片示：自长骨干骺端突出的骨性病损

10、单项选择题：一病人胫腓骨骨折，闭合复位石膏外固定，当时肢体肿胀较明显，治疗中病人未能积极进行功能练习，2个月后去除外固定见骨折已经愈合。经1个月功能锻炼，恢复不满意，膝关节功能差，此为（　）。A.损伤性骨化

B.创伤性关节炎

C.关节僵硬

D.缺血性骨坏死

E.缺血性肌痉挛

11、单项选择题：坐骨神经的损伤对下肢功能影响较大，以下对坐骨神经损伤的描述，错误的是（　）。A.如损伤部位在坐骨大孔处或坐骨结节以上，则股后肌群，小腿前、外、后肌群及足部肌肉全部瘫痪

B.如在股部中下段损伤，只表现为膝以下肌肉瘫痪，膝以上肌肉无影响

C.如为其分支损伤，则腓总神经损伤引起的瘫痪重，胫神经损伤引起的瘫痪轻

D.膝以下除小腿内侧及内踝处隐神经供给区外，感觉均消失

E.往往有严重的营养障碍，足底部形成溃疡

12、单项选择题：青年女性，左小腿被车轮轧伤，患肢明显肿胀，X线片示，左胫骨中段骨折，行石膏托外固定，在观察早期骨筋膜室综合征时，哪项体征更有意义（　）。A.足背动脉搏动是否消失

B.小腿及足部的皮肤温度和颜色

C.患肢肿胀的程度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/417052131016006102