2024福建省南安市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题题库带答案（达标题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是（）

A：应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林

B：甘油果糖的脱水作用较甘露醇强且快

C：血小板计数<100×109/L时禁用溶栓药物

D：急性脑梗死的溶栓时间窗是48小时内

答案：C

2.和缓医疗总的原则不包括（）

A：无痛苦

B：有益

C：不伤害

D：尊重

答案：A

3.下列药物中，可影响性功能的药物为

A：泮托拉唑

B：法莫替丁

C：雷尼替丁

D：西咪替丁

答案：D

4.患者,女,34岁,因易疲劳、体重增加、反应退钝、肌肉痉挛就诊,化验结果显示TSH增高FT3、FT4减低,临床诊断为甲状腺功能减退使用左甲状腺素钠100μgqd治疗。药师对该患者的用药指导,正确的是()

A: 早餐后半小时,顿服

B: 早餐前半小时,顿服

C: 晚餐后顿服

D: 睡前顿服

答案：B

5.消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

A: 胰酶片

B: 莫沙必利

C: 铝碳酸镁

D: 复方阿嗪米特肠溶片

答案：C

6.痛风急性发作期选用的抗痛风药物

A: 别嘌醇

B: 阿司匹林

C: 秋水仙碱

D: 呋塞米

答案：C

7.敌百虫中毒

A: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

B: 禁止使用肟类复能剂

C: 静脉滴注烟酰胺

D: 静脉注射毒毛花苷K或毛花苷丙

答案：A

8.可能影响儿童骨骼发育的药物是()

A: 诺氟沙星

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 头孢克洛

D: 阿莫西林

答案：A

9.血红蛋白检查结果低于正常值即提示贫血。下列检测值可提示“极重度贫血”的是

A: 30～60g/L

B: 60～90g/L

C: >90g／L

D: <30g／L

答案：D

10.严重肝功能减退病人常伴功能性肾功能不全，以致使"经肝肾两种途径清除"的药物的血药浓度很高，因此用药原则是

A: 尽可能避免使用

B: 须谨慎使用，必要时减量给药

C: 一般无须调整剂量

D: 必须减量应用

答案：D

11.作为退热首选药，尤其适用于老年人和儿童的药品是

A: 布洛芬胶囊

B: 阿苯片

C: 贝诺酯片

D: 对乙酰氨基酚片

答案：D

12.高TG血症首选

A: 非诺贝特

B: 依折麦布

C: 氟伐他汀

D: 阿昔莫司

答案：A

13.患者,男,65岁因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院,诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是（）

A: 乙酰半胱氨酸

B: 右美沙芬

C: 羧甲司坦

D: 氨溴索

答案：B

14.非甾体抗炎药的不良反应,偶可致无菌性脑膜炎

A: 保泰松

B: 美洛昔康

C: 塞来昔布

D: 布洛芬

答案：D

15.强烈刺激作用致胃肠黏膜腐蚀性损伤的是

A: 氯化钠
B: 氯化锌
C: 磷化锌
D: 磷化氢
答案：B

16.患者，女，40岁，既往有风湿性心脏病病史，近2年来出现劳累性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。
A: 高钾血症
B: 直立性低血压
C: 心动过缓
D: 快速性房性心律失常伴传导阻滞
答案：D

17.氯霉素的禁用范围是
A: 新生儿
B: 1岁以下婴儿
C: 3岁以下幼儿
D: 婴幼儿
答案：A

18.下列分析方法中,不属于药物经济学评价方法的是()
A: 最小成本分析法
B: 成本一效用分析法
C: 成本一效应分析法
D: 成本一效益分析法
答案：C

19.（2017年真题）与葡萄柚汁同服可能升高血药浓度的药物是（）

A: 非洛地平片

B: 维A酸片

C: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

D: 左旋多巴片

答案：A

20.患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血T3、T4及TSH检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 海带

B: 不含碘的食用盐

C: 虾皮

D: 紫菜

答案：B

21.(透析患者常用药物)服用何种药物可以减轻透析患者出现骨和关节的疼痛或头痛

A: 铁剂

B: 阿法骨化醇

C: 乳果糖

D: 对乙酰氨基酚

答案：D

22.前记

A: 对药物治疗的建设性意见与结果评价

B: 医师签名、药品金额

C：临床诊断、费别

D：主要实验室数据

答案：C

23.多数抗过敏药物慎用于（）

A：胃溃疡患者

B：高脂血症患者

C：慢性鼻炎患者

D：前列腺增生老年患者

答案：D

24.患者，男，36岁。临床诊断痛风性关节炎急性发作期。症见左侧踝关节红肿，剧烈疼痛。为控制炎症，治疗首选药是

A：非布司他

B：布洛芬

C：秋水仙碱

D：尼美舒利

答案：C

25.IV期新药临床试验样本数要求

A：20～30例

B：≥300例

C：常见病≥12000例

D：主要病种≥300例

答案：C

26.用药错误A级（1级）的标准

A：客观环境或条件可能引发差错

B: 差错造成患者暂时性伤害，需要采取预防措施

C: 患者已使用，但未造成伤害

D: 发生差错但未发给患者，或已发给患者但未使用

答案：A

27.对于化疗药物引起的呕吐，正确的用药方法对严重呕吐，可给予

A: 羧甲司坦

B: 阿瑞吡坦

C: 昂丹司琼

D: 苯海拉明

答案：C

28.患者，女，65岁，诊断为房性心律失常，给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

A: 一日0.4-0.6g,分2-3次；1-2周后减至一日0.2-0.4g

B: 一次0.01-0.03g,一曰3-4次，根据耐受程度调整剂量

C: 一次0.25-0.5g,q4h

D: 首次0.2-0.3g,必要时2h后加服0.1-0.2g

答案：A

29.（2021年真题）哺乳期妇女使用，易诱发新生儿胆红素脑病的药物是（）

A: 胰岛素

B: 复方炔诺酮

C: 复方磺胺甲噁唑

D: 依那普利

答案：C

30.抑制5-a还原酶而用于前列腺增生症治疗的药物是

A：非那雄胺

B：前列康

C：特拉唑嗪

D：黄酮哌酯

答案：A

31.医师无权调配处方，体现处方的

A：经济性

B：法律性

C：有效性

D：技术性

答案：B

32.（2019年真题）艾滋病抗病毒治疗强调须多种药物联合治疗，俗称“鸡尾酒疗法”，目前国内免费治疗的一线方案是

A：齐多夫定+依非韦伦+利托那韦

B：拉米夫定+司他夫定+奈韦拉平

C：拉米夫定+替诺福韦+齐多夫定

D：替诺福韦+依非韦伦+雷特格韦

答案：B

33.治疗轻症、慢性疾病用药持久，最适宜选用的给药途径是

A：吸入给药

B：口服给药

C：舌下含服

D：直肠给药

答案：B

34.患者，女，65岁，诊断为房性心律失常，给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

A: 西咪替丁抑制CYP3A4，升高胺碘酮血浆药物浓度

B: 胺碘酮与西咪替丁竞争CYP2D6，减慢胺碘酮的代谢

C: 西咪替丁诱导CYP2C9,升高胺碘酮血浆药物浓度

D: 西咪替丁抑制CYP1A2,升高胺碘酮血浆药物浓度

答案：A

35.瘦肉精（克仑特罗）中毒时，可采用的解毒药是

A: 氟马西尼

B: 乙酰胺

C: 乙酰半胱氨酸

D: 普萘洛尔

答案：D

36.引起"肾病患者清除减慢，服用呋喃妥因血药浓度升高，可引起周围神经炎"是

A: 性别

B: 年龄

C: 基础疾病

D: 遗传因素

答案：C

37.患者于1周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

A：喹诺酮类抗菌药物有胃肠道反应，一般不用

B：CAP常见病原体为肺炎链球菌、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌和呼吸道病毒

C：青壮年和无基础疾病的CAP患者，常用青霉素和第一代头孢菌素

D：老人、有基础疾病或者需要住院的CAP患者常用第二、三代头孢菌素、β-内酰胺类等

答案：A

38.下列药物中，适用于压力性尿失禁的药物为

A：米多君

B：哌唑嗪

C：索利那新

D：非那雄胺

答案：A

39.对皮脂腺分泌过多所致的寻常型痤疮首选

A：0.03%维A酸乳膏剂

B：红霉素-过氧苯甲酰凝胶

C：10%过氧苯甲酰凝胶

D：0.1%阿达帕林凝胶

答案：C

40.药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

A：依他尼酸合用华法林

B：抗酸药合用四环素类药

C：磺胺类药与青霉素合用

D: 用药时同服甲氧氯普胺

答案：A

41.药师应告知医师“合理用药信息”的事例是

A: 氟西汀或帕罗西汀与异烟肼等单胺氧化酶抑制剂合用引起5-羟色胺综合征

B: 他汀类药物合用吉非贝齐或烟酸致横纹肌溶解症

C: 培氟沙星引起跟腱炎，合用糖皮质激素可致跟腱断裂

D: 头孢菌素类之间无共同抗原决定簇；如头孢哌酮皮试阳性者头孢曲松钠皮试阴性

答案：D

42.有关免疫抑制剂与药物、食物同服的影响，说法错误的有

A: 与抑酸剂合用，吗替麦考酚酯血药浓度降低

B: 与葡萄柚汁同服，环孢素血药浓度升高

C: 与氟康唑同服，他克莫司血药浓度升高

D: 与葡萄柚汁同服，西罗莫司血药浓度降低

答案：D

43.最常用的解热镇痛药为

A: 谷维素

B: 对乙酰氨基酚

C: 塞来昔布

D: 阿司匹林

答案：B

44.伪膜性肠炎

A: 白细胞增多

B：上皮细胞

C：红细胞

D：真菌

答案：B

45.(处方容易混淆的常用外文缩写的识别)右眼

A：O

B：DOL

C：NS

D：LD

答案：A

46.正常人的体温在37℃左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

A：口腔温度超过37.0℃

B：腋下温度超过36.6℃

C：直肠温度超过36.3℃

D：口腔温度超过37.3℃

答案：D

47.甲巯咪唑的初治剂量是一日

A：30～60mg

B：15～60mg

C：25～80mg

D：5～15mg

答案：A

48.发热血常规检查白细胞计数低于正常值，可能有

A：麻疹

B：病毒感染

C：感冒

D：细菌感染

答案：B

49.抗胆碱药或抗过敏药用于伴有青光眼患者，应评判为

A：有禁忌证用药

B：联合用药不适宜

C：无适应证用药

D：过度治疗用药

答案：A

50.下列高血压的降压目标普通高血压患者

A：＜140/90mmHg

B：＜130/80mmHg

C：＜120/80mmHg

D：＜150/80mmHg

答案：A

51.单侧头痛伴光敏感、恶心、呕吐提示

A：脑膜炎

B：脑血管意外

C：偏头痛

D：脑肿瘤

答案：C

52.氯喹与链霉素合用

A: 根治间日疟

B: 诱发癫痫

C: 加重神经肌肉接头抑制作用

D: 引起心脏房室传导阻滞

答案：C

53.处方审核“四查十对”中“四查”不包括

A: 处方

B: 配伍禁忌

C: 药品

D: 药品成本

答案：D

54.下列药物中，可经脑脊液途径给药的为

A: 甲氨蝶呤

B: 长春新碱

C: 氟尿嘧啶

D: 塞替派

答案：A

55.慢性痛风和痛风性肾病为抑制尿酸生成可选用

A: 别嘌醇

B: 秋水仙碱

C: 泼尼松龙

D: 苯溴马隆

答案：A

56.单核细胞正常参考区间是

A：0.01～0.05

B：0.03～0.08

C：0～0.01

D：0.20～0.40

答案：B

57.过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

A：黏液便

B：稀糊状或水样粪便

C：米泔水样便

D：脓状便

答案：D

58.具有退热、缓解头痛和全身痛的解热镇痛药是

A：阿司匹林

B：菠萝蛋白酶

C：颠茄浸膏片

D：伪麻黄碱

答案：A

59.关于肝功能不全患者用药，叙述不正确的是

A：口服肝毒性较大时可改为注射给药

B：明确诊断，合理选药

C：肝功能不全而肾功能正常的患者可选用对肝毒性小，并且从肾脏排泄的药物

D：避免或减少使用肝毒性大的药物

答案：A

60.一级信息源资料的最突出的特点是

A：内容广泛、使用方便

B：提供的信息最新

C：提供的信息丰富、详实

D：查阅时需要利用所提供参考文献去验证

答案：B

61.患者，男，70岁，右手抖动和行走缓慢3个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病，既往前列腺肥大史3年，临床上对该患者不宜选用：

A：司来吉兰

B：左旋多巴

C：多巴丝肼

D：苯海索

答案：D

62.用药后可出现痛风、面色潮红的抗结核药是

A：链霉素

B：吡嗪酰胺

C：利福平

D：乙胺丁醇

答案：B

63.(有关物质中毒的特效解毒剂)，香豆素类灭鼠药中毒的特效解毒剂是

A：维生素K

B: 乙酰胺

C: 烯丙吗啡

D: 氯解磷定

答案：A

64.急性肾小球肾炎时，尿中可见()。

A: 血红蛋白尿

B: 红细胞管型

C: 乳糜尿

D: 白细胞管型

答案：B

65.伴有焦虑症的抑郁症患者宜选用

A: 阿米替林

B: 帕罗西汀

C: 度洛西汀

D: 文拉法辛

答案：B

66.静脉滴注碳酸氢钠注射液用于

A: 阿片中毒

B: 有机氟中毒

C: 阿米替林中毒

D: 巴比妥类中毒

答案：D

67.重要器官或系统功能有严重损害、缩短或危及生命，应判为

A: 弱轻度

B: 重度

C: 中度

D: 轻度

答案：B

68.拓扑异构酶抑制剂

A: 依托泊苷

B: 顺铂

C: 培美曲塞

D: 放线菌

答案：A

69.连续规律用药2日以上方能充分发挥作用的药品是

A: 吸入型糖皮质激素

B: 短效β

C: 非甾体抗炎药

D: β受体拮抗剂

答案：A

70.患者男性，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 利伐沙班

B: 氯吡格雷

C: 华法林

D: 肝素

答案：B

71.抑制前列腺内双氢睾酮水平，达到降低雄激素水平，提高最高尿流率

A: 度他雄胺

B: 哌唑嗪

C: 特拉唑嗪

D: 索利那新

答案：A

72.(致畸药物的种类与危害)可能导致胎儿泌尿生殖系统异常、指趾畸形的是

A: 雄激素

B: 氮芥类

C: 沙利度胺

D: 孕激素

答案：B

73.患者，男，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 糖皮质激素

B: 阿司匹林

C: 抗菌药物

D: 布洛芬

答案：A

74.癫痫持续状态首选的治疗方案是()

A: 静脉注射丙戊酸钠200mg

B: 口服地西泮10mg

C: 口服丙戊酸钠200mg

D: 静脉注射地西泮10mg

答案：D

75.（2015年真题）妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是（）。

A: 妊娠3～12周

B: 妊娠13～27周

C: 妊娠28～32周

D: 妊娠1～2周

答案：A

76.治疗水疱型脚癣宜选用()

A: 阿昔洛韦软膏

B: 氢化可的松软膏

C: 复方苯甲酸酊

D: 维A酸乳膏

答案：C

77.患者男50岁临床诊断为焦虑症，给予氟西汀20mgqd治疗。对该患者用药教育的说法错误的是()

A: 氟西汀应于睡前服用

B: 不能突然停止服用氟西汀

C: 服用氟西汀期间不能饮酒

D: 不得随意自行调整氟西汀剂量

答案：A

78.患者,女,35岁,复杂部分发作性癫痫病史12年,最初使用苯妥英钠单药治疗,6个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量,因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗,癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发,到神经内科复诊。患者同时患有2型糖尿病长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素B

A: 卡马西平的不良反应

B: 停用了苯妥英钠

C: 糖尿病病情进展

D: 丙戊酸钠的不良反应

答案：D

79.用药期间禁止饮酒否则可出现面部潮红、头痛、眩晕等"双硫仑反应"的药品是

A: 甲硝唑

B: 克林霉素

C: 青霉素钾

D: 庆大霉素

答案：A

80.急诊处方一般不超过几日

A: 7日常用量

B: 3日常用量

C: 1日常用量

D: 15日常用量

答案：B

81.关于微生态制剂，下列说法不正确的是

A: 对促进营养物质的吸收没有帮助

B：调节肠道菌群平衡

C：清除对人体具有潜在危害的细菌

D：补充人体正常生理细菌

答案：A

82.转复并维持窦性心律

A：硝苯地平

B：血凝酶

C：多非利特

D：华法林

答案：C

83.患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15kg。1天前开始发热，体温39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热20h左右出现腹泻，每间隔2～3小时排1次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L，粪便镜检可见红、白细胞。

A：小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用

B：药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用

C：腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充

D：首选口服补液，必要时静脉补液

答案：B

84.餐前1h服用的药物是

A：伊托必利

B：阿托伐他汀

C：复方氢氧化铝

D: 奥美拉唑

答案：C

85.患者手术后，给予肠外营养液10%GS500ml，50%GS250ml，20%脂肪乳250ml，8.5%复方氨基酸750ml，水溶性维生素10ml，脂溶性维生素10ml，微量元素10ml，10%氯化钠注射液40ml，10%氯化钾注射液30ml。营养液中葡萄糖提供的能量是()

A: 1150kcal

B: 450kcal

C: 700kcal

D: 200kcal

答案：C

86.对抗胆碱阻断的解毒剂是()。

A: 毒扁豆碱

B: 乙酰胺

C: 阿托品

D: 卡马西平

答案：A

87.当创伤应激严重时，给予肠外营养的热氮比调整为

A: 150kcal:1gN

B: NPC7:3

C: NPC5：5

D: 100kcal:1gN

答案：D

88.下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/417056041046010024