

## 2024 吉林省梨树县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题通关秘籍题库含答案（轻巧夺冠）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 不可用于治疗白细胞减少的药物是

- A: 利可君
- B: 利伐沙班
- C: 腺嘌呤
- D: 糖皮质激素

**答案：B**

2. 巴比妥类药物急性中毒致死的直接原因是

- A: 胃、十二指肠溃疡
- B: 深度呼吸抑制
- C: 肝脏损害
- D: 高钾血症

**答案：B**

3. 糖皮质激素的药理作用不包括

- A: 抗休克
- B: 抗病毒
- C: 免疫抑制
- D: 抗炎

**答案：B**

4. 患者，男，55 岁，诊断为良性前列腺增生症，服用非那雄胺片治疗，最有可能发生与用药相关的不良反应是（）。

- A: 脱发
- B: 心悸
- C: 体位性低血压
- D: 性欲减退

**答案：D**

5. 其他  $\beta$ -内酰胺类抗生素的主作用靶位是

- A: DNA 螺旋酶
- B: 细菌核蛋白体 50S 亚基
- C: 二氢叶酸合成酶
- D: 细菌胞浆膜上特殊蛋白 PBPs

**答案：D**

6. （2018 年真题）配制静脉输液时；应先用灭菌注射用水溶解，然后用 5%葡萄糖注射液稀释，不可用氯化钠注射液稀释的抗真菌药是（）

- A: 伏立康唑
- B: 两性霉素 B
- C: 氟康唑
- D: 卡泊芬净

**答案：B**

7. 可引起血压下降、缩瞳、欣快感的受体是

- A: K 受体
- B:  $\mu 1$  受体
- C:  $\delta$  受体
- D:  $\mu 2$  受体

**答案：C**

8. 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内，宜使用的口服紧急避孕药是（）

- A: 复方醋酸环丙孕酮（35  $\mu$ g/2mg）
- B: 十一酸睾酮（40mg）
- C: 左炔诺孕酮（1
- D: 炔雌醇去氧孕烯（30g/150g）

**答案：C**

9. 抑制二氢叶酸合成酶的药物是

- A: 青霉素
- B: 磺胺甲
- C: 甲氧苄啶
- D: 红霉素

**答案：B**

10. 属于雌激素类退乳药的是（）

- A: 己烯雌酚
- B: 他莫昔芬
- C: 睾酮
- D: 甲羟孕酮

**答案：A**

11. （2018 年真题）普通感冒患者，有打喷嚏、流鼻涕的症状，宜选用的药物是（）

- A: 茶碱缓释片
- B: 右美沙芬片

C: 氯苯那敏片

D: 对乙酰氨基酚滴剂

**答案: C**

12. 中枢性或肾性尿崩症可选用

A: 呋塞米

B: 螺内酯

C: 乙酰唑胺

D: 氢氯噻嗪

**答案: D**

13. 属于 I b 类抗心律失常药的是

A: 利多卡因

B: 普罗帕酮

C: 奎尼丁

D: 胺碘酮

**答案: A**

14. (2016 年真题) 可导致神经毒性 (四肢麻木、腱反射消失) 的抗肿瘤药是

A: 紫杉醇

B: 柔红霉素

C: 博来霉素

D: 长春新碱

**答案: D**

15. 能升高血糖, 对抗胰岛素的降血糖作用的是

A: 格列喹酮

- B: 磺胺甲唑
- C: 普萘洛尔
- D: 甲状腺素

**答案：D**

16. 硫脲类最重要的不良反应是

- A: 粒细胞下降
- B: 血管神经性水肿
- C: 甲状腺素
- D: 丙硫氧嘧啶

**答案：A**

17. 可引起下肢水肿的抗高血压药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 洛伐他汀
- D: 硝酸甘油

**答案：B**

18. 围手术期为预防革兰阴性杆菌感染,可选用()

- A: 万古霉素
- B: 头孢唑林
- C: 青霉素 G
- D: 氨曲南

**答案：D**

19. 有明显的镇痛作用，可用于肿瘤骨转移所致的高钙血症和痛性骨质疏松症治疗的药物是

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 降钙素
- C: 雷洛昔芬
- D: 骨化三醇

**答案：B**

20. 选择性直接作用于 M 胆碱受体，引起缩瞳，眼压下降，并有调节痉挛等作用的是

- A: 碳酸酐酶抑制剂
- B: 拟胆碱药
- C: 前列腺素衍生物
- D:  $\alpha_2$  受体激动剂

**答案：B**

21. 注射用奥沙利铂的溶媒选择要求是

- A: 先用乳酸钠注射液溶解,再用氯化钠注射液或 5%葡萄糖注射液进一步稀释
- B: 先用氯化钠注射液溶解,再用 5%葡萄糖注射液进一步稀释
- C: 氯化钠注射液稀释
- D: 5%葡萄糖注射液稀释

**答案：D**

22. 不属于抗乙型肝炎病毒的药品

- A: 泛昔洛韦
- B: 干扰素
- C: 恩替卡韦
- D: 拉米夫定

**答案：A**

23. 下列头孢菌素药物中，半衰期最长的药物是

- A: 头孢曲松
- B: 头孢克洛
- C: 头孢氨苄
- D: 头孢孟多

**答案：A**

24. 可导致新生儿药物性黄疸的是

- A: 林可霉素
- B: 磺胺嘧啶
- C: 头孢他啶
- D: 阿莫西林

**答案：B**

25. 下列关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述，错误的是

- A: 贝伐单抗作用机制较为特殊，作用于血管内皮生长因子
- B: 对癌细胞和正常体细胞都有“杀灭”作用
- C: 静脉滴注可致患者发生过敏样反应或其他超敏反应
- D: 优点是选择性“杀灭”，就是只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害

**答案：B**

26.  $\beta$ -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是（）

- A: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸
- B: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦
- C: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸
- D: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦

**答案：B**

27. 铜绿假单胞菌性结膜炎常用()

- A: 1%泼尼松滴眼液
- B: 夫西地酸滴眼剂
- C: 多黏菌素 B 滴眼液
- D: 金霉素眼膏

**答案：C**

28. (2019 年真题) 长期大量使用可致泌尿系统尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石的维生素是 ()

- A: 维生素 B6
- B: 维生素
- C: 维生素 A
- D: 维生素 B2

**答案：B**

29. (2016 年真题) 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: 吸入性糖皮质激素
- D: 短效  $\beta_2$  受体激动剂

**答案：D**

30. 不得与碱性物质或铁器接触的是()

- A: 克罗米通
- B: 阿达帕林
- C: 苯甲酸苄酯



D: 林旦霜

**答案: D**

31. 预防急性肾功能衰竭可选用

A: 乙酰唑胺

B: 螺内酯

C: 呋塞米

D: 氢氯噻嗪

**答案: C**

32. 可用于治疗肝性脑病的药物是

A: 利那洛肽

B: 欧车前

C: 多库酯钠

D: 番泻叶

**答案: A**

33. 用于疥疮和阴虱病的药物是()

A: 过氧苯甲酰

B: 维 A 酸

C: 林旦

D: 硼酸

**答案: C**

34. 对革兰阳性菌作用强，对革兰阴性菌作用弱的药物是

A: 第一代头孢菌素

B: 第四代头孢菌素

C: 第三代头孢菌素

D: 第二代头孢菌素

**答案：A**

35. 主要经肝脏代谢，受肾功能影响小，可用于肾功能不全患者的强心苷是

A: 毛花苷丙（西地兰 C）

B: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）

C: 地高辛

D: 洋地黄毒苷

**答案：D**

36. 用于治疗便秘，也可在结肠镜检查或 X 线检查时用作肠道清洁剂，与碳酸氢钠等碱性药物作用，能引起尿液变色的是

A: 乳果糖

B: 开塞露

C: 酚酞

D: 聚乙二醇 4000

**答案：C**

37. 噻嗪类利尿药发挥抗利尿作用，是因为其可以抑制

A:  $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$  同向转运子

B: 碳酸酐酶

C: 磷酸二酯酶

D:  $\text{Na}^+-\text{Cl}^-$  共转运子

**答案：C**

38. 下列关于镇痛药物的禁忌证，错误的是

A: 心源性哮喘禁用吗啡

- B: 室上性心动过速禁用哌替啶
- C: 颅脑损伤患者禁用羟考酮
- D: 多痰患者禁用可待因

**答案：A**

39. 外耳道红肿局部治疗可选用 ()

- A: 3%硼酸乙醇
- B: 赛洛唑啉
- C: 2%酚甘油
- D: 伪麻黄碱

**答案：C**

40. 阻碍体内睾酮转化为二氢睾酮及抑制白三烯、前列腺素合成，用来治疗良性前列腺增生症（BPH）的植物药是

- A: 度他雄胺
- B: 非那雄胺
- C: 普适泰
- D: 依立雄胺

**答案：C**

41. （2018 年真题）不能用于曲霉菌感染的抗真菌药是（）

- A: 氟康唑
- B: 两性霉素 B
- C: 卡泊芬净
- D: 伏立康唑

**答案：A**

42. 下列属于新型非苯二氮

- A: 劳拉西泮
- B: 地西泮
- C: 阿普唑仑
- D: 佐匹克隆

**答案：D**

43. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

- A: 托拉塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 氨苯蝶啶
- D: 乙酰唑胺

**答案：A**

44. 抗菌活性强，并对  $\beta$ -内酰胺酶高度稳定，属于碳青霉烯类的抗菌药物是()。

- A: 氨曲南
- B: 亚胺培南
- C: 头孢吡肟
- D: 头孢美唑

**答案：B**

45. 对曲霉无效的药物是

- A: 伊曲康唑
- B: 两性霉素 B
- C: 氟康唑
- D: 伏立康唑

**答案：C**

46. 四环素类的主要作用靶点是

- A: 细胞内膜 PBP
- B: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- C: 核糖体的 50S 亚基
- D: 核糖体的 30S 亚基

**答案：D**

47. （2018 年真题）可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是（）

- A: 精蛋白锌胰岛素注射液
- B: 甘精胰岛素注射液
- C: 预混胰岛素注射液
- D: 普通胰岛素注射液

**答案：D**

48. 作用于近曲小管前段的利尿剂是

- A: 袢利尿剂
- B: 碳酸酐酶抑制剂
- C: 醛固酮受体阻断剂
- D: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂

**答案：B**

49. 下述与西地那非无药物相互作用的是

- A: 西咪替丁
- B: 红霉素
- C: 阿司匹林
- D: 硝酸酯类

**答案：C**

50. 下列属于重组人促红素的禁忌证的是()

- A: 中性粒细胞减少
- B: 心律失常
- C: 难以控制的高血压
- D: 低血压

**答案: C**

51. 口服后很少被吸收的口服降糖药是

- A: 达格列净
- B: 罗格列酮
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

**答案: D**

52. 眼科术后引起的眼内炎应向眼内注射

- A: 利福平
- B: 阿昔洛韦
- C: 夫西地酸
- D: 头孢他啶

**答案: D**

53. 可调节表皮细胞有丝分裂和更新()

- A: 维 A 酸
- B: 过氧苯甲酰
- C: 阿达帕林
- D: 异维 A 酸

**答案: A**

54. (2016 年真题) 不属于口服避孕药所致不良反应的是

- A: 突破性出血
- B: 增加血栓栓塞性疾病风险
- C: 月经失调
- D: 低钙血症

**答案: D**

55. 与噻嗪类利尿剂合用易发生高钙血症的药物是

- A: 碳酸钙
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 莫沙必利
- D: 奥关拉唑

**答案: A**

56. 对痉挛性和功能性便秘者，可选用

- A: 酪酸菌
- B: 双歧杆菌
- C: 地芬诺酯
- D: 双歧三联活菌胶囊

**答案: B**

57. 以降低三酰甘油为主要治疗目标时，首选的调血脂药是

- A: 非诺贝特
- B: 依折麦布
- C: 瑞舒伐他汀
- D: 辛伐他汀

**答案: A**

58. 属于 M 受体阻断剂的药物是

- A: 阿托品
- B: 拉坦前列素
- C: 乙酰唑胺
- D: 奥布卡因

**答案：A**

59. 下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

- A: 属于抗动力药
- B: 不被胃肠道吸收，不进入血液循环
- C: 不良反应少，可用于治疗儿童的急、慢性腹泻
- D: 具有吸附、收敛的作用

**答案：A**

60. 以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者，宜使用的药物是

- A: 甘草酸二铵
- B: 葡醛内酯
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 多烯磷脂酸胆碱

**答案：D**

61. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。

医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

- A: 不会导致 Q-T 间期延长及室性心律失常
- B: 不会导致催乳素增多



C: 不会促进乙酰胆碱的释放

D: 不会导致锥体外系反应

**答案: C**

62. (2016 年真题) 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是

A: 苯丙哌林

B: 氯化铵

C: 可待因

D: 右美沙芬

**答案: A**

63. 主要用于糖尿病，特别是 1 型糖尿病的治疗的药物是()

A: 二甲双胍

B: 磺酰脲类

C: 胰岛素

D: A 和 B 均无效

**答案: C**

64. 对钙及骨矿物质具有极强的吸附性，主要分布在骨骼中发挥疗效的药物是()

A: 依替膦酸二钠

B: 帕米膦酸二钠

C: 阿仑膦酸钠

D: 氯屈膦酸二钠

**答案: D**

65. 伴有 ( ) 的患者在应用 ACEI 首剂治疗时可能出现严重低血压

A: 低钠血症

B: 脑水肿

C: 干咳

D: 蛋白尿

**答案：A**

66. 不宜与三环类抗抑郁药合用

A: 羟甲唑啉

B: 赛洛唑啉

C: 酚甘油滴耳液

D: 麻黄碱

**答案：D**

67. 患者男性，26 岁。主诉发热、全身酸痛，头痛、乏力等，伴有阵发性刺激性干咳，红细胞冷凝集素试验阳性，血清肺炎支原体抗体阳性。

A: 肝脏损害

B: 胃肠道反应

C: 二重感染

D: 过敏反应

**答案：C**

68. 催眠药应()

A: 定时内服

B: 空腹内服

C: 睡前内服

D: 饭前内服

**答案：C**

69. 治疗肾性尿崩症

- A: 氢氯噻嗪
- B: 螺内酯
- C: 呋塞米
- D: 乙酰唑胺

**答案：A**

70. 急性心肌梗死引起的急性室性心动过速可选用

- A: 阿托品
- B: 利多卡因
- C: 硝苯地平
- D: 美西律

**答案：B**

71. 对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是()

- A: 乙酰唑胺
- B: 依托塞米
- C: 布美他尼
- D: 依他尼酸

**答案：D**

72. 顺铂

- A: 影响蛋白质合成和功能
- B: 直接破坏 DNA 结构和功能
- C: 干扰核酸生物合成
- D: 干扰 RNA 转录

**答案：B**

73. 属于二肽基肽酶-4 抑制剂的是

- A: 罗格列酮
- B: 西格列汀
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

**答案：B**

74. 噻嗪类利尿药可用于治疗肾性尿崩症及加压素无效的垂体性尿崩症，是因为其可以抑制

- A:  $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- B:  $\text{Na}^+-\text{Cl}^-$ 共转运子
- C: 磷酸二酯酶
- D: 远曲小管近端

**答案：C**

75. 甲亢术前准备的正确给药方法是()

- A: 只给硫脲类
- B: 先给碘化物，术前 2 周再给硫脲类
- C: 先给硫脲类，术前 2 周再给碘化物
- D: 只给碘化物

**答案：C**

76. 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

- A: 能使凝血级联的丝氨酸蛋白酶失活
- B: 能刺激脂蛋白脂肪酶的释放，加速血液循环中脂蛋白的清除
- C: 体外试验具有直接的抗凝活性，可抑制体外凝血过程

D: 通过增强抗凝血酶Ⅲ（AT-III）的活性，抑制凝血因子Ⅱa 和Ⅹa 发挥抗凝作用

**答案：D**

77. 扩张脑血管作用较强,能增加脑血流量的钙通道阻滞剂是（）

A: 非洛地平

B: 尼莫地平

C: 拉西地平

D: 氟氯地平

**答案：B**

78. 静脉滴注过量可消除噻嗪类利尿剂的利尿和降压作用的是

A: 氯化钾

B: 氯化钙

C: 枸橼酸钾

D: 氯化钠

**答案：D**

79. 局麻药吸收过量所引起的症状，错误的是

A: 先兴奋，后抑制

B: 血压下降

C: 心缩力增强

D: 心律失常

**答案：C**

80. 主要不良反应为踝部关节水肿，晨轻午重的药物是

A: 地高辛

B: 硝酸甘油

C: 氨氯地平

D: 卡托普利

**答案: C**

81. 长期、单一应用  $\beta$

A: 耐药性

B: 头痛

C: 暂时性低血糖

D: 支气管痉挛

**答案: A**

82. 达那唑的适应证不包括

A: 子宫内膜异位症

B: 白细胞减少症

C: 纤维性乳腺炎

D: 男性乳房发育

**答案: B**

83. 利奈唑胺的主要抗菌作用机制是

A: 增加细菌胞浆膜的通透性

B: 干扰细菌细胞壁的合成

C: 抑制细菌蛋白质合成

D: 抗叶酸代谢

**答案: C**

84. 多柔比星与肝素、头孢菌素等同用()

A: 易产生沉淀

B: 导致坏死性结肠炎

C: 增加肝毒性

D: 增加心脏毒性

**答案：A**

85. 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可作用与慢性心力衰竭治疗的利尿剂是

A: 氢氯噻嗪

B: 呋塞米

C: 螺内酯

D: 乙酰唑胺

**答案：C**

86. 成人应用 0.1% 溶液，儿童应用 0.05% 溶液，这种药物是

A: 赛洛唑啉滴鼻液

B: 羟甲唑啉滴鼻液

C: 酚甘油滴耳液

D: 麻黄碱滴鼻液

**答案：A**

87. 水溶性他汀类药物能够选择性抑制肝脏胆固醇合成，而对肾上腺、性腺、心脏、大脑等部位的胆固醇合成影响极低，既有效降低了血清胆固醇水平，又减少了肝脏以外组织不良反应的发生。水溶性较强的他汀类药物是（）

A: 普伐他汀

B: 氟伐他汀

C: 洛伐他汀

D: 辛伐他汀

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/417201032055010024>