

2024 年江西省信丰县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题真题含答案解析

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，57 岁，身高 175cm，体重 87kg，诊断为 2 型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

- A: 可能出现的不良反应有腹痛、腹泻、腹胀
- B: 两药合用正常情况下不会引发低血糖
- C: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖
- D: 服药过程中适当补充维生素 B12

答案：B

2. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

- A: 阿托品+新斯的明
- B: 胆碱酯酶复活药
- C: 阿托品
- D: 足量阿托品+胆碱酯酶复活药

答案：D

3. 通过与敏感真菌细胞膜上的甾醇（主要为麦角固醇）相结合，引起细胞膜的通透性改变，导致细胞内重要物质如钾离子、核苷酸和氨基酸等外漏，从而破坏细胞的正常代谢抑制其生长的是

- A: 伊曲康唑
- B: 氟胞嘧啶
- C: 两性霉素
- D: 万古霉素

答案：C

4. 使用多塞平治疗无效时可换用的抗抑郁药是

- A: 氯米帕明
- B: 阿米替林
- C: 吗氯贝胺
- D: 丙米嗪

答案：C

5. 可引起血钾、血钙降低，血尿素氮、肌酐及尿酸升高的是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 醛固酮
- C: 依他尼酸
- D: 乙酰唑胺

答案：A

6. 关于万古霉素，描述错误的是

- A: 属于杀菌剂
- B: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成
- C: 肾功能不全者无需调整剂量
- D: 可用于对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染

答案：C

7. 下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

- A: 丙美卡因
- B: 左氧氟沙星
- C: 噻吗洛尔
- D: 毛果芸香碱

答案：D

8. 对抗胰岛素降血糖作用的药物是

- A: 蛋白同化激素
- B: 磺胺类药
- C: 口服降血糖药
- D: 甲状腺素

答案：D

9. 用于真菌感染的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 氟康唑
- C: 利巴韦林
- D: 拉米夫定

答案：B

10. （2016 年真题）可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

- A: 硫酸亚铁
- B: 维生素 B12
- C: 人血白蛋白
- D: 重组人促红素

答案：D

11. 减少胃肠道对氢氯噻嗪的吸收，应在口服该药 1 小时前或 4 小时后服用氢氯噻嗪，该药是

- A: 拟交感药
- B: 胺碘酮
- C: 多巴胺

D: 考来烯胺

答案: D

12. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片 20mg/d 治疗。服药期间应监测血生化指标，其中超过正常值上限 10 倍，应立即停药的指标是()。

A: Hcy

B: CK

C: Cr

D: BUN

答案: B

13. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

A: 氯丙嗪

B: 维生素 C

C: 红霉素

D: 他莫昔芬

答案: D

14. 使用环磷酰胺化疗，以下检查结果可能升高的是

A: 血红蛋白

B: 血小板计数

C: 白细胞计数

D: 血尿酸

答案: D

15. 能阻断 H

- A: 法莫替丁
- B: 谷丙胺
- C: 奥美拉唑
- D: 枸橼酸铋钾

答案：A

16. 蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性,临床应用的解毒方案是
()

- A: 在用柔红霉素前 30min,使用柔红霉素 2 倍量的氟马西尼
- B: 在用柔红霉素前 30min,使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生
- C: 在用柔红霉素同时,使用柔红霉素等量的右雷佐生
- D: 在用柔红霉素后 30min,使用柔红霉素 2 倍量的右雷佐生

答案：B

17. 用于治疗妊娠期妇女子痫和先兆子痫的首选药物是

- A: 依那普利
- B: 普萘洛尔
- C: 丙戊酸钠
- D: 硫酸镁

答案：D

18. 哌拉西林和羧苄西林 ()

- A: 脑脊液中浓度较高,酶稳定性高,适用于严重脑膜感染
- B: 口服,肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染
- C: 肾毒性大
- D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

答案：D

19. 属于维生素 K 拮抗剂的抗血栓药是

- A: 肝素
- B: 达比加群酯
- C: 华法林
- D: 维生素 K

答案：C

20. 属于免疫调节型氨基酸注射液的是()

- A: 丙氨酰谷氨酰胺注射液
- B: 复方氨基酸注射液(20AA)
- C: 赖氨酸注射液
- D: 复方氨基酸注射液(18AA)

答案：A

21. (2018 年真题) 关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法, 正确的是()

- A: 孟鲁司特钠可单独用于哮喘治疗
- B: 12 岁以下儿童禁用孟鲁司特钠
- C: 孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多
- D: 孟鲁司特钠起效快, 适用于哮喘急性发作

答案：C

22. (2020 年真题) 主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

- A: 阿德福韦酯
- B: 拉米夫定
- C: 更昔洛韦
- D: 利巴韦林

答案：D

23. 治疗黏液性水肿的药物是

- A: 硫脲类+大剂量碘
- B: 普萘洛尔
- C: 硫脲类
- D: 甲状腺片

答案：D

24. 外耳道红肿局部治疗可选用

- A: 2%酚甘油
- B: 赛洛唑啉
- C: 伪麻黄碱
- D: 3%硼酸乙醇

答案：A

25. 降低夜间眼压的首选药物是()

- A: 毛果芸香碱滴眼剂
- B: 地匹福林滴眼剂
- C: 噻吗洛尔滴眼剂
- D: 拉坦前列素滴眼剂

答案：D

26. 变异型心绞痛不宜选用的药物是()

- A: 硝酸甘油
- B: 硝苯地平
- C: 胍乙啶
- D: 普萘洛尔

答案：D

27. 严重低钾血症、高钠血症、高血压、心力衰竭、肾功能衰竭者禁用的药物是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 雷尼替丁
- D: 甘草酸二铵

答案：D

28. 肾上腺糖皮质激素类药物对电解质的影响是

- A: 抑制钠的排泄
- B: 抑制钾的排泄
- C: 抑制钙的排泄
- D: 抑制磷的排泄

答案：A

29. (2020 年真题) 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：(1) 心绞痛急性发作；(2) 心功能不全、心功能 III 级；(3) 高血压病 3 级；(4) 高脂血症。

- A: 硝酸甘油片单次剂量不足，次数不足
- B: 硝酸甘油片被吞服，而不是舌下含服
- C: 贝那普利、阿托伐他汀等拮抗硝酸甘油的疗效
- D: 硝酸甘油片已经过期

答案：C

30. 洛伐他汀的作用是()

- A: 主要影响胆固醇吸收
- B: 主要影响胆固醇合成
- C: 主要影响甘油三酯合成
- D: 影响脂蛋白合成、转运及分解

答案：B

31. 属于贝丁酸类调节血脂药的是

- A: 阿托伐他汀
- B: 非诺贝特
- C: 依折麦布
- D: 阿昔莫司

答案：B

32. 可致色觉异常的药物是

- A: 氨氯地平
- B: 硝酸甘油
- C: 地高辛
- D: 卡托普利

答案：C

33. (2020 年真题) 患者，女，55 岁。经皮冠状动脉介入治疗 (PCI) 术后一直服用他汀类药物，但是低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 未达标，医师增加了他汀类药物的剂量后，患者的 ALT 升至 120U/L，故医师拟恢复原他汀药物的剂量，并联用其他调血脂药，该患者宜联用的药物是

- A: 非诺贝特

B: 辛伐他汀

C: 氟伐他汀

D: 依折麦布

答案: D

34. 抑制叶酸合成的抗癌药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 顺铂

C: 环磷酰胺

D: 阿糖胞苷

答案: A

35. 关于维生素用药时间的说法正确的是

A: 水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐前服用

B: 水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐后服用

C: 水溶性维生素应该在餐前服用，脂溶性维生素应该在餐后服用

D: 水溶性维生素应该在餐后服用，脂溶性维生素应该在餐中服用

答案: D

36. 属于拓扑异构酶 I 抑制剂的生物碱是

A: 羟基树碱

B: 来曲唑

C: 卡莫氟

D: 甲氨蝶呤

答案: A

37. (2020 年真题) 适用于干咳、咳嗽伴黏稠痰的患者, 但不宜长期使用, 用药 7 日症状未缓解应停药的恶心性祛痰药物是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 氨溴索
- C: 氯化铵
- D: 溴己新

答案：C

38. 治疗重型幼年型糖尿病的是

- A: 胰岛素
- B: 磺酰脲类
- C: 二甲双胍
- D: A 和 B 均无效

答案：A

39. (2017 年真题) 升高高密度脂蛋白胆固醇水平的 ()

- A: 维生素 B2
- B: 叶酸
- C: 烟酸
- D: 泛酸钙

答案：C

40. 以下维生素在注射前需要进行皮肤敏感试验的是

- A: 维生素
- B: 维生素 B2
- C: 维生素 B6
- D: 维生素 B1

答案：D

41. 两性霉素 B 属于 ()

- A: 丙烯胺类抗真菌药
- B: 唑类抗真菌药
- C: 棘白菌素类抗真菌药
- D: 多烯类抗真菌药

答案：D

42. 散瞳药阿托品滴眼液的禁用人群是()。

- A: 青光眼患者
- B: 睫状肌麻痹患者
- C: 虹膜睫状体炎患者
- D: 眼底检查者

答案：A

43. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

- A: 注射与口服并用
- B: 注射给药
- C: 长期口服给药
- D: 短期口服给药

答案：D

44. 脑瘤的首选药是

- A: 替尼泊苷
- B: 博来霉素
- C: 羟喜树碱
- D: 依托泊苷

答案：A

45. 在动物试验中发现可引起幼龄动物软骨关节病变（损伤和水疱），儿童不推荐使用的药物是

- A: 红霉素眼膏
- B: 阿托品滴眼剂
- C: 左氧氟沙星滴眼剂
- D: 氯霉素眼膏

答案：C

46. 多巴胺受体阻断药的代表药物为()

- A: 甲氧氯普胺
- B: 昂丹司琼
- C: 格雷司琼
- D: 托烷司琼

答案：A

47. 对组胺 H

- A: 甲硝唑
- B: 雷尼替丁
- C: 丙谷胺
- D: 哌仑西平

答案：B

48. 预防急性肾功能衰竭可选用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 呋塞米
- C: 乙酰唑胺
- D: 螺内酯

答案：B

49. 关于他扎罗汀治疗银屑病的叙述，错误的是

- A: 育龄期妇女用药前 2 周，应进行血清或尿液妊娠试验
- B: 对严重的银屑病效果显著
- C: 不用于 18 岁以下银屑病患者
- D: 成人每晚(睡前半小时)1 次，一般 12 周，使用面积应不超过 20% 体表面积

答案：B

50. 白女士，74 岁，以“间断性腹胀 1 月余”主诉入院。患者 1 个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史 14 年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

- A: 预防低血钠
- B: 预防低血钾
- C: 预防低血镁
- D: 预防耳毒性

答案：B

51. 下列不属于抗肿瘤药的是

- A: 三尖杉酯碱
- B: 长春碱
- C: 氟胞嘧啶
- D: 长春新碱

答案：C

52. 可引起下肢水肿的抗高血压药物是

- A: 普萘洛尔

- B: 硝苯地平
- C: 洛伐他汀
- D: 硝酸甘油

答案：B

53. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

- A: 10~15mg
- B: 2~4mg
- C: 20~40mg
- D: 5~10mg

答案：C

54. 易发生持续干咳不良反应的药品是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 福辛普利
- C: 硝苯地平
- D: 硝酸甘油

答案：B

55. 可使双膦酸盐的吸收下降，服用双膦酸盐后 2 小时内避免食用的是

- A: 萘普生
- B: 沙利度胺
- C: 抗血管生成药
- D: 高钙食品

答案：D

56. (2020 年真题) 关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

- A: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发
- B: 能降低血清前列腺特异性抗原 (PSA) 水平
- C: 易引起直立性低血压
- D: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮

答案：C

57. 神经毒性是剂量依赖性的是()

- A: 亚叶酸钙
- B: 卡铂
- C: 奥沙利铂
- D: 顺铂

答案：C

58. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

- A: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用
- B: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小
- C: 可使用大环内酯类药物如红霉素
- D: 依诺沙星可抑制茶碱代谢

答案：C

59. 单纯疱疹病毒感染的首选药是

- A: 碘苷
- B: 金刚烷胺
- C: 干扰素
- D: 阿昔洛韦

答案：D

60. 下列硝酸酯药物相互作用中，可以合用的是

- A: 与麻黄碱合用
- B: 与硝普钠合用
- C: 与他汀类药物合用
- D: 与西地那非合用

答案：C

61. 用于颅脑损伤的氨基酸制剂的是

- A: 赖氨酸注射液
- B: 复方氨基酸注射液（9AA）
- C: 复方氨基酸注射液（6AA）
- D: 复方氨基酸注射液（18AA）

答案：A

62. 属于电解质补充药，可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是（）

- A: 门冬氨酸钾镁
- B: 多烯磷脂酰胆
- C: 双环醇
- D: 异甘草酸镁

答案：A

63. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

- A: 己烯雌酚
- B: 他莫昔芬
- C: 托瑞米芬
- D: 氟他胺

答案：D

64. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次 / 日。

- A: 对泌乳素的分泌无影响
- B: 无心脏不良反应
- C: 对化疗所致的呕吐有效
- D: 可作为术后预防呕吐的常规用药

答案：A

65. 下述质子泵抑制剂中对氯吡格雷疗效影响最小的是()

- A: 泮托拉唑
- B: 埃索美拉唑
- C: 奥美拉唑
- D: 兰索拉唑

答案：A

66. (2016 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是

- A: 碱性磷酸酶
- B: 肌酸激酶
- C: 乳酸脱氢酶
- D: 尿淀粉酶

答案：B

67. 甲氧苄啶与磺胺合用是因为

- A: 减少泌尿道损害
- B: 相互对抗不良反应
- C: 双重阻断细菌的叶酸代谢
- D: 抗菌谱相似

答案：C

68. 治疗癫痫持续状态可首选

- A: 硫酸镁
- B: 地西泮
- C: 卡马西平
- D: 氯丙嗪

答案：B

69. 主要作用于有丝分裂 M 期，干扰微管蛋白合成的药物是

- A: 顺铂
- B: 氟尿嘧啶
- C: 高三尖杉酯碱
- D: 多柔比星

答案：C

70. (2018 年真题) 关于莫西沙星作用特点的说法, 错误的是 ()

- A: 莫西沙星抗菌谱广, 对常见革兰阴性及革兰阳性菌均具有良好抗菌活性
- B: 莫西沙星属于浓度依赖型抗菌药物
- C: 莫西沙星可经验性用于社区获得性肺炎的治疗
- D: 莫西沙星组织分布广泛, 但不能透过血脑屏障

答案：D

71. 罗格列酮的降糖作用机制是

- A: 直接补充胰岛素
- B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- C: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶
- D: 提高靶组织对胰岛素的敏感性

答案：D

72. 属于靶向抗肿瘤药物的是

- A: 吉非替尼
- B: 紫杉醇
- C: 多柔比星
- D: 昂丹司琼

答案：A

73. （2016 年真题）对杆菌属类厌氧菌敏感，属于头霉素

- A: 头孢美唑
- B: 头孢吡肟
- C: 亚胺培南
- D: 氨曲南

答案：A

74. 下述不属于抗血小板类药物的是

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: 二磷酸腺苷 $P2Y_{12}$ 受体激动剂
- C: 非特异性纤溶酶原激活剂
- D: 血栓素 A_2 (TXA_2) 抑制剂

答案：C

75. 心律失常发生的机制是

- A: 心肌兴奋冲动形成异常或传导异常
- B: 潜在起搏点搏动频率加快
- C: 心肌兴奋过度导致异常
- D: 心肌兴奋过度导致窦房结搏动异常

答案：A

76. 急性广泛性肺栓塞宜选用()

- A: 肝素
- B: 叶酸
- C: 维生素 K
- D: 尿激酶

答案：D

77. 用于治疗鼓膜未穿孔的急性中耳炎、外耳道炎的药品是()。

- A: 高锰酸钾溶液
- B: 酚甘油滴耳液
- C: 过氧乙酸溶液
- D: 苯酚溶液

答案：B

78. 脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是()。

- A: 阿普唑仑
- B: 地西泮
- C: 佐匹克隆
- D: 异戊巴比妥

答案：D

79. 属于环氧酶抑制剂的是

- A: 乙酰唑胺
- B: 双嘧达莫
- C: 替格瑞洛
- D: 阿司匹林

答案：D

80. 用于治疗疥疮的药物有()

- A: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏
- B: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏
- C: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比泰芬软膏
- D: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏

答案：B

81. 毛果芸香碱的作用特点不包括

- A: 用于白内障人工晶状体植入手术中缩瞳
- B: 术后以抵消睫状肌麻痹剂或散瞳药的作用
- C: 收防止激光手术后的反应性眼压升高
- D: 减少房水生成

答案：D

82. 日晒时有光敏现象的药品是

- A: 多西环素
- B: 庆大霉素
- C: 加替沙星
- D: 头孢哌酮

答案：A

83. 关于地高辛作用特点的说法，正确的是

- A: 地高辛静脉注射后作用持续时间为 2-3h
- B: 地高辛不经细胞色素 P450 酶代谢，以原型药物从肾脏排泄
- C: 地高辛通过激动 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶增强心肌收缩力
- D: 地高辛口服生物利用度小于 50%

答案：B

84. 患者，女，63 岁。急性心肌梗死行经皮冠状动脉介入（PCI）治疗，术后为预防支架内血栓形成，常与阿司匹林联合使用的药物是

- A: 双氯芬酸
- B: 氯吡格雷
- C: 奥美拉唑
- D: 华法林

答案：B

85. 洋地黄的主要适应证不包括()

- A: 心房扑动
- B: 阵发性室上性心动过速
- C: 急、慢性充血性心力衰竭
- D: 房室传导阻滞

答案：D

86. 属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是()

- A: 拉坦前列素
- B: 毛果芸香碱

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 塞吗洛尔

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/418021072122007022>