动脉夹层护理查房



目录

- 动脉夹层概述
- 动脉夹层护理常规
- 动脉夹层并发症的预防与处理
- 动脉夹层患者健康教育
- 动脉夹层护理研究进展

contents


01


动脉夹层概述

CHAPTER



定义与分类







定义

动脉夹层是指由于各种原因引起的动脉内膜和中膜撕裂，血液进入动脉壁，形成真假两腔的现象。

分类

根据夹层累及的部位和范围，可分为胸主动脉夹层、腹主动脉夹层和四肢动脉夹层等。


病因与发病机制

病因

高血压、动脉粥样硬化、遗传因素、外伤等均可导致动脉夹层的形成。

发病机制

高血压和动脉粥样硬化是导致动脉夹层的主要原因，它们可引起动脉壁弹力纤维断裂和内膜受损，从而引发夹层形成。




临床表现与诊断

临床表现

疼痛是动脉夹层最常见的症状，常表现为剧烈的撕裂样疼痛，可伴有面色苍白、出汗、恶心、呕吐等症状。根据夹层累及的部位不同，还可出现相应器官缺血的表现，如肢体麻木、乏力、呼吸困难等。

诊断

通过体格检查、实验室检查和影像学检查可确诊动脉夹层。其中，超声心动图、CT血管成像和磁共振血管成像是最常用的影像学检查方法。



02

动脉夹层护理常规

CHAPTER



一般护理



01

保持病室安静，减少探视，保证患者充足的休息。



02

协助患者采取舒适体位，避免剧烈咳嗽、打喷嚏、用力排便等增加腹压的因素。



03

评估患者的营养状况，指导患者进食富含蛋白质、维生素和纤维素的食物。



04

做好患者的口腔、皮肤护理，保持清洁卫生。

病情观察与评估



01

监测患者的生命体征，特别是血压和心率的变化。




02

注意观察患者疼痛的部位、性质、程度及持续时间，及时记录并报告医生。



03

评估患者的认知情况，观察是否有意识障碍、肢体瘫痪等症状。



04

观察患者是否有出血征象，如呕血、便血、皮下出血等。

护理操作规范

遵医嘱给予药物治疗，确保药物准确、及时地输入患者体内。





协助医生进行各项检查，如心电图、超声心动图、CT等，并做好检查前后的护理工作。

指导患者正确使用降压药、止痛药等，确保药物疗效的发挥。





对患者的病情状况和自身认知情况进行了解，向患者及家属提供相应的健康教育。

03

动脉夹层并发症的预防与处理

CHAPTER



出血的预防与处理



总结词

及时发现、有效止血

详细描述

动脉夹层可能导致内出血，严重时可危及生命。护理人员需密切观察患者情况，如发现出血症状，应立即采取止血措施，如加压包扎、冰敷等，并迅速通知医生进行紧急处理。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/418077045065006044