

2024 年四川省炉霍县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库含答案（轻巧夺冠）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 肌酸激酶超过正常值可

- A: 诊断痛风
- B: 诊断心肌梗死
- C: 诊断贫血
- D: 诊断黄疸

答案：B

2. 血液净化疗法可使重症毒物中毒者愈后大为改观，血液净化的方法不包括

- A: 血液滤过
- B: 腹膜透析
- C: 血液透析
- D: 血液置换

答案：D

3. 血红蛋白检查结果低于正常值即提示贫血。下列检测值可提示“极重度贫血”的是

- A: 60~90g/L
- B: <30g / L
- C: 30~60g/L
- D: >90g / L

答案：B

4. 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是()

- A: 硫普罗宁片
- B: 乳酶生片
- C: 双歧三联活菌胶囊
- D: 西地碘片

答案：C

5. 肾或膀胱结石

- A: 酪氨酸和亮氨酸结晶
- B: 尿酸盐结晶
- C: 磷酸盐结晶
- D: 草酸盐结晶

答案：D

6. 肿瘤患者在化疗后出现焦虑，可对症给予

- A: 劳拉西泮
- B: 吗啡
- C: 苯海拉明—利多卡因—氢氧化镁铝
- D: 醋酸甲地孕酮—地塞米松

答案：A

7. 患者，男，26岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

- A: 氯苯那敏

- B: 伪麻黄碱
- C: 右美沙芬
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

8. (2019 年真题) 患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体：体温 39.1℃，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 多西环素
- B: 阿莫西林克拉维酸钾+阿奇霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 左氧氟沙星+阿奇霉素

答案：B

9. 根除幽门螺杆菌治疗的首选抗菌药是

- A: 阿莫西林
- B: 呋喃唑酮
- C: 左氧氟沙星
- D: 四环素

答案：A

10. 可能诱发心脑血管病，引起肝癌、肾癌的是查看材料

- A: 药品类易制毒化学品
- B: 蛋白同化激素
- C: 精神刺激剂
- D: 肽类激素

答案：B

11. 患者,男,80岁,因发热、咳嗽、咳痰2天就诊诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素C等治疗。患者用药3天后出现失眠、烦躁不安等症状最可能引起该症状的药物是()

- A: 左氧氟沙星
- B: 氨溴索
- C: 甘草合剂
- D: 对乙酰氨基酚

答案：A

12. 在治疗口腔溃疡的药品中,可能致使儿童和青年偶发口腔无痛性浅表脱屑损害的是

- A: 甲硝唑粘贴片
- B: 西地碘含片
- C: 氯己定含漱剂
- D: 左旋咪唑

答案：C

13. 以下药物中,妊娠妇女使用可能引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

- A: 沙立度胺
- B: 辛伐他汀
- C: 甲氨蝶呤
- D: 苯妥英钠

答案：A

14. 肾功能重度损害时,抗菌药每日剂量分别减低至正常剂量的

- A: $1/2 \sim 1/5$
- B: $1/5 \sim 1/10$
- C: $1/10 \sim 1/15$
- D: $2/3 \sim 1/2$

答案：B

15. 属于新型抗凝药物的是

- A: 氯吡格雷
- B: 胺碘酮
- C: 美托洛尔
- D: 达比加群酯

答案：D

16. 在检查尿沉渣的项目中，最能提示是肾实质性病变的证据是

- A: 尿沉渣白细胞
- B: 尿沉渣磷酸盐结晶
- C: 尿沉渣结晶
- D: 尿沉渣管型

答案：D

17. 滥用人血白蛋白及肿瘤辅助治疗药，应评判为

- A: 过度治疗用药
- B: 无适应证用药
- C: 联合用药不适宜
- D: 有禁忌证用药

答案：A

18. 老年人应用下列药物可引起何种不良反应，利尿药如氢氯噻嗪等可导致

- A: 室性期前收缩、房室传导阻滞及低钾血症
- B: 青光眼，甚至致盲
- C: 嗜睡及头晕
- D: 脱水、低钾血症

答案：D

19. 可供口服或黏膜外用的制剂

- A: 膜剂
- B: 泡腾片剂
- C: 透皮贴剂
- D: 滴丸剂

答案：A

20. 具有多种作用，可用于角膜软化、夜盲症的是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 A
- C: 维生素 D
- D: 维生素 B1

答案：B

21. 对肾功能不全患者的给药方案调整，说法正确的是

- A: 可采用减量法给药，即每次剂量减少而用药间隔不变，但该法的血药浓度波动幅度较大
- B: 尽可能选用经肝消除的药物，肝毒性大的药物不必减量
- C: 可采用延长给药间隔法，即每次给药剂量不变而用药间隔延长，但该方法很难达到有效血药浓度

D: 必须使用具有明显肾毒性药物时，宜进行血药浓度监测，实行个体化给药

答案：D

22. 下列药物中，能解救含亚硝酸盐的食物中毒的是

A: 亚甲蓝

B: 维生素 B6

C: 普萘洛尔

D: 维生素 K1

答案：A

23. (2018 年真题) 患者,女,45 岁,6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁,在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗,症状控制较好,近 3 个月服用西咪替丁,患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱,该患者各地求医,服用各种药物,具体药物品种不详。围绕该病例,医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

A: 有条件的应测定药物血液浓度

B: 遵从联合治疗原则

C: 定期监测肝功能

D: 长期规律用药

答案：B

24. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

A: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

B: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎

C: 氯霉素在新生儿体内蓄积可导致灰婴综合征

D: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

答案: D

25. 可能影响儿童骨骼发育的药物是

A: 头孢克洛

B: 华法林

C: 阿莫西林

D: 诺氟沙星

答案: D

26. 用于中度疼痛和癌性疼痛宜选用的药物是

A: 可待因

B: 阿司匹林

C: 多奈哌齐

D: 吗啡

答案: A

27. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响, 氯喹

A: 导致新生儿血钙过高

B: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍

C: 可能致胎儿畸形

D: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

答案: B

28. 结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论属于

A: B 级

B: D 级

C: E 级

D: C 级

答案: A

29. 对巨幼细胞贫血者应选用 ()

A: 维生素 K1

B: 叶酸+维生素 B12

C: 富马酸亚铁

D: 甲磺酸去铁胺

答案: B

30. 可引起视力模糊的是

A: 阿米洛利

B: 右美沙芬

C: 东莨菪碱

D: 抗过敏药

答案: C

31. 可在一定程度上准确反映肾小球滤过功能损害程度的是

A: 肌酐

B: 胆固醇

C: 尿素氮

D: 淀粉酶

答案: A

32. 下列分析方法中,不属于药物经济学评价方法的是()

A: 成本-效益分析法

B: 成本-效应分析法

C: 成本一效用分析法

D: 最小成本分析法

答案: B

33. 连续使用不应超过 10 日，并在使用期间定期测量眼压的滴眼液是

A: 泼尼松滴眼液

B: 硫酸锌滴眼液

C: 磺胺醋酰钠滴眼液

D: 阿昔洛韦滴眼液

答案: A

34. 可出现认知功能受损、谵妄、跌倒的是

A: 苯二氮

B: 甲氧氯普胺

C: 哌替啶

D: 双嘧达莫

答案: A

35. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别头孢曲松属于药物妊娠毒性分级

A: D 级

B: B 级

C: C 级

D: A 级

答案: B

36. 鼻腔黏膜上有丰富的血管、黏液腺的纤毛，鼻中隔前下部也有纤密的毛细血管网，当受到刺激、过敏、感染时，鼻黏膜血管迅速扩张和肿胀，出现鼻塞。其常见病因有：感冒、慢性单纯性鼻炎、慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎等。

- A: 金刚烷胺
- B: 伪麻黄碱
- C: 天麻素
- D: 双氯芬酸

答案：B

37. 患者，女，23 岁，正在服用短效复方口服避孕药，但避孕失败，怀疑与服用的其他药物有关，可能造成这种结果的药物是

- A: 胺碘酮
- B: 克拉霉素
- C: 伊曲康唑
- D: 卡马西平

答案：D

38. 以健康受试者进行初步的临床药理学及人体安全性评价是指

- A: II 期临床试验
- B: 临床预试验
- C: III 期临床试验
- D: I 期临床试验

答案：D

39. 患者，女，56 岁，诊断为高血压伴快速型心律失常，首选的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 维拉帕米

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 氯沙坦

D: 螺内酯

答案：A

40. 易造成人体严重脱水、肾衰竭

- A: 精神刺激剂
- B: 蛋白同化激素
- C: β -受体阻断剂
- D: 利尿剂

答案：D

41. 除胰岛素分泌过多外，主要引起血糖低于正常参考区间低限的疾患是

- A: 颅内压增高、颅脑外伤
- B: 激素分泌功能衰退
- C: 激素分泌功能亢进
- D: 肝功能亢进

答案：B

42. (2017 年真题) 配制青霉素输液的适宜溶媒是 ()

- A: 低分子右旋糖酐注射液
- B: 复方氯化钠注射液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 0.9%氯化钠注射液

答案：D

43. 缓解视疲劳可选用的药物是 ()

- A: 色甘酸钠滴眼液
- B: 氧氟沙星滴眼液
- C: 羟甲基纤维素钠滴眼液

D: 酞丁安滴眼液

答案：C

44. 应报告药品引起的严重、罕见或新的不良反应的是

A: 上市 5 年以内的药品

B: 上市 3 年以内的药品

C: 上市 5 年以上的药品

D: 国家重点监测的药品

答案：C

45. 患者，女，24 岁，患有缺铁性贫血并伴有慢性腹泻，实验室检查：Hb55g / L，血清铁 12 μ g / L，首选的治疗方案是（）

A: 口服铁剂及维生素 C

B: 静脉滴注铁剂

C: 雄性激素治疗

D: 注射维生素 B12

答案：B

46. 在中国，具有"规范处方行为和指导合理用药的法规性和专业性文件"属性的药物专著是

A: 新编药理学

B: 中国国家处方集

C: 国家基本药物处方集

D: 中国药学文摘

答案：B

47. 化学刺激引起消化道黏膜损伤造成的腹泻宜选用的药物是

A: 双八面体蒙脱石散

B: 胰酶

C: 双歧三联活菌制剂

D: 山莨菪碱

答案: A

48. 属于胆固醇吸收抑制剂的药物是

A: 非诺贝特

B: 甲基多巴

C: 辛伐他汀

D: 依折麦布

答案: D

49. 对局部发生水疱和糜烂者可选用

A: 赛庚啶

B: 10%氧化锌软膏

C: 10%樟脑软膏

D: 溃疡膏

答案: B

50. 下列药物中，适用于急迫性尿失禁的药物为

A: 奥昔布宁

B: 米多君

C: 非那雄胺

D: 哌唑嗪

答案: A

51. 每 1 疗程期间应停药 3 天的是

A: 别嘌醇

B: 苯溴马隆

C: 泼尼松

D: 秋水仙碱

答案：D

52. 脂质体药物属于

A: E 级高危药品

B: B 级高危药品

C: D 级高危药品

D: C 级高危药品

答案：D

53. 属于选择性雌激素调节因子类药物的是

A: 雷洛昔芬

B: 阿法骨化醇

C: 乳酸钙

D: 阿仑膦酸钠

答案：A

54. “根据用药顺序确定最可疑的致病药物，然后有意识地停用最可疑或引起相互作用的药物。根据停药后症状的变化情况以确诊”，即可诊断药源性疾病

A: 致病药物的确定

B: 询问用药过敏史和家族史

C: 排除药物以外的因素

D: 流行病学的调查

答案：A

55. 患者，女，72 岁，因为呼吸困难，心悸、乏力入院。查体：心率 32 次/分，心脏扩大，肝-颈静脉回流征阳性，肝脏肿大，双下肢对称性肿大。既往有心肌梗死及血管神经性水肿病史。实验室检查：血肌酐 200 $\mu\text{mol/l}$ ，血钾 2.5 $\mu\text{mol/l}$

- A: 伊伐布雷定
- B: 卡托普利
- C: 地高辛
- D: 美托洛尔

答案：C

56. 患者，女，45 岁，既往有心律失常(Q-T 间期延长)、低钾血症病史。近日因发热、咳嗽、咳痰就诊，诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 头孢呋辛酯
- C: 莫西沙星
- D: 氨溴索

答案：C

57. 不宜与葡萄柚汁合用的药物是

- A: 辛伐他汀
- B: 硫酸亚铁
- C: 磺胺类药物
- D: 左旋多巴

答案：A

58. 患者，男，67 岁，患带状疱疹，皮疹愈合后出现持续 1 个月左右疼痛，可给予的止痛药物是

- A: 布洛芬
- B: 加巴喷丁
- C: 吗啡
- D: 山莨菪碱

答案：B

59. 饮食不规律者、多数孕妇、老年人和儿童可适当选服

- A: 钙剂
- B: 复合营养素
- C: 复合维生素
- D: 中草药制剂

答案：C

60. 患者，男，50岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 氯吡格雷片
- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 双嘧达膜片
- D: 华法林片

答案：A

61. 有一肺炎球菌感染患者，对青霉素过敏，宜选用的有效抗菌药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 阿莫西林
- C: 阿米卡星
- D: 多西环素

答案：A

62. 在医生的指导下使用已证明对胚胎与胎儿无害的药物，即

- A: 选用对胎儿危害较小的药物
- B: 可用可不用的药物应尽量不用或少用
- C: 用药必须有明确的指征和适应证
- D: 禁止用试验性药

答案：C

63. 患者，男性，30 岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

- A: 酮替酚
- B: 异丙托溴铵气雾剂
- C: 特布他林气雾剂
- D: 二丙酸倍氯米松气雾剂

答案：D

64. （2019 年真题）患者，男，60 岁，诊断为高血压伴高尿酸血症，首选的药物是

- A: 螺内酯
- B: 维拉帕米
- C: 美托洛尔
- D: 氯沙坦

答案：D

65. 氯霉素的禁用范围是

- A: 新生儿
- B: 1 岁以下婴儿
- C: 3 岁以下幼儿

D: 婴幼儿

答案：A

66. (2016 年真题) 患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”，“慌张步态”及“小字症”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是（）。

A: 左旋多巴

B: 多奈哌齐

C: 普拉克索

D: 司来吉兰

答案：A

67. 在血液透析患者中每次给予元素铁

A: 60mgqd

B: 100mg/次

C: 60mg tid

D: 60mg bid

答案：B

68. (2018 年真题) 患者，男，53 岁，因纳差、食欲减退来药店购药，药师应推荐的药品是（）

A: 乳酶生片

B: 多潘立酮片

C: 酵母片

D: 甲氧氯普胺片

答案：C

69. 药师应告知医师“血药浓度监测是安全实施该治疗的重要措施”的事例是

- A: 地高辛用于肾功不全患者
- B: 阿昔洛韦可致急性肾衰竭
- C: 利巴韦林可致畸与肿瘤
- D: 替加色罗存在心绞痛风险

答案：A

70. (2016 年真题) 患者，男，58 岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀 40mgqd，患者用药期间应定期监测的生化指标是 ()。

- A: RBC
- B: BUN
- C: Hb
- D: ALT

答案：D

71. IV 期临床试验样本数为

- A: 20~30 例
- B: 100~300 例
- C: 常见病 $\geq$ 2000 例
- D: 常见病 $\geq$ 1000 例

答案：C

72. 静脉注射两性霉素 B 的适宜溶媒是

- A: 复方氨基酸注射液
- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 0.9%氯化钠注射液

答案：B

73. 非那雄胺用于治疗充盈性尿失禁、前列腺增生症，其主要不良反应是

- A: Q-T 间期延长
- B: 体位性低血压
- C: 眼内压升高
- D: 性功能减退、乳房增大

答案：D

74. 不宜用热水送服的药物是

- A: 双膦酸盐
- B: 整肠生
- C: 去氢胆酸
- D: 氨茶碱

答案：B

75. (处方缩写) 餐后的缩写为

- A: pc
- B: iv
- C: q4h
- D: qid

答案：A

76. 处方审核是处方调配中的重要环节，药师应确定处方内容正确无误后，方可进行药品调配。处方审核结果分为合理处方和不合理处方。不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。

- A: 未使用药品规范名称

- B: 有配伍禁忌
- C: 无适应证用药
- D: 用法、用量或联合用药不适宜

答案：A

77. 原料血浆包装、贮存、运输的温度应控制在

- A: -10℃以下。
- B: -20℃以下
- C: -15℃以下
- D: -4℃以下

答案：B

78. 患者，男，27岁，电话咨询药师朋友，告知目前正在欧洲旅游，从昨夜开始出现腹泻，呈水样便，起夜4次，希望药师给出建议。有关药师给予该患者的建议，错误的是

- A: 口服左氧氟沙星胶囊 0.2gtid
- B: 口服双八面体蒙脱石散，与抗菌药物同服
- C: 避免高脂肪、高糖饮食
- D: 口服补液盐 ORSIII 50ml/kg，4~6h 内服完

答案：B

79. 以下治疗荨麻疹的抗过敏药中，属于过敏活性物质阻释剂的药物是

- A: 赛庚啶
- B: 异丙嗪
- C: 酮替芬
- D: 苯海拉明

答案：C

80. (2015 年真题) 患者，男，28 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病。可首选的抗菌药物是 ()。

- A: 头孢拉定
- B: 阿米卡星
- C: 头孢哌酮舒巴坦
- D: 亚胺培南西司他丁

答案：A

81. 蒽环类抗肿瘤药可引起

- A: 溶血性尿毒症
- B: 出血性膀胱炎
- C: 心脏毒性
- D: 末梢神经炎

答案：C

82. 由于刺激食管和影响水、电解质代谢平衡，服用后需要大量饮水的是

- A: 氨茶碱
- B: 依替膦酸二钠
- C: 莫西沙星
- D: 苯溴马隆

答案：B

83. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R30 次 / 分，P108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 慢性支气管炎急性发作
- B: 急性左心衰竭
- C: 肺动脉栓塞
- D: 支气管哮喘

答案：B

84. 结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论属于 () 分级。

- A: B 级
- B: D 级
- C: A 级
- D: C 级

答案：A

85. 血小板计数正常值范围是 (/ L)

- A: $(50 \sim 100) \times 10^9$
- B: $(200 \sim 250) \times 10^{12}$
- C: $(150 \sim 200) \times 10^{12}$
- D: $(100 \sim 300) \times 10^9$

答案：D

86. 氟胞嘧啶属于

- A: 抗病毒药
- B: 抗肿瘤药
- C: 抗真菌药
- D: 抗过敏药

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/425113123314012033>