

2024 年河南省川汇区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题王牌题库（精练）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2018 年真题）可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴性杆菌感染的药物是（ ）

- A: 头孢他啶
- B: 头孢呋辛
- C: 头孢米诺
- D: 头孢唑林

答案：C

2. 引起睫状肌麻痹，适用于青少年屈光检查，尤其适用于 5 岁以下儿童的药物是

- A: 羟苄唑
- B: 阿托品
- C: 20%甘露醇
- D: 奥布卡因

答案：B

3. 为了防止动脉硬化，经药物治疗后，适当增加浓度对人体有益成分的是

- A: HDL
- B: LDL
- C: IDL

D: VLDL

答案：A

4. 不易发生“双硫仑样”反应的药物是()

A: 头孢曲松

B: 头孢替安

C: 头孢哌酮

D: 头孢他啶

答案：D

5. 长春新碱

A: 干扰 RNA 转录

B: 影响蛋白质合成和功能

C: 干扰核酸生物合成

D: 直接破坏 DNA 结构和功能

答案：B

6. 是 β -内酰胺酶抑制剂，常与青霉素组成复方制剂的是()

A: 美罗培南

B: 氨曲南

C: 克拉维酸

D: 他唑巴坦

答案：C

7. 属于延长动作电位时程的抗心律失常药是()

A: 利多卡因

B: 胺碘酮

C: 维拉帕米

D: 普鲁卡因胺

答案: B

8. 不属于浓度依赖性抗菌药物的是

A: 氟喹诺酮类

B: 达托霉素

C: 氨基糖苷类

D: 阿奇霉素

答案: D

9. 下述药物中长期使用易产生耐受性的是()

A: 白三烯受体阻断药

B: M 受体拮抗剂

C: β

D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案: C

10. 螺内酯利尿的作用机制是

A: 抑制 Na^+ , K^+ - 2Cl^- 转运系统

B: 抑制碳酸酐酶

C: 拮抗醛固酮

D: 抑制 Na^+ , K^+ - 2Cl^- 同向转运系统

答案: C

11. 既能抗室性心律失常，又能抗癫痫的药物

A: 胺碘酮

B: 地高辛

C: 苯妥英钠

D: 利多卡因

答案：C

12. 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内,宜使用的口服紧急避孕药是 ()

A: 左炔诺孕酮 (1

B: 炔雌醇去氧孕烯 (30g/150g)

C: 十一酸睾酮 (40mg)

D: 复方醋酸环丙孕酮 (35 μ g/2mg)

答案：A

13. 分泌盐皮质激素的是

A: 束状带和网状带

B: 束状带

C: 球状带

D: 网状带

答案：C

14. 属于 $\alpha 1$ 受体阻断药,用于治疗良性前列腺增生症的是 ()

A: 西地那非

B: 坦洛新

C: 他达拉非

D: 度他雄胺

答案：B

15. (2017 年真题) 不属于糖皮质激素的适应症是 ()

A: 系统性红斑狼疮

B: 再障

C: 风湿

D: 活动性肺结核

答案: D

16. 有关阿莫西林特点的说法正确的是()

A: 对耐药金黄色葡萄球菌有效

B: 耐酸、耐酶

C: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效

D: 口服吸收差，生物利用度小

答案: C

17. 治疗各种类型的癫痫选用

A: 布桂嗪

B: 多奈哌齐

C: 丙戊酸钠

D: 佐匹克隆

答案: C

18. 大量用药可致球后视神经炎的药物是

A: 乙胺丁醇

B: 异烟肼

C: 红霉素

D: 吡嗪酰胺

答案: A

19. 与克拉霉素和兰索拉唑联合治疗幽门螺杆菌感染的药物是

A: 大观霉素

B: 庆大霉素

C: 羟氨苄青霉素

D: 替考拉宁

答案：C

20. 属于芳基乙酸类的是

A: 吲哚关辛

B: 阿司匹林

C: 对乙酰氨基酚

D: 塞来昔布

答案：A

21. 以下给药途径不能使用氟尿嘧啶的是

A: 动脉插管注药

B: 静脉注射

C: 静脉滴注

D: 鞘内注射

答案：D

22. 氯霉素的下述不良反应中，哪项是与剂量和疗程无关的严重反应

A: 灰婴综合征

B: 可逆的各类血细胞减少

C: 不可逆的再生障碍性贫血

D: 二重感染

答案：C

23. 属于抗孕激素药，用于终止早孕的是

A: 甲地孕酮

B: 黄体酮

C: 米非司酮

D: 左炔诺孕酮

答案: C

24. 患者，男，29 岁。因反酸、烧心、胸骨后隐痛 1 个月余就诊。胃镜检查提示，反流性食管炎。最适用于该患者的药物是

A: 奥美拉唑

B: 西咪替丁

C: 尼扎替丁

D: 雷尼替丁

答案: A

25. 可拮抗维生素 B

A: 异烟肼

B: 雌激素

C: 糖皮质激素

D: 丙磺舒

答案: A

26. 原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血可选用

A: 低分子肝素

B: 维生素 K

C: 氨甲环酸

D: 尿激酶

答案: C

27. 可用于治疗青光眼的是

A: 毛果芸香碱

- B: 哌替啶
- C: 新斯的明
- D: 阿托品

答案：A

28. 可发生双硫仑样反应的是

- A: 替硝唑+华法林
- B: 奥硝唑+乙醇
- C: 甲硝唑+乙醇
- D: 替硝唑+苯巴比妥

答案：C

29. 别嘌醇抗痛风的作用机制是

- A: 抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加
- B: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸
- C: 可促进尿酸分解，将尿酸转化为一种溶解性更好的尿囊素
- D: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化

答案：B

30. 使用某些头孢菌素或其他药物期间，饮酒可能引起“双硫仑样”反应，临床常见的表现不包括

- A: 头痛、胸闷、气急、出汗
- B: 血压升高或降低、心率加快
- C: 发热、血管扩张、面色潮红
- D: 喉头水肿、尿潴留

答案：D

31. 以下哪项不属于硝酸酯类药物的使用禁忌证()

- A: 梗阻性肥厚型心肌病
- B: 急性前壁心肌梗死
- C: 重度主动脉瓣和二尖瓣狭窄
- D: 收缩压<90mmHg 的严重低血压

答案：B

32. 可诱发哮喘且变异型心绞痛不宜选用的药物是

- A: 洛伐他汀
- B: 硝酸甘油
- C: 硝苯地平
- D: 普萘洛尔

答案：D

33. 过量引起严重心脏毒性的是

- A: 地高辛
- B: 氨氯地平
- C: 哌唑嗪
- D: 卡托普利

答案：A

34. 常作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌作用的药物是()

- A: 他唑巴坦
- B: 克拉维酸
- C: 氨曲南
- D: 美罗培南

答案：C

35. 选择性直接作用于 M 胆碱受体，引起缩瞳，眼压下降，并有调节痉挛等作用的是

- A: 拟胆碱药
- B: 前列腺素衍生物
- C: α_2 受体激动剂
- D: 碳酸酐酶抑制剂

答案：A

36. 抗真菌药与糖皮质激素合用于皮肤病，感染症状消失后，应

- A: 再持续使用 1 个月
- B: 立即停药，不得再用
- C: 再持续 1~2 周
- D: 再持续使用 48h

答案：C

37. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向可选用

- A: 氨甲环酸
- B: 维生素 K1
- C: 低分子肝素
- D: 尿激酶

答案：B

38. 眼底检查时的快速短效扩瞳药

- A: 异丙肾上腺素
- B: 去甲肾上腺素
- C: 去氧肾上腺素
- D: 多巴胺

答案：C

39. 监测他汀类药所致肌毒性的临床指标的是

- A: 乳酸脱氢酶
- B: 肌酸激酶
- C: 尿淀粉酶
- D: 碱性磷酸酶

答案：B

40. 抑制微管聚合，阻碍纺锤体的形成

- A: 紫杉醇
- B: 他莫昔芬
- C: 羟喜树碱
- D: 长春碱

答案：D

41. 减少胃肠道对氢氯噻嗪的吸收，应在口服该药 1 小时前或 4 小时后服用氢氯噻嗪，该药是

- A: 考来烯胺
- B: 拟交感药
- C: 多巴胺
- D: 胺碘酮

答案：A

42. 可用于各种类型癫痫的药物是

- A: 丙戊酸钠
- B: 保泰松
- C: 阿司匹林
- D: 乙琥胺

答案：A

43.（2020 年真题）消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 吲哚美辛
- D: 塞来昔布

答案：D

44. 胰岛素对代谢的作用，叙述错误的是()

- A: 减少酮体生成
- B: 促进糖原合成
- C: 抑制脂肪合成
- D: 抑制糖原分解

答案：C

45. 属于贝丁酸类调节血脂药的是

- A: 非诺贝特
- B: 阿昔莫司
- C: 依折麦布
- D: 阿托伐他汀

答案：A

46.（2018 年真题）过度使用，会导致大量的中间代谢产物 N-乙酰对苯醌亚胺堆积，引起严重肝毒性的药物是（）

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 双氯芬酸

C: 塞来昔布

D: 阿司匹林

答案: A

47. 下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

A: 属于抗动力药

B: 不被胃肠道吸收，不进入血液循环

C: 可用于治疗儿童的急、慢性腹泻

D: 具有吸附、收敛的作用

答案: A

48. 下述不属于抗血小板类药物的是

A: 整合素受体阻断剂

B: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体激动剂

C: 磷酸二酯酶抑制剂

D: 环氧酶抑制剂

答案: B

49. 雄激素可降低的体内物质是

A: 乳酸脱氢酶 (LDH)

B: 低密度脂蛋白 (LDL)

C: 高密度脂蛋白 (HDL)

D: 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)

答案: C

50. 利尿作用极弱，具有降低眼压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

A: 螺内酯

B: 乙酰唑胺

C: 呋塞米

D: 氢氯噻嗪

答案: B

51. 制成脂质体以降低药物肾毒性的抗真菌药是

A: 两性霉素

B: 阿糖胞苷

C: 卡泊芬净

D: 氟胞嘧啶

答案: A

52. 治疗危重深部真菌感染的唯一有效药是()

A: 克林霉素

B: 两性霉素 B

C: 氯霉素

D: 青霉素

答案: B

53. 糖皮质激素诱发或加重感染的主要原因是()

A: 患者对激素不敏感，未反映出相应的疗效

B: 抑制机体的免疫功能

C: 激素用量不足，无法控制症状

D: 激素促使许多病原微生物繁殖

答案: B

54. 羟甲唑啉滴鼻剂使用期间，可能发生的不良反应是

A: 血压下降

B: 鼻衄

C: 流量

D: 心率加快

答案: D

55. 30 岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L。诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

A: 驱钩虫

B: 输血+注射右旋糖苷铁

C: 驱钩虫+注射右旋糖苷铁

D: 驱钩虫+口服铁剂

答案: D

56. 促进微管的装配，抑制其解聚

A: 他莫昔芬

B: 长春碱

C: 羟喜树碱

D: 紫杉醇

答案: D

57. 静脉溶栓首选的药物是

A: 重组人促红素

B: 阿替普酶

C: 维生素 K

D: 达比加群酯

答案: B

58. 功能性子宫出血可选用的药物是()

A: 司坦唑醇

B: 米非司酮

C: 他莫昔芬

D: 雌二醇

答案：D

59. 头孢曲松

A: 肾毒性较大

B: 用于非典型病原体感染

C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：C

60. 通过抑制胆碱酯酶活性，提高脑内乙酰胆碱含量的药物是

A: 舍曲林

B: 多奈哌齐

C: 阿尼西坦

D: 艾地苯醌

答案：B

61. 肥胖性 2 型糖尿病患者控制血糖的一线药物是

A: 格列吡嗪

B: 二甲双胍

C: 格列齐特

D: 格列本脲

答案：B

62. 需停 5 周才能换用单胺氧化酶抑制剂的药物是

A: 文拉法辛

B: 吡拉西坦

C: 氟西汀

D: 吗氯贝胺

答案: C

63. 对铜绿假单胞菌感染无效的抗生素是

A: 头孢克洛

B: 头孢曲松

C: 头孢噻肟

D: 头孢他啶

答案: A

64. (2021 年真题) 属于短效避孕药，但其埋植剂可作为长效避孕药使用的药物是 ()

A: 左炔诺孕酮

B: 去氧孕烯

C: 氯地孕酮

D: 孕二烯酮

答案: A

65. 主要以原型经肾脏排泄，终末消除相的时间较长，滴注后 2~28 日内在血浆中仍保持较低浓度，终末消除半衰期为 146 小时的是

A: 唑来膦酸

B: 依替膦酸二钠

C: 帕米膦酸二钠

D: 阿仑膦酸钠

答案: A

66. 用量过大可引起低血糖反应的药物是

- A: 胰岛素
- B: 甲状腺素
- C: 依替膦酸二钠
- D: 糖皮质激素

答案：A

67. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC 3.0×10^{12} / L，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 进食促进铁剂的吸收
- B: 维生素 C 与本品同服，有利于吸收
- C: 服用铁剂时可以喝果汁，但不能喝牛奶
- D: 口服型铁剂服用时间还根据个体反应而定

答案：A

68. 临床常用的巨幼红细胞性贫血治疗药物是

- A: 维生素 B12
- B: 维生素 K
- C: 肝素
- D: 香豆素类

答案：A

69. （2015 年真题）应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是（ ）。

- A: 表皮生长因子受体
- B: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原

C: 人表皮生长因子受体-2

D: 血管内皮生长因子

答案: C

70. 慢性充血性心力衰竭宜

A: 停用洋地黄

B: 常规剂量的洋地黄

C: 不宜使用洋地黄

D: 快速洋地黄化

答案: B

71. 对择期手术者，且无需抗血小板治疗者，应于术前多久考虑停用抗血小板药、抗凝血药

A: 3 天

B: 1 周

C: 1 天

D: 5 天

答案: B

72. 我国常用避孕药不包括

A: 探亲避孕药

B: 紧急避孕药

C: 超短效避孕药

D: 短效避孕药

答案: C

73. 吡喹酮的抗虫作用首选用于

A: 丝虫

B: 牛肉绦虫

C: 蛔虫

D: 血吸虫

答案: D

74. 下列药物中，能促进食物消化的是()

A: 乳酶生

B: 兰索拉唑

C: 胶体果胶铋

D: 雷尼替丁

答案: A

75. 与普通肝素相比，低分子肝素的抗凝作用特点是

A: 对凝血因子 IIa、VIIa 灭活作用强，对 Xa 作用弱

B: 对凝血因子 Xa、XIa 灭活作用强，对 IIa 作用弱

C: 对凝血因子 IIa、IXa 灭活作用强，对 Xa 作用弱

D: 对凝血因子 Xa、XIIa 灭活作用强，对 IIa 作用弱

答案: D

76. (2019 年真题) 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内，宜使用的口服紧急避孕药是()

A: 炔雌醇去氧孕烯 (30 μ g/150 μ g)

B: 十一酸睾酮 (40mg)

C: 左炔诺孕酮 (1

D: 复方醋酸环内孕酮 (35 μ g/2mg)

答案: C

77. 药粉接触患者的眼睛，可导致眼睛疼痛、结膜充血的是

- A: 特布他林
- B: 布地奈德
- C: 沙美特罗
- D: 噻托溴铵

答案：D

78. 氯丙嗪常见的不良反应

- A: 细胞缺氧、酸中毒、休克
- B: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退
- C: 过敏反应
- D: 锥体外系反应

答案：D

79. 以下关于过氧苯甲酰的描述中，不正确的是

- A: 为强还原剂，极易分解
- B: 可分解出新生态氧而发挥作用
- C: 可杀灭痤疮丙酸杆菌
- D: 可导致皮肤干燥，脱屑

答案：A

80. 巨幼红细胞性贫血应首选

- A: 维生素 B
- B: 叶酸+维生素 B
- C: 亚叶酸钙
- D: 维生素 B

答案：B

81. 与氨曲南在结构上相似的头孢菌素类药是

- A: 头孢噻肟
- B: 氨曲南
- C: 头孢美唑
- D: 头孢他啶

答案：D

82. H₁ 受体拮抗剂的各项叙述，错误的是

- A: 主要用于治疗变态反应性疾病
- B: 可用于治疗变态反应性失眠
- C: 主要代表药有法莫替丁
- D: 可用于治疗妊娠呕吐

答案：C

83. 与吗啡合用可发生严重的、甚至致死的不良反应，包括躁狂、多汗、僵直、呼吸抑制、昏迷、惊厥和高热的药物是

- A: 丙戊酸钠
- B: 苯巴比妥
- C: 吗氯贝胺
- D: 氯硝西洋

答案：C

84. 可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是

- A: 阿托品
- B: 纳洛酮
- C: 苯甲酸钠咖啡因
- D: 氟马西尼

答案：A

85. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌的糖肽类抗菌药物是

- A: 克拉霉素
- B: 万古霉素
- C: 红霉素
- D: 罗红霉素

答案：B

86. 长期使用可使血钾水平升高的药品是

- A: 吲达帕胺
- B: 呋塞米
- C: 乙酰唑胺
- D: 氨苯蝶啶

答案：D

87. 下述利尿药中，可导致血钾升高的是

- A: 呋塞米
- B: 氨苯蝶啶
- C: 氢氯噻嗪
- D: 乙酰唑胺

答案：B

88. 头孢菌素类药的主要作用靶点是

- A: 核糖体的 30S 亚基
- B: 核糖体的 50S 亚基
- C: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- D: 细胞内膜 PBP

答案：D

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/425114301121012033>