

2024 福建省南安市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题（网校专用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 药师与患者进行沟通时的技巧不包括

- A: 认真观察对方的表情变化，判断其对问题的理解和接受程度
- B: 尽量使用专业性术语
- C: 认真聆听，使用通俗易懂的语言
- D: 与患者谈话时间不宜过长，一次性提供的信息不宜过多

答案：B

2. 静脉滴注碳酸氢钠注射液用于

- A: 巴比妥类中毒
- B: 阿米替林中毒
- C: 有机氟中毒
- D: 阿片中毒

答案：A

3. 患者，男，43 岁，患有家族性痛风，既往有磺胺类药物过敏史患者近日因工作应酬较多，未能控制饮食，昨夜造成痛风急性发作，右足第一跖趾关节出现红、肿、热、痛，疼痛剧烈。因无法忍受，今日晨起后速来药店购药，药师应推荐的药物是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 别嘌醇
- C: 丙磺舒

D: 碳酸氢钠

答案：A

4. 可引起“双硫仑样反应”，给药期间、给药结束 1 周内应禁止饮酒的是

A: 阿米卡星

B: 莫西沙星

C: 阿奇霉素

D: 头孢哌酮

答案：D

5. 应用华法林抗凝治疗时，INR 安全有效范围为血栓性疾病患者实施抗凝治疗，应该控制国际标准化比值为

A: <2.0

B: >3.0

C: $2.0\sim2.5$

D: $2.0\sim3.0$

答案：D

6. 助消化药不宜与抗菌药物、吸附剂同时服用；如必须联用，应间隔的时间是

A: 2~3 小时

B: 0.5 小时

C: 1.5 小时

D: 1 小时

答案：A

7. 给予(透析患者)铁剂的依据是

- A: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素
- B: 有助于机体合成红细胞
- C: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛
- D: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D

答案：B

8.（2019 年真题）患者，男，34 岁，既往有胃溃疡病史，现因反复关节疼痛、肿大就诊，诊断为骨关节炎，应选用的药物是

- A: 布洛芬
- B: 吲哚美辛
- C: 塞来昔布
- D: 萘普生

答案：C

9. 抗肿瘤药物中，影响核酸合成的药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 放线菌素
- C: 依托泊苷
- D: 顺铂

答案：A

10.（2015 年真题）处方中“餐前给药”的外文缩写是（）。

- A: qn
- B: po
- C: Ac
- D: pc

答案：C

11. 患者，女性，46 岁。半年来食欲减退、易疲劳，查体发现多处淋巴结肿大，尤以颈部淋巴结为甚。骨髓抽取及切片、放射线检查（X 线、淋巴摄影）后诊断为恶性淋巴瘤。

- A: 食欲下降
- B: 恶心、呕吐
- C: 脱发
- D: 骨髓抑制

答案：D

12. 碘解磷定等胆碱酯酶复活剂不能与碱性溶液直接配伍的机制是

- A: 碘解磷定等不溶解
- B: 碘解磷定等不稳定
- C: 碘解磷定等水解
- D: 碘解磷定等水解生成剧毒的氰化物

答案：D

13. 患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊。经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是

- A: 奥司他韦
- B: 金刚乙胺
- C: 利巴韦林
- D: 金刚烷胺

答案：A

14. 患者，男，57 岁，患有冠心病、抑郁症、2 型糖尿病，用药包括二甲双胍、阿托伐他汀、圣约翰草提取物、阿卡波糖、阿司匹林。近日患者在家人陪同下去郊区旅游，日晒后暴露部位的皮肤出现红斑、丘疹，伴灼热、痒痛感，疑与用药有关。最可能引起该过敏反应的药物是

- A: 圣约翰草提取物
- B: 阿托伐他汀
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：A

15. 在体外无抗凝作用，在体内有凝血作用的是

- A: 尿激酶
- B: 华法林
- C: 噻氯匹定
- D: 肝素

答案：B

16. 伴有焦虑症的抑郁症患者宜选用

- A: 文拉法辛
- B: 阿米替林
- C: 帕罗西汀
- D: 度洛西汀

答案：C

17. 绝经激素治疗(MHT)应禁用的人群是

- A: 合并高胆固醇血症的患者
- B: 6 个月内有静脉血栓栓塞性疾病史的患者

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

C: 合并轻度高血压的患者

D: 甲状腺切除术后的患者

答案：B

18. 静脉滴注速度过快或口服剂量过大，可引起急性肾衰竭的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 人促红素
- C: 脂肪乳
- D: 利巴韦林

答案：A

19. 引起"肾病患者清除减慢，服用呋喃妥因血药浓度升高，可引起周围神经炎"是

- A: 遗传因素
- B: 基础疾病
- C: 年龄
- D: 性别

答案：B

20. 作为预防用药错误策略，规范处方行为与操作流程，归属于

- A: 管理规范到位
- B: 科学发展
- C: 人员知识培训
- D: 环境与流程的优化与持续改进

答案：A

21. 癌症患者出现突发性刺痛、戳痛时，可选用

- A: 加巴喷丁
- B: 芬太尼注射剂
- C: 丁溴东莨菪碱片
- D: 布洛芬混悬液

答案：A

22. 1 个半衰期给药 1 次；如需要立即达到稳态，可首剂加倍针对

- A: 半衰期 8~24 小时
- B: 半衰期小于 30 分钟
- C: 半衰期大于 24 小时
- D: 半衰期大于 30 小时

答案：A

23. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约 2~5 次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC： 5×10

- A: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止
- B: 若症状不能改善，及时加用诺氟沙星
- C: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液
- D: 应给予少量、多次、清淡饮食

答案：B

24. 患者，男，体检发现血清尿素氮升高、血肌酐升高，其他生化指标正常，该患者最可能患有

- A: 血液疾病
- B: 肾脏疾病
- C: 心脏疾病
- D: 肝脏疾病

答案：B

25. (在乳汁中排泄的药物) 青霉素较难在乳汁中出现的机制是青霉素

- A: 在脂肪与水中都有一定的溶解度
- B: 呈弱酸性
- C: 脂溶性高
- D: 呈弱碱性

答案：B

26. 归属公共网络资源的是

- A: www. googl
- B: www. cmt. tom. cn
- C: www. ashp. org
- D: www. merck. com

答案：A

27. 药物过量、毒性反应、继发反应、后遗效应、致畸、致癌、致突变作用归属

- A: 药物的使用
- B: 药动学相互作用
- C: 药物制剂因素
- D: 药理作用

答案：D

28. 二甲双胍的最佳服用时间是

- A: 餐后
- B: 餐中
- C: 清晨空腹
- D: 餐前

答案：B

29. 具有留钾作用的利尿药是

- A: 阿米洛利
- B: 乙酰唑胺
- C: 非那雄胺
- D: 坦洛新

答案：A

30. 解救急性乙醇中毒的是（）

- A: 纳洛酮
- B: 亚硝酸钠
- C: 双复磷
- D: 二巯丁二钠

答案：A

31. 患者，男，58 岁，体重 68kg，高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰，伴发热，入院查体 BP：120/80mmHg，T38.9℃。化验结果：白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 86%。胸片示：右下肺纹理增粗，诊断为社区获得性肺炎，青霉素皮试阳性。

- A: 莫西沙星
- B: 阿莫西林
- C: 氨苄西林
- D: 头孢吡肟

答案：A

32. 增加肾毒性和耳毒性的配伍用药是

- A: 氨基糖苷类抗生素联用依他尼酸

- B: 肝素钠联用阿司匹林
- C: 山莨菪碱联用盐酸哌替啶
- D: 普萘洛尔联用硝酸酯类

答案：A

33. 解救砷化合物中毒的是（）

- A: 纳洛酮
- B: 二巯丁二钠
- C: 双复磷
- D: 亚硝酸钠

答案：B

34. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 下肢动脉栓塞
- B: 下肢深静脉血栓形成
- C: 肺动脉栓塞
- D: 病理性骨折

答案：B

35. 进行药学信息的收集、保管、整理、评价、传递、提供和利用，是归属于查看材料

- A: 处方点评工作
- B: 参与健康教育工作
- C: 药学信息服务工作
- D: 处方审核工作

答案：C

36. 下列哪种药对洋地黄中毒引起的快速型心律失常疗效最佳

- A: 普萘洛尔
- B: 普鲁卡因胺
- C: 苯妥英钠
- D: 阿托品

答案：C

37. 患者，女，76 岁，慢性阻塞性肺病病史 10 年年来多次因急性加重入院，予以抗感染等治疗。近日因咳嗽咳痰加重再次入院，经验性抗感染治疗时适宜选用的药物是（）

- A: 头孢他啶
- B: 头孢唑林
- C: 阿米卡星
- D: 阿奇霉素

答案：A

38. 乳酸性酸中毒患者宜选用（）。

- A: 瑞格美脲
- B: 胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 格列喹酮

答案：B

39. 应用两种以上药物以增强与确保疗效

- A: 联合
- B: 早期
- C: 适量
- D: 规律

答案：A

40. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC 15×10

- A: 急性膀胱炎
- B: 慢性肾盂肾炎
- C: 急性肾小球肾炎
- D: 急性肾盂肾炎

答案：D

41. (抗高血压药物的不良反应)，服用哌唑嗪可能引起

- A: 直立性低血压
- B: 多毛症
- C: 免疫失调
- D: 房室传导阻滞

答案：A

42. 药库管理人员根据药品用量和库存情况提出购药计划，向指定的药品经营单位采购，必须持有

- A: 印鉴卡
- B: 基数卡
- C: 防盗设施
- D: 五专管理

答案：A

43. 观察人体对新药的耐受程度和药动学评价阶段是

- A: III期临床试验
- B: IV期临床试验

C: II 期临床试验

D: I 期临床试验

答案: D

44. 二巯丙醇用于解救的是 ()

A: 氰化物中毒

B: 三唑仑中毒

C: 汞中毒

D: 有机磷中毒

答案: C

45. 评判为不规范处方的是

A: 二甲双胍用于糖尿病人

B: 无适应证用药

C: 黄连素用于细菌性腹泻

D: 单张门诊处方超过 5 种药品

答案: D

46. 苯妥英、地塞米松、地西泮在妊娠 26~29 周时游离药物浓度达高峰，是由于

A: 妊娠晚期血流动力学发生改变较多

B: 胃肠活动程度减弱，使吸收减慢

C: 血容量增加使血浆清蛋白浓度降低

D: 妊娠期药物分布容积明显增加

答案: C

47. 服用药物对粪外观的影响，利福平

A: 红至黑色

- B: 黄色
- C: 橘红至红色
- D: 变红或黑色

答案：C

48. 服用药物对粪外观的影响,保泰松

- A: 变红或黑色
- B: 橘红至红色
- C: 黄色
- D: 红至黑色

答案：A

49. 季节性过敏性鼻炎主要的诱因是（）

- A: 冷
- B: 花粉
- C: 光线
- D: 热

答案：B

50. 某患者，女，14 岁，尿频、尿急、尿痛 3 天，伴腰痛。肾区叩击痛，血分析见白细胞及中性粒细胞百分比升高，尿分析见尿液浑浊，尿白细胞+++，临床诊断为急性肾盂肾炎。

- A: 呋喃妥因
- B: 磺胺甲噁唑
- C: 环丙沙星
- D: 头孢曲松

答案：C

51. 患者，女性，25 岁，因面色苍白、头晕、乏力 1 年余，加重伴心悸 1 个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

- A: 甲床苍白、反甲或脆裂
- B: 牛肉样舌
- C: 共济失调
- D: 腹泻

答案：A

52. 适用轻中度肾功能不全者的是由肝胆排泄的

- A: 格列喹酮
- B: 甲苯磺丁脲
- C: 格列吡嗪控释片
- D: 格列本脲

答案：A

53. 作用于有丝分裂 M 期，干扰微管合成的药物为

- A: 卡培他滨
- B: 丝裂霉素
- C: 紫杉醇
- D: 替尼泊苷

答案：C

54. 庆大霉素可引起

- A: 再生障碍性贫血
- B: 癫痫发作
- C: 锥体外系反应
- D: 听神经障碍

答案：D

55. 宜于餐中服用的药品是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 糖皮质激素
- C: 阿卡波糖
- D: 洛伐他汀

答案：C

56. 脂溶性维生素 A 宜餐后服用的原理是

- A: 餐后胃酸分泌增多有利于吸收
- B: 利用油脂增加其溶解
- C: 延长在胃肠道滞留时间
- D: 减少被胃酸破坏

答案：B

57. 属于超适应证用药的是

- A: I 类手术切口应用第三代头孢菌素
- B: 肠炎、细菌感染性腹泻同时应用小檗碱、双八面体蒙脱石散、盐酸地芬诺酯进行治疗
- C: 食管癌应用顺铂、氟尿嘧啶、表柔比星进行治疗
- D: 黄体酮用于排除结石

答案：D

58. 及时发现重大药害事件，即可防止药害事件蔓延和扩大

- A: 促进临床合理用药
- B: 减少 ADR 的危害
- C: 促进新药的研制开发
- D: 为临床药物评价提供依据

答案：B

59. 患者，男，50 岁，血压 170 / 95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是

- A: 利尿剂+D-CCB
- B: α 受体阻断剂+ACEI
- C: 利尿剂+AR
- D: β 受体阻断剂+ARB

答案：A

60. 患者，男，42 岁。患艾滋病，进行抗病毒治疗。以下药物不属于核苷酸类逆转录酶抑制剂的是

- A: 双脱氧胞苷
- B: 替诺福韦
- C: 奈韦拉平
- D: 拉米夫定

答案：C

61. （2018 年真题）举重运动员使用后，可短时间内急速降低体重，因此需按兴奋剂管理的药物是（）

- A: 缬沙坦
- B: 普萘洛尔
- C: 呋塞米
- D: 硝苯地平

答案：C

62. Hb 量>90g/L 与低于正常参考的下限可诊断为

- A: 基本正常

- B: 轻度贫血
- C: 中度贫血
- D: 重度贫血

答案：B

63. 容易水解的药物是

- A: 牛痘菌苗
- B: 青霉素类
- C: 吗啡
- D: 胃蛋白酶

答案：B

64. 为比较不同质子泵抑制剂治疗十二指肠溃疡的经济性,将药物治疗的成本与产生的效用指标以货币进行评估,此药物经济学评价方法是()

- A: 最小成本分析
- B: 成本-效果分析
- C: 成本-效益分析
- D: 成本-效用分析

答案：C

65. 关于左甲状腺素 (L-T₄) 的用药注意事项,错误的是

- A: 一般从 250~500 $\mu\text{g/d}$ 开始, 每 1~2 周增加 250 μg , 直至达到治疗目标
- B: 需终生服药
- C: 每天早餐前 60 分钟服药 1 次
- D: 不能与钙剂、胆酸螯合剂 (消胆胺) 合用

答案：A

66. 药物警戒涉及与药品相关的研究和活动，但不包括

- A: 疫苗的不良反应
- B: 处方调配错误
- C: 药品超说明书用药
- D: 药物的有效成分鉴定

答案：D

67. po. 表示

- A: 双眼
- B: 口服
- C: 每日
- D: 饭后

答案：B

68. $30\text{g/L} \leq \text{Hb 量} < 60\text{g/L}$ 可诊断为

- A: 中度贫血
- B: 重度贫血
- C: 基本正常
- D: 轻度贫血

答案：B

69. 在人体血液白细胞群体中，中性粒细胞的正常参考范围是

- A: 0.01~0.05
- B: 0.50~0.70
- C: 0.20~0.40
- D: 0.03~0.08

答案：B

70. 用于前列腺增生症的高选择性 α 1A 受体阻断剂是 ()

- A: 索利那新
- B: 托特罗定
- C: 坦索罗辛
- D: 特拉唑嗪

答案：C

71. 患者，女，36 岁。患支气管哮喘，以上哪种药物能够最有效地控制哮喘呼吸道炎症

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: 短效 β 2 受体激动剂
- C: 糖皮质激素
- D: β 2 受体阻断剂

答案：C

72. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

- A: 肝功能异常
- B: 腹胀
- C: 高血脂
- D: 高血压

答案：A

73. 用于治疗苯二氮?类药物中毒的特殊解毒剂是

- A: 青霉胺
- B: 纳洛酮
- C: 氟马西尼
- D: 乙酰胺

答案：C

74. 痛风慢性期应长期使用的促尿酸排泄药是

- A: 别嘌醇
- B: 阿司匹林
- C: 秋水仙碱
- D: 丙磺舒

答案：D

75. 患者，男，78 岁，体检发现血清尿素氮升高、血肌酐升高，其他生化指标正常，该患者最可能患有

- A: 血液疾病
- B: 肝脏疾病
- C: 肾脏疾病
- D: 心脏疾病

答案：C

76. 以下药品中，最适宜治疗沙眼和流行性急性结膜炎的是

- A: 酞丁安滴眼剂
- B: 硫酸锌滴眼剂
- C: 色甘酸钠滴眼剂
- D: 红霉素眼膏

答案：A

77. 指明其资料来源通过超链接指向其材料来源

- A: 归因性
- B: 合理性
- C: 新颖性
- D: 权威性

答案：A

78. 影响药物治疗有效性的因素不包括（）

- A: 药品价格
- B: 给药途径
- C: 药物相互作用
- D: 患者的病生理状态

答案：A

79. （2017 年真题）药师在审核处方时，无需要求确认或重新开处方的情形是（）

- A: 头孢曲松钠选用复方氯化钠注射液作溶媒
- B: 将酚麻美敏胶囊和板蓝根颗粒开在同一张处方上
- C: 给糖尿病患者同时开具消渴丸和格列本脲
- D: 诊断为麻疹，使用阿莫西林抗感染治疗

答案：B

80. 以下对“发热指标”的叙述中，不正确的是

- A: 腋下温度超过 37.0℃
- B: 口腔温度超过 37.3℃
- C: 直肠温度超过 37.6℃
- D: 腋下温度超过 36.6℃

答案：D

81. 格列本脲

- A: 宜清晨服用
- B: 宜餐前服用
- C: 宜餐后服用
- D: 宜睡前服用

答案: B

82. 在治疗蛔虫病的药物中, "排虫缓慢而可能发生蛔虫游走与穿孔"的是

- A: 阿苯达唑
- B: 噻苯达唑
- C: 枸橼酸哌嗪
- D: 噻嘧啶

答案: A

83. 患者, 女, 64 岁, 患 2 型糖尿病、高脂血症, 给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 每次调整 1~4 单位
- B: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须冷藏保存
- C: 每 3~5 天调整 1 次
- D: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量

答案: B

84. 对药检机构检查证明有质量问题的药品及时召回或调换即

- A: 对可疑药品进行封存
- B: 查找供货方

C: 反向追踪

D: 药品召回

答案: D

85. 可引起 A/G 比值 <1 的是

A: 各种原因脱水所致的血液浓缩

B: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等

C: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害

D: 摄入不足、消化不良时

答案: C

86. 出血是肝素最常见的不良反应，对明显出血者选用的特异性拮抗药是

A: 地塞米松

B: 氟马西尼

C: 鱼精蛋白

D: 烯丙吗啡

答案: C

87. 依据权威的专科诊疗指南是

A: 药物治疗的规范性

B: 药物治疗的方便性

C: 药物治疗的有效性

D: 药物治疗的安全性

答案: A

88. 医师用药咨询的内容是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/425131130114012033>