

2024 吉林省扶余市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题完整题库含答案（基础题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于 5 α 还原酶抑制剂的是（）

- A: 度他雄胺
- B: 氟他胺
- C: 普适泰
- D: 雌三醇

答案：A

2. （2018 年真题）临床上将酚妥拉明 20mg、多巴胺 20mg、呋塞米 20mg 加入到 5%葡萄糖注射液 250ml 后，出现黑色沉淀。出现沉淀的原因是（）

- A: 酚妥拉明在葡萄糖溶液中分解
- B: 酚妥拉明和呋塞米发生反应
- C: 酚妥拉明和多巴胺发生反应
- D: 多巴胺和呋塞米发生反应

答案：D

3. （2017 年真题）因可提高血液携氧量，被长跑运动员用于提高成绩，因而被列为兴奋剂管理的药物是（）

- A: 人促红素
- B: 甲睾酮
- C: 可卡因

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 哌替啶

答案: A

4. (2016 年真题) 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的是 ()。

A: 叶酸

B: 克拉维酸钾

C: 奥美拉唑

D: 苯丝肼

答案: C

5. 痔疮的主要表现是

A: 疼痛

B: 坠胀感

C: 便后鲜血

D: 瘙痒

答案: C

6. 患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是 ()

A: 痛风

B: 冠心病

C: 心力衰竭

D: 双侧肾动脉狭窄

答案: C

7. 患者，男，72 岁，在晨练中突然感觉胸痛，倒地不起，周围伙伴急忙拨打 120。医务人员赶到现场后，初步诊断是心绞痛急性发作。经简单急救后，将病人送至医院治疗。并为患者开具了下列药物：阿司匹林肠溶片、洛伐他汀、硝苯地平、硝酸甘油。

- A: 硝酸异山梨酯舌下片
- B: 氯吡格雷
- C: 比索洛尔
- D: 普伐他汀

答案：A

8. 患者，女，31 岁，因丙型病毒性肝炎使用 α 干扰素联合利巴韦林治疗。下列关于用药期间避孕和备孕措施的说法，正确的是（）

- A: 干扰素、利巴韦林较为安全，不必停药，即可备孕
- B: 干扰素、利巴韦林较为安全，停药 3 个月后可备孕
- C: 干扰素、利巴韦林较为安全，停药后即可备孕
- D: 干扰素、利巴韦林易引起畸胎或者胚胎致死效应，治疗期间和治疗后 6 个月内，必须采取避孕措施

答案：D

9. 为血液中的主要吞噬细胞，在白细胞中所占比例最高，且在急性感染中起重要作用的细胞为

- A: 嗜碱性粒细胞
- B: 淋巴细胞
- C: 嗜酸性粒细胞
- D: 中性粒细胞

答案：D

10. （2019 年真题）下列药物中，使用前无需皮试的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 抑肽酶注射剂

B: 苜星青霉素注射剂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 抗狂犬病血清注射剂

D: 紫杉醇注射剂

答案: D

11. 收录 22000 多种处方药和 6000 多种 OTC 药物的药学综合信息是

A: 《药物信息手册》

B: 《药物事实与比较》

C: 《马丁代尔药物大典》

D: 《医师案头参考》

答案: B

12. 已获准可以长期用于治疗失眠的药物为 ()

A: 雷美尔通

B: 艾司唑仑

C: 多塞平

D: 佐匹克隆

答案: A

13. 耳、肾毒性大，肾功能不全患者不宜使用的药物是

A: 头孢哌酮

B: 阿奇霉素

C: 莫西沙星

D: 阿米卡星

答案: D

14. 一般不会出现中性粒细胞增多的中毒事例是

A: 汞中毒

B: 催眠药中毒

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 铅中毒

D: 乙醇中毒

答案: D

15. 患者，女，60 岁。患肥胖症，检查可见 TG2.0mmol/L。主要降低 TG 的下列药物首选

A: 考来烯胺

B: 普罗布考

C: 非诺贝特

D: 氟伐他汀

答案: C

16. 适用于静脉推注的抗肿瘤药为

A: 阿糖胞苷

B: 甲氨蝶呤

C: 塞替派

D: 氮芥

答案: D

17. 用药期间禁止饮酒，否则可能引起眩晕、倦怠、嗜睡、视物不清等“双硫仑样反应”的药物是

A: 特拉唑嗪

B: 左氧氟沙星

C: 头孢哌酮

D: 卡马西平

答案: C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

18. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流鼻涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 双氯芬酸钠
- B: 尼美舒利
- C: 美洛昔康
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

19. 查询妊娠及哺乳期用药可首选的书籍是

- A: 《药物流行病学》
- B: 《新编药理学》
- C: 《中华人民共和国药典》
- D: 《药物治疗学》

答案：D

20. 三环类抗抑郁药中毒的临床表现是 ()

- A: 心血管毒性
- B: 肌肉震颤、抽搐
- C: 明显的锥体外系症状
- D: 谵妄、躁狂、幻觉

答案：A

21. 依据生物钟规律，适宜睡前服用的药品是

- A: 苯海拉明
- B: 氟伏沙明
- C: 沙丁胺醇
- D: 奥利司他

答案：C

22. (2018 年真题) 患者, 女, 35 岁, 因感冒所致流涕、咳嗽发热等症状到药店购药, 药师应推荐的药品是 ()

- A: 酚麻美敏片
- B: 萘甲唑啉滴鼻液
- C: 氯苯那敏片
- D: 对乙酰氨基酚片

答案：A

23. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物, 正常人每日排出尿液 1000~3000ml。其中 97% 为水分, 而在 3% 的固体物质中, 主要含有两大类物质: 有机物 (尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物) 和无机物 (氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等)。

- A: 氯化钾
- B: 硫酸镁
- C: 氯化钠
- D: 氯化铵

答案：D

24. 题] 可影响幼儿软骨发育, 导致承重关节损伤的药物是

- A: 米诺环素
- B: 诺氟沙星
- C: 头孢唑林
- D: 阿米卡星

答案：B

25. (2019 年真题) 患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体：体温 39.1℃，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 头孢哌酮舒巴坦
- B: 哌拉西林他唑巴坦
- C: 阿奇霉素
- D: 莫西沙星

答案：D

26. 常引起粪便白细胞增多的是

- A: 溶血性黄疸
- B: 阻塞性黄疸
- C: 急性胰腺炎
- D: 细菌性痢疾

答案：D

27. 糖尿病合并肾病者宜首选的药物是

- A: 罗格列酮
- B: 格列喹酮
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案：B

28. 吸附力强、可阻止毒物吸收，但是对氰化物无效的洗胃液是

- A: 牛奶-水混合液
- B: 鸡蛋白

C: 药用炭混悬液

D: 1%硫酸镁溶液

答案：C

29. 患者，女，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 慢性肾盂肾炎

B: 急性肾盂肾炎

C: 急性肾小球肾炎

D: 急性膀胱炎

答案：B

30. 亚硝酸盐中毒解救药物

A: 亚甲蓝

B: 青霉胺

C: 纳洛酮

D: 氯磷定

答案：A

31. 患者，男，66 岁，帕金森病史 3 年，服用复方左旋多巴控制病情，药师对患者及其家属进行的用药指导错误的是

A: 应避免同时进食蛋白质类食物，应隔开 2~3h

B: 为达到治疗效果，应小剂量滴定增量

C: 不能自行停药或随意改变剂量

D: 早、中餐应高蛋白饮食，减少碳水化合物的摄入

答案：D

32. 需要在冷处贮存的高警示药品是

- A: 降钙素
- B: 胰岛素
- C: 肾上腺素
- D: 高锰酸钾

答案：B

33. 烯丙吗啡用于解救

- A: 水银中毒
- B: 吗啡中毒
- C: 有机磷中毒
- D: 氰化物中毒

答案：B

34. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病，而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有用药物治疗，接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅三成左右。高血压死亡率不断升高。熟悉高血压及相关用药，对更有效地治疗高血压非常重要。

- A: 甲基多巴
- B: 氢氯噻嗪
- C: 拉贝洛尔
- D: 依那普利

答案：D

35. 关于药品编码，下列说法错误的是

- A: 药品编码是我国药品监督管理的一项基础的标准化工作

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 建立国家药品编码系统是一项专业化极强的技术工作

C: 药品作为特殊商品，要实现防止伪劣，必须遵循"单品单码"的原则

D: 国家药品编码只适用于药品生产、经营和使用领域

答案：D

36. (孕妇用药注意事项) 孕妇使用可导致胎儿甲状腺功能低下的药品是

A: 胰岛素

B: 青霉素类

C: 甲巯咪唑

D: 氮芥类

答案：C

37. 孕妇的急性膀胱炎治疗时间是

A: 1~3 日

B: 10 日

C: 3~5 日

D: 3~7 日

答案：D

38. 不能用于治疗缺铁性贫血的药物是

A: 乳酸亚铁

B: 硫酸亚铁

C: 去铁胺

D: 葡萄糖酸亚铁

答案：C

39. 上消化道出血(>50ml)可呈现

A: 乳凝块便

- B: 鲜血便
- C: 柏油黑便
- D: 白陶土便

答案: C

40. 药师发药时提示患者“不要驾车、操作机器或高空作业等”，针对的药物是

- A: 铋制剂
- B: 氟西汀
- C: 氯苯那敏
- D: 卡托普利

答案: C

41. 患者，女，65 岁，因乳腺癌接受第二周期化疗。禁用的止吐药物是（）

- A: 昂丹司琼
- B: 苯海拉明
- C: 地塞米松
- D: 甲氧氯普胺

答案: D

42. 患者，女，67 岁，有高血压病史，右手抖动行走缓慢 4 年，诊断为帕金森病。服用复方左旋多巴治疗，症状一度好转后又反复加重，随后采用加大复方左旋多巴剂量，并加用苯海索。患者同时服用氨氯地平、缬沙坦等药物控制血压近日出现运动症状波动，伴有异动症。导致该不良反应的药物是（）

- A: 苯海索
- B: 氨氯地平

C: 苜丝肼

D: 左旋多巴

答案: D

43. 关于老年人患病，下列哪项叙述是错误的

A: 老年人的各种器官功能减退，机体适应能力下降，故一旦发病，病情常迅速恶化

B: 老年人的症状和体征往往表现不典型

C: 老年人由于组织器官老化和生理功能减退，容易罹患多种慢性疾病

D: 老年人患多种疾病，若治疗上存在矛盾时，应忽略不良反应，保证药物治疗的全面性

答案: D

44. 患者，男，65 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次，阿卡波糖 0.1g. 一日 3 次。罗格列酮 4mg，一日一次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

A: 二甲双胍

B: 阿司匹林

C: 阿卡波糖

D: 罗格列酮

答案: D

45. 患者，男，70 岁，2 周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是（）

A: 阿司匹林

B: 利伐沙班

C: 巴曲酶

D: 肝素

答案: A

46. 最常用的解热镇痛药为

A: 对乙酰氨基酚

B: 阿司匹林

C: 塞来昔布

D: 谷维素

答案: A

47. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何时候固定时间给药

B: 瑞格列奈片应于餐前服用

C: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

D: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

答案: D

48. 如万络（罗非昔布）撤市时发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了 3 倍

A: 发现与规避假、劣药流入市场

B: 药品上市后风险评估

C: 发现药品质量问题

D: 药品上市前风险评估

答案: B

49. 以下有关肝功能不全病人用药的叙述中，不正确的是

- A: 明确诊断，合理选药
- B: 静脉给药可不调整剂量
- C: 定期检查肝功能，及时调整治疗方案
- D: 避免或减少使用或合用对肝脏毒性大的药物

答案：B

50. 肾素抑制剂

- A: 阿利吉仑
- B: 依普利酮
- C: 阿米洛利
- D: 雷米普利

答案：A

51. 向患者发放合理用药宣传材料是

- A: 主动方式
- B: 协商方式
- C: 教育方式
- D: 指令方式

答案：A

52. 患者，男，18 岁，因鼻塞症状就诊，医生处方 1% 盐酸麻黄碱滴鼻液。下列关于该滴鼻液用药指导的说法，错误的是()

- A: 滴鼻后，要静卧 3~5 分钟
- B: 萎缩性鼻炎患者可增加给药次数
- C: 用药前要将鼻腔分泌物清理干净
- D: 滴管头不要碰到鼻部，以避免污染药液

答案：B

53. 使用非甾体类抗炎药治疗类风湿关节炎时，为预防其胃肠道副作用常并用

A: H₂ 受体拮抗剂

B: 维生素 K

C: 碱性药

D: 钙剂

答案：A

54. 关于蛇咬伤中毒后的一般处理措施，叙述错误的是

A: 用 1: 1000 高锰酸钾溶液反复冲洗伤口

B: 用绳索将伤口的近心端 5cm 处捆住，以防止毒液在体内扩散

C: 在伤口上做多个“十”字小切口以便排毒

D: 每隔 15~20min 放松带子 1~2min. 以防止肢体缺血坏死

答案：A

55. 美托洛尔和肾上腺素的相互作用属于()。

A: 酶诱导作用

B: 排泄

C: 与血浆蛋白结合

D: 作用于同一受体的拮抗作用

答案：D

56. 应报告药品引起的严重、罕见或新的不良反应的是

A: 上市 3 年以内的药品

B: 上市 5 年以内的药品

C: 上市 5 年以上的药品

D: 国家重点监测的药品

答案：C

57. 洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀等他汀类所致的药源性损伤为

- A: 胃肠道损害
- B: 肾损害
- C: 肝损害
- D: 肺损害

答案：C

58. 氟西汀与血浆蛋白的结合力强，使同服的华法林或洋地黄毒苷游离型浓度超出安全范围归属

- A: 药物的使用
- B: 药物制剂因素
- C: 药动学相互作用
- D: 药理作用

答案：C

59. 长期服用可导致或加重胃溃疡的药物是

- A: 米索前列醇
- B: 质子泵抑制剂
- C: NSAID
- D: 抗酸剂

答案：C

60. 急性肾小球肾炎时，尿中可见()。

- A: 血红蛋白尿
- B: 红细胞管型
- C: 白细胞管型

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 乳糜尿

答案：B

61. 甲状旁腺素制剂属于

A: 骨形成刺激剂

B: 促进骨矿化剂

C: 激素替代剂

D: 骨吸收抑制剂

答案：A

62. 饮酒后酒精除了影响神经系统、心血管系统的功能外，还会影响药物的疗效作用和毒副作用。因此，在服用药物时应该考虑酒精对药物的影响。

A: 过敏反应

B: 低血糖反应

C: 血糖升高

D: 血压升高

答案：B

63. 及时发现并确定“亮菌甲素事件”显示药物警戒的作用是

A: 发现药品质量问题

B: 药品上市前风险评估

C: 发现与规避假、劣药品流入市场

D: 药品上市后风险评估

答案：C

64. 某批次青霉素钠原料 1mg 相当于 1670 单位效价，生产规格为 80 万 U 支的青霉素钠产品，每支所需的装量是（）

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 1.33mg

B: 0.48g

C: 1.33g

D: 2.088mg

答案：B

65. 属于非麻醉性镇咳药的是

A: 苯丙哌林

B: 羧甲司坦

C: 沙丁胺醇

D: 羟甲唑啉

答案：A

66. 与地西洋合用会影响其代谢导致镇静催眠作用增强的药物是()

A: 铝碳酸镁

B: 伏立康唑

C: 维生素 B

D: 阿司匹林

答案：B

67. 通过抑菌圈直径判断细菌对不同药物的敏感性，而不以最小抑菌浓度 (MIC) 判断药物抗菌作用的药敏试验方法是

A: E-test 法

B: 肉汤稀释法

C: 纸片扩散法

D: 琼脂稀释法

答案：C

68. 关于新型抗凝药物，下列说法不正确的是

- A: 需监测 INR
- B: 达比加群酯直接作用于凝血酶(主要是 IIa 因子)
- C: 与食物和药物相互作用小
- D: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节

答案：A

69. 可治疗男性性功能障碍的药物是

- A: 西地那非
- B: 度洛西汀
- C: 沙美特罗
- D: 维生素 E

答案：A

70. 以下药品中，归属妊娠毒性药物 X 级的是

- A: 链霉素
- B: 甲巯咪唑
- C: 更昔洛韦
- D: 他汀类降脂药

答案：D

71. 用于治疗苯二氮类药物中毒的特殊解毒剂是 ()

- A: 纳洛酮
- B: 二巯丁二钠
- C: 氟马西尼
- D: 乙酰胺

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

72. 下列属于二级文献的是

- A: 《化学名词》
- B: 《中国药学年鉴》
- C: 《中国药学文摘》
- D: 《中国药学杂志》

答案: C

73. 淋巴细胞正常值参考范围是

- A: 0~0.01
- B: 0.01~0.05
- C: 0.20~0.40
- D: 0.03~0.08

答案: C

74. (2021 年真题) 哺乳期妇女使用, 可致男婴乳房增大的药物是 ()

- A: 复方磺胺甲噁唑
- B: 胰岛素
- C: 复方炔诺酮
- D: 依那普利

答案: C

75. (2017 年真题) 慢性阻塞性肺病稳定期患者 (FEV₁<50%) 宜选用的治疗方案是 ()

- A: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
- B: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
- C: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素
- D: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

答案: C

76. 脂溶性最高，作用快而短的是

- A: 巴比妥
- B: 苯巴比妥
- C: 戊巴比妥
- D: 硫喷妥

答案：D

77. 外阴阴道假丝酵母菌病宜选用

- A: 甲硝唑
- B: 制霉菌素
- C: 庆大霉素
- D: 林可霉素

答案：B

78. 提示并不存在风险，目前不需采取措施的信号属于

- A: 驳倒的信号
- B: 尚不确定的信号
- C: 确认的信号
- D: 部分确认信号

答案：A

79. 作为女性便秘型肠易激综合征者缓解症状的短期治疗药物是

- A: 乳果糖
- B: 聚乙二醇粉
- C: 替加色罗
- D: 洛哌丁胺

答案：C

80. 雷洛昔芬能有效地抑制破骨细胞活性，降低骨转换至妇女绝经前水平，其正确的用法与用量是

- A: 60mg, qd
- B: 60mg, bid
- C: 60mg, q4h
- D: 60mg, tid

答案：A

81. 以下有关 γ -GT 检查值升高的临床意义中，最正确的是

- A: 诊断恶性贫血
- B: 诊断急慢性白血病
- C: 诊断心肌梗死
- D: 诊断痛风

答案：C

82. (2017 年真题) 患者男, 65 岁, 身高 170cm, 体重 60kg, 经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测 (肌酐清除率 45ml/min), 诊断为 2 型糖尿病、肾功能不全, 该患者应首选的药物是

- A: 格列喹酮
- B: 格列吡嗪
- C: 格列齐特
- D: 格列本脲

答案：A

83. 杨某, 女, 19 岁, 咳嗽、有脓性痰, 并伴有胸痛; 发热 39℃; 肺闻及湿性罗音; WBC $>13 \times 10^9/L$ 。

- A: 肺结核

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 社区获得性肺炎

C: 支气管炎

D: 哮喘

答案：B

84. 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 乙酰半胱氨酸

B: 可待因

C: 溴己新

D: 右美沙芬

答案：D

85. 有助于提高医、护、药专业人员对 ADR 的警惕性和识别能力

A: 为临床药物评价提供依据

B: 促进新药的研制开发

C: 促进临床合理用药

D: 减少 ADR 的危害

答案：C

86. (2017 年真题) 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是 ()

A: 剂量递增尽可能采用最小有效剂量使不良反应减至最小

B: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判疗效

C: 当单药治疗无效时可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药

D: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/425344124130012033>