

# 2024 广西壮族自治区邕宁区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试真题【A 卷】

## 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于 A 级高危药品的是

- A: 全胃肠外营养液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 5%葡萄糖注射液
- D: 血液透析液

答案：B

2. 处方审核是处方调配中的重要环节，药师应确定处方内容正确无误后，方可进行药品调配。处方审核结果分为合理处方和不合理处方。不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。

- A: 使用“遵医嘱”字句
- B: 字迹难以辨认
- C: 无正当理由超说明书用药
- D: 联合用药不适宜

答案：C

3. 患儿，男，3 岁半，身高 95cm，体重 16kg 一天前开始发热，20h 左右出现腹泻，约 3h 一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。检查结果：体温 38.8℃，脉搏 118 次/分，呼吸 28 次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数  $18.5 \times 10^9/L$ （参考值  $4.0 \times 10^9/L - 10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 首选口服补液，必要时静脉补液
- B: 腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充电解质
- C: 益生菌应避免与小檗碱、鞣酸蛋白同时服用
- D: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与微生态制剂同时服用

**答案：D**

4. 维生素 D3 用于

- A: 防治佝偻病
- B: 防治夜盲症
- C: 习惯性流产的辅助治疗
- D: 防治坏血病

**答案：A**

5. 不宜与葡萄柚汁合用的药物是

- A: 左旋多巴
- B: 磺胺类药物
- C: 辛伐他汀
- D: 硫酸亚铁

**答案：C**

6. 冠心病患者如不能耐受 ACEI，可考虑给予

- A: 地高辛
- B: AR
- C:  $\beta$  受体激动剂
- D:  $\alpha$  受体拮抗剂

**答案：B**

7. 沟通医药患的重要纽带的是

- A: 静脉药物配置
- B: 治疗药物监测
- C: 处方调配
- D: 参与临床药物治疗

**答案：C**

8. 患者,女,45 岁,常有上腹部饱胀、恶心食欲不振等消化不良症状。宜选用的药物 ( )

- A: 奥美拉唑肠溶胶囊
- B: 蒙脱石散
- C: 干酵母片
- D: 复方阿嗪米特肠溶片

**答案：C**

9. 便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是

- A: 多库酯
- B: 番泻叶
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 硫酸镁

**答案：B**

10. 某男性,53 岁,参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛. 3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为  $500 \mu\text{mol} / \text{L}$ ; 足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 苯溴马隆
- B: 丙磺舒
- C: 别嘌醇
- D: 秋水仙碱

**答案：D**

11. 在检查尿沉渣的项目中，最能提示是肾实质性病变的证据是

- A: 尿沉渣结晶
- B: 尿沉渣磷酸盐
- C: 尿沉渣管型
- D: 尿沉渣白细胞

**答案：C**

12. 1 类手术切口应用第三代头孢菌素，应评判为

- A: 过度治疗用药
- B: 无适应证用药
- C: 联合用药不适宜
- D: 有禁忌证用药

**答案：B**

13. 乙型肝炎病毒核心抗体为

- A: 不能抑制 HBV 的增殖，出现在 HBsAg 转阴之后，证明人体对 HBsAg 有一定的免疫清除率的指标
- B: 乙型肝炎病毒感染早期血清中出现的一种特异性血清标记物
- C: 不能抑制 HBV 的增殖，可反映肝细胞受到 HBV 侵害后的一项指标
- D: 为一种保护性抗体，表明人体具有一定免疫力的指标

**答案：C**

14. 可干扰乙醇代谢过程，导致双硫仑样反应的药物是

- A: 咪康唑
- B: 酮康唑
- C: 甲硝唑

D: 氟康唑

**答案: C**

15. 有潜在的肺毒性的是

A: 双嘧达莫

B: 呋喃妥因

C: 氯苯那敏

D: 苯巴比妥

**答案: B**

16. 伴有高血压的患者应慎用的是

A: 氯苯那敏

B: 阿司匹林

C: 含伪麻黄碱的复方制剂

D: 对乙酰氨基酚

**答案: C**

17. 药学服务的具体内容不包括

A: 处方的审核与调配

B: 药品推销

C: 静脉药物配置

D: 药学信息收集

**答案: B**

18. 第二类精神药品处方印刷用纸为

A: 白色

B: 淡红色

C: 淡绿色

D: 淡黄色

**答案：A**

19. Hb 量 31~60g/L 可诊断为

A: 中度贫血

B: 基本正常

C: 轻度贫血

D: 重度贫血

**答案：D**

20. (2017 年真题) 下列关于烫伤救治措施的说送正确的是 ( )

A: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面, 以防创面感染

B: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染

C: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏

D: 烫伤患者的镇痛镇静药物首选氯丙嗪

**答案：C**

21. 患者，女，24 岁，已婚，因痤疮购药咨询，应告知患者对育龄妇女有严重的致畸作用，药师不应推荐的治疗药物是

A: 阿达帕林凝胶

B: 过氧化苯甲酰凝胶

C: 异维 A 酸片

D: 红霉素乳膏

**答案：C**

22. 患者，女，57 岁，患骨质疏松症伴 Paget 病，该患者避免使用的治疗药是

A: 雷洛昔芬

- B: 特立帕肽
- C: 鲑鱼降钙素
- D: 阿仑膦酸钠

**答案: B**

23. 高血压患者的降压目标部分有糖尿病、蛋白尿等高危患者的高血压  
( )

- A: <140 / 90mmHg
- B: <150 / 90mmHg
- C: <130 / 80mmHg
- D: <120 / 80mmHg

**答案: C**

24. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 西地兰
- B: 硝苯地平
- C: 多索茶碱
- D: 硝普钠

**答案: A**

25. 告知"人促红素可引起纯红细胞再生障碍性贫血"属于

- A: 新药信息
- B: 禁忌证
- C: 药品不良反应
- D: 药物相互作用

**答案：C**

26. 可用于治疗夜盲症的药物是

- A: 维生素
- B: 维生素 C
- C: 维生素 A
- D: 复合维生素 B

**答案：C**

27. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为  $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 风湿性关节炎
- B: 假性痛风
- C: 痛风
- D: 类风湿关节炎

**答案：C**

28. 老年人因血浆蛋白含量低，用药后游离型药物浓度可能明显增加的药物是

- A: 诺氟沙星
- B: 头孢克洛
- C: 华法林
- D: 阿莫西林

**答案：C**

29. 患者，女，55 岁，因家庭变故，情绪低落，晨起后较严重，近三个月有自杀倾向就诊，诊断为抑郁症，患者既往有高血压、冠心病史 5 年，目前服用卡托普利片、硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙片。本次就诊，医师处方文拉法辛缓释片 150mgqdpo，谷维素片 10mg tidpo 治疗，患者用药后出现血压升高，可能导致该患者血压升高的药物是

- A: 硝酸异山梨酯
- B: 文拉法辛缓释片
- C: 卡托普利片
- D: 谷维素片

**答案：B**

30. 下列哪种药物不会引起丙氨酸氨基转移酶 (ALT、GPT) 升高 ( )。

- A: 克林霉素
- B: 硝苯地平
- C: 氟康唑
- D: 阿昔洛韦

**答案：B**

31. 有卒中病史的急性冠状动脉综合征患者禁用

- A: 替格瑞洛
- B: 阿司匹林
- C: 普拉格雷
- D: 替罗非班

**答案：C**

32. (孕妇用药注意事项) 孕妇使用可导致胎儿甲状腺功能低下的药品是

- A: 甲巯咪唑
- B: 氮芥类

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

C: 胰岛素

D: 青霉素类

**答案：A**

33. 抗菌谱广，属于碳青霉烯类的药物是

- A: 克拉维酸
- B: 亚胺培南
- C: 氨曲南
- D: 头孢哌酮

**答案：B**

34. 下列药物中使用前无需皮试的是

- A: 抗狂犬病病毒血清注射剂
- B: 紫杉醇注射剂
- C: 苄星青霉素注射剂
- D: 抑肽酶注射剂

**答案：B**

35. 适宜与乳酶生配伍应用的药物是

- A: 磺胺类药
- B: 抗酸药
- C: 抗生素
- D: 干酵母

**答案：D**

36. 6 个月～2 岁儿童的白细胞计数的正常范围值

- A:  $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- B:  $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- C:  $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- D:  $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$

**答案：D**

37. 运动员长期使用可提高疼痛忍耐力，但易导致成瘾和呼吸抑制的兴奋剂是

- A: 可待因
- B: 人促红细胞生成素
- C: 氢氯噻嗪
- D: 苯丙酸诺龙

**答案：A**

38. 急性脑血管病中病死率最高的疾病为

- A: 脑梗死
- B: 短暂性脑缺血发作
- C: 脑出血
- D: 原发性蛛网膜下腔出血

**答案：C**

39. 高血压伴痛风患者慎用的药物是（）

- A: 卡托普利
- B: 硝苯地平
- C: 氢氯噻嗪
- D: 普萘洛尔

**答案：C**

40. 患者男，78 岁实施右侧髋关节置换术，术后第 10 日，患侧下肢出现肿胀、疼痛，诊断为深静脉血栓。该患者应选用的药物是（）

- A: 依诺肝素
- B: 阿司匹林

C: 氯吡格雷

D: 血凝酶

**答案: A**

41. “沟通技能”在药学服务工作中最重要的作用是

A: 应对投诉作用

B: 用药监督作用

C: 药物警戒作用

D: 双向交流作用

**答案: D**

42. 患者，男，35 岁。血压 180/100mmHg，经服硝苯地平及血管紧张素转化酶抑制剂治疗 3 周后血压降至 120/80mmHg，关于停药的问题应是

A: 可以停药降压药

B: 为避免血压下降过低，应停药

C: 停药后血压增高再服

D: 继续服药，血压平稳控制 1~2 年后再逐渐减少剂量至停药 1 种药，如血压不稳定，即表明需长期服用能保持血压稳定的最小剂量

**答案: D**

43. 特异体质者应当慎用解热镇痛药，其机制是用药后可能发生

A: 出血

B: 过敏反应

C: 虚脱

D: 惊厥

**答案: B**

44. 可作为根除幽门螺杆菌感染的一线治疗方案是:

- A: 埃索美拉唑 20mgqd+克拉霉素 1.0gqd+枸橼酸铋钾 0.6gbid  
B: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgbid+阿莫西林 1.0gbid+枸橼酸铋钾 0.6gbid  
C: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mg tid+枸橼酸铋钾 0.6gbid  
D: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgqd+阿莫西林 0.5gtid

**答案：B**

45. 早期 AD 患者选用

- A: 司来吉兰  
B: 普拉克索  
C: 加兰他敏  
D: 金刚烷胺

**答案：C**

46. 主要用于丙烯腈、氟化物、一氧化碳等中毒的解毒剂是

- A: 双解磷  
B: 盐酸烯丙吗啡  
C: 谷胱甘肽  
D: 亚硝酸钠

**答案：C**

47. 易受光线影响而变质的药品

- A: 冰硼散  
B: 氰化钾  
C: 肝素  
D: 安乃近

**答案：C**

48. 有过敏反应，有磺胺类药物过敏史的患者忌用的降糖药是

- A: 格列吡嗪
- B: 西格列汀
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

**答案：A**

49. 能显示药师的文献评价能力和技巧的咨询服务方法步骤是

- A: 对查阅的资料进行评价、分析和整理
- B: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- C: 对问题进行确定并归类
- D: 随访工作效果，并建立档案

**答案：A**

50. 药师应告知医师“合理用药信息”的事例是

- A: 他汀类药物合用吉非贝齐或烟酸致横纹肌溶解症
- B: 培氟沙星引起跟腱炎，合用糖皮质激素可致跟腱断裂
- C: 氟西汀或帕罗西汀与异烟肼等单胺氧化酶抑制剂合用引起 5-羟色胺综合征
- D: 头孢菌素类之间无共同抗原决定簇；如头孢哌酮皮试阳性者头孢曲松钠皮试阴性

**答案：D**

51. 哮喘急性发作的首选药为

- A: 布地奈德?
- B: 沙美特罗?
- C: 沙丁胺醇?
- D: 福莫特罗?

**答案：C**

52. (2021 年真题) 患者, 男, 45 岁, 因消化不良 (上腹饱胀, 餐后明显) 来药店咨询。下列说法错误的是 ( )

- A: 进餐时不要摄入过多的液体
- B: Hp 感染是引起消化不良的常见原因
- C: 应除外器质性疾病
- D: 可用助消化药对症治疗

**答案：B**

53. 患儿, 女, 4 岁半, 身高 110cm, 体重 15KG, 一天前发热 (39℃), 咽喉痛, 无咳嗽、吐血, 家长主诉在家中应用退烧药治疗, 发病左右出现腹泻, 约 2~5 次大便, 量少, 黄色粘液便, 呕吐一次。体格检查: T38.8℃, P118 次/分, R28 次/分。咽微充血, 出现轻脱水症状。双肺呼吸音清, 腹平软, 肝脾未触及, 肠鸣音活跃, 实验室检查: WBC:  $5 \times 10$

- A: 消化不良性腹泻
- B: 动力性腹泻
- C: 感染性腹泻
- D: 分泌性腹泻

**答案：C**

54. 处方按性质可分为

- A: 法定处方、麻醉药品处方
- B: 法定处方、医师处方
- C: 法定处方、普通处方
- D: 普通处方、协定处方

**答案：B**

55. 填报 ADR / ADE 报告描述的时间

- A: 采取措施干预不良反应的时间
- B: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果
- C: 患者疾病发病时间
- D: 患者用药记录

**答案：A**

56. 效用指标是患者主观满意程度（质量调整生命年或质量调整预期寿命），着重与分析医疗成本与患者生活质量提升的关系是指

- A: 成本-效用分析
- B: 最小成本分析
- C: 成本-效益分析
- D: 最大效果分析

**答案：A**

57. 重要器官或系统功能有严重损害、缩短或危及生命，应判为

- A: 轻度
- B: 重度
- C: 弱轻度
- D: 中度

**答案：B**

58. 容易引起脱发

- A: 博来霉素
- B: 氟尿嘧啶
- C: 白消安
- D: 柔红霉素

**答案：D**

59. 若空腹服药，则胃排空快，药物在短时间内进入十二指肠与小肠；餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃粘膜的刺激。因此，一般药品适宜餐后服用。

- A: 餐中服用
- B: 清晨服用
- C: 餐前服用
- D: 餐后服用

**答案：C**

60. 适用于各种类型的心绞痛

- A: 普萘洛尔
- B: 利多卡因
- C: 地高辛
- D: 硝酸酯类

**答案：D**

61. 下列五种内服药品中，应在餐前服用的药物是

- A: 氨茶碱片
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 呋塞米片
- D: 吡罗昔康片

**答案：B**

62. 下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是"药物制剂因素"的是

- A: 排钾利尿药增加心脏对强心苷的敏感性

B: 输液中颗粒物引起肺部异物肉芽肿

C: 阿司匹林与华法林同服会增加出血风险

D: 以 50%乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的作用

**答案：B**

63. 适用于肝性脑病及长期卧床的老年便秘患者的药物是

A: 甘油栓

B: 硫酸镁

C: 比沙可啶

D: 乳果糖

**答案：D**

64. 影响药酶代谢、增强药物作用而危及安全用药的是

A: 西咪替丁+格列本脲

B: 多潘立酮+维生素 C

C: 四环素+硫酸亚铁

D: 青霉素+丙磺舒

**答案：A**

65. 女，30 岁。G2P1 既往月经规律，月经量少，身体健康，要求长期采取避孕措施。

A: 改变宫颈黏液性状

B: 抑制卵巢排卵

C: 阻止精子与卵子相遇

D: 影响受精卵着床

**答案：D**

66. 发挥局部作用的栓剂是

- A: 甘油栓
- B: 盐酸克伦特罗栓
- C: 阿司匹林栓
- D: 吲哚美辛栓

**答案：A**

67. 布桂嗪属于

- A: 镇痛药
- B: 利尿剂
- C: 血管扩张药
- D: 抗组胺药

**答案：A**

68. 用于前列腺增生症的高选择性  $\alpha_1A$  受体阻断剂是（）

- A: 索利那新
- B: 坦索罗辛
- C: 特拉唑嗪
- D: 托特罗定

**答案：B**

69. （2015 年真题）患者，女，55 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 的药物是（）。

- A: 布洛芬
- B: 双氯芬酸
- C: 塞来昔布
- D: 吲哚美辛

**答案：C**

70. 审核后判为合理处方，应该

- A: 拒绝调配处方，依照有关规定报告
- B: 调配处方并发药
- C: 依照处方调配药品
- D: 拒绝调配处方

**答案：B**

71. 适合睡前服用的是

- A: 吲哚美辛
- B: 氟伐他汀
- C: 奥利司他
- D: 多潘立酮

**答案：B**

72. 为防止血管扩张、促进毒物吸收。应用 1%氯化钠溶液洗胃应该避免的是

- A: 最多不超过 500ml
- B: 溶液事先加热
- C: 多次反复进行冲洗
- D: 减小注入压力

**答案：B**

73. 治疗药物选择的基本原则及方法叙述错误的是

- A: 给药方便性可能影响患者对治疗的依从性
- B: 经济性方面主要考虑药费，排除其他治疗成本
- C: 有效性是选择药物的首要标准
- D: 用药安全是药物治疗的前提

**答案：B**

74. (2016 年真题) 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院、目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是（）。

- A: 阿司匹林
- B: 氯吡格雷
- C: 肝素
- D: 利伐沙班

**答案：A**

75. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%，尿分析见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 慢性肾盂肾炎
- B: 急性膀胱炎
- C: 急性肾小球肾炎
- D: 急性肾盂肾炎

**答案：D**

76. 外阴阴道假丝酵母菌病宜选用

- A: 制霉菌素
- B: 林可霉素
- C: 庆大霉素
- D: 甲硝唑

**答案：A**

77. 6 个月～2 岁婴幼儿白细胞计数正常参考区间是

- A:  $(200 \sim 300) \times 10^9 / \text{L}$
- B:  $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / \text{L}$
- C:  $(100 \sim 300) \times 10^9 / \text{L}$
- D:  $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9 / \text{L}$

**答案：D**

78. 香豆素类抗凝血药

- A: 氯吡格雷
- B: 华法林
- C: 利伐沙班
- D: 肝素

**答案：B**

79. 相互作用延缓或降低抗药性的联合用药是

- A: 阿托品联用普萘洛尔
- B: 青蒿素联用乙胺嘧啶
- C: 阿托品联用氯磷定
- D: 普萘洛尔联用硝苯地平

**答案：B**

80. 一般情况下，老年人应该控制总胆固醇测定值低于

- A: 5.1mmol/L
- B: 6.1mmol/L
- C: 6.2mmol/L
- D: 5.2mmol/L

**答案：D**

81. 患者，男，52岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

- A: 左旋氨氯地平
- B: 比索洛尔
- C: 氟伐他汀
- D: 雷米普利

**答案：D**

82. 老年痴呆症选用

- A: 多奈哌齐
- B: 佐匹克隆
- C: 丙戊酸钠
- D: 布桂嗪

**答案：A**

83. 药物相互作用有发生在体内的药动学、药效学方面的作用；亦有发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

- A: 利福平
- B: 伊曲康唑
- C: 异烟肼
- D: 红霉素

**答案：A**

84. 急性或轻型肝炎时，肝功能检查结果可能显示的是

- A: AST 下降
- B: ALT 下降
- C: AST/ALT 比值 $<1$
- D: AST/ALT 比值 $>1$

**答案：C**

85. 痛风慢性期应长期使用的促尿酸排泄药是

- A: 丙磺舒
- B: 别嘌醇
- C: 阿司匹林
- D: 秋水仙碱

**答案：A**

86. 药师应具备的素质中，开展药学服务工作的关键是()。

- A: 良好的教育背景
- B: 交流沟通能力
- C: 药历制订、修改
- D: 高尚的职业道德

**答案：B**

87. 高血压合并冠心病，偶发窦性心动过速宜选用的药物是

- A: 非洛地平
- B: 氢氯噻嗪
- C: 缬沙坦
- D: 美托洛尔

**答案：D**

88. 可治疗原发性痛经的药物是

- A: 钙通道阻滞剂
- B: 非甾体抗炎药
- C: 肾上腺糖皮质激素
- D: 前列腺素类似物

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/426004243055011030>