

护理三基三严试题及答案

1、尿毒症病人在纠正酸中毒过程中常易发生抽搐，其主要原因是（ ）（ ）

- A、常口服氢氧化铝凝胶致钙吸收减少
- B、尿毒症肠炎腹泻致血钙下降
- C、血磷增高致血钙相对降低
- D、血浆清蛋白降低致血钙减少
- E、碱性环境中游离血钙降低

答案：E

2、小儿体格发育最快的时期在（ ）（ ）

- A、新生儿期
- B、婴儿期
- C、幼儿期
- D、学龄前期
- E、学龄期

答案：B

3、关于灌肠的注意事项，下列哪项不正确（ ）（ ）

- A、为病人解除便秘时，液体应保留 5-10 分钟
- B、为病人降温时，液体的温度宜为 4℃
- C、保留灌肠宜保留 1 小时以上
- D、大量不保留灌肠的压力宜为 40?60cmH₂O
- E、肝性脑病病人不能用肥皂水灌肠

答案：B

4、下列哪一种为急性扁桃体炎的主要并发症（ ）

- A、扁桃体周围脓肿
- B、急性喉炎
- C、心肌炎
- D、关节炎
- E、咽旁脓肿

答案：A

5、患儿女，8 个月。因“发热、咳嗽伴气促”来诊，诊断为肺炎入院。为防止患儿发生并发症，护士应重点观察（ ）

- A、睡眠状况
- B、进食量
- C、大小便次数
- D、心率、呼吸的变化

E、咳嗽频率及轻重

答案：D

6、调节毛细血管内、外水分正常分布的是（ ）

A、血浆胶体渗透压

B、血浆晶体渗透压

C、血浆钠离子浓度

D、组织液晶体渗透压

E、组织液胶体渗透压

答案：A

7、法律上的护士不必须具备的条件是（ ）

A、护理专业技术人员

B、经过考试，取得《护士执业证书》的护士

C、从事临床生活护理工作的护理员

D、被医疗机构聘用并已完成注册的护士

答案：C

8、患儿女，生后7天，诊断为新生儿黄疸收入院行蓝光照射治疗。光疗时，护士应特别注意的是（ ）（ ）

A、保护眼睛

B、及时喂养

C、监测血压

D、保持安静

E、皮肤清洁

答案：A

9、乳房出现质硬、固定、边界不清的肿块时，最可能的诊断是（ ）

A、乳腺癌

B、纤维腺瘤

C、乳腺小叶增生

D、纤维囊性乳腺病

E、脂肪瘤

答案：A

10、最常见的咯血原因是（ ）（ ）

A、支气管扩张

B、慢性支气管炎

C、肺结核

D、支气管肺癌

E、风湿性心脏病二尖瓣狭窄

答案：C

11、反映早期休克比较敏感的指标是（ ）（ ）

A、血压

B、脉搏

C、皮肤温度

D、意识

E、尿量

答案：B

12、毒蛇咬伤最有效的局部早期处理方法是（ ）（ ）

A、胰蛋白酶局部注射或套封

B、拔除毒牙

C、伤口近心端肢体结扎

D、局部伤口烧灼

E、局部外敷中草药

答案：A

13、8岁男孩，开水烫伤。双下肢有水疱，剧痛，胸腹部为红斑。估计该患儿II度烫伤面积是（ ）

A、20%

B、41%

C、42%

D、46%

E、59%

答案：C

14、口服给药的注意事项下列哪项正确（ ）（ ）

A、铁剂、阿司匹林宜饭前服

B、止咳糖浆服后宜多饮水

C、磺胺类药服后应多饮水

D、强心苷类药物服药前要先测血压

E、镇静安神药宜清晨空腹服用

答案：C

15、患儿女，6个月。高热，中毒症状明显。呻吟，双肺有中细湿啰音，诊断为支气管肺炎，其抗生素应用至体温正常后（ ）

A、1~2天

B、3~4天

- C、5~7 天
- D、8~10 天
- E、11~14 天

答案：C

16、下列哪项是卵巢肿瘤最常见的并发症（ ）（ ）

- A、蒂扭转
- B、破裂
- C、感染
- D、恶变
- E、腹膜炎

答案：A

17、要素膳是（ ）

- A、低蛋白膳食
- B、化学配制膳
- C、需经胃肠道消化
- D、低脂肪膳食
- E、低盐膳食

答案：B

18、近距离后装治疗直肠癌护理不当的有（ ）

- A、治疗前两天嘱病人进食半流质
- B、放施源器前应两次清洁灌肠
- C、施源器放入病变部位后须固定好
- D、嘱病人收缩腹部以防施源器下移
- E、治疗结束后嘱病人卧床休息 20~30 分钟

答案：D

19、发生溶血反应时患者排出浓茶样尿液，主要是因为尿液中含有（ ）

- A、大量陈旧血液
- B、胆红素
- C、淋巴液
- D、血红蛋白
- E、血红素

答案：D

20、尸体料理中，错误的是（ ）（ ）

- A、根据医师的死亡诊断进行尸体料理
- B、劝慰家属暂时离开病房

- C、撤去治疗用物，使尸体去枕仰卧
- D、全身抹洗，穿好衣裤，梳理头发
- E、包裹好尸体，系好尸体识别卡

答案：C

21、患者，女，27岁，因高热、腰痛、尿频、尿急来医院门诊，其尿常规检查可能是（ ）（ ）

- A、尿蛋白
- B、低比重尿
- C、红细胞管型
- D、镜下血尿
- E、脓尿

答案：E

22、再生障碍性贫血引起贫血最主要的原因是什么（ ）

- A、造血原料缺乏
- B、无效性红细胞生成
- C、红细胞破坏过多
- D、骨髓造血功能低下
- E、失血

答案：D

23、对一位正在鼻出血的病人首先采用的治疗方法是（ ）

- A、找出出血原因
- B、局部止血
- C、输血
- D、补液
- E、全身用止血药

答案：B

24、肾性急性肾衰竭最常见的原因是（ ）（ ）

- A、急性肾小球性肾炎综合征
- B、肾血管性疾病
- C、严重的急性间质性肾炎
- D、急性肾小管坏死
- E、慢性肾脏疾病的急性发作

答案：D

25、张某，妊娠32周，产前检查发现为臀先露胎位，护士应指导其采取（ ）（ ）

- A、头低脚高位
- B、截石位
- C、侧卧位
- D、胸膝卧位
- E、俯卧位

答案：D

26、为病人吸痰时导致缺氧加重，每次抽吸的时间应（ ）（ ）

- A、<10 秒
- B、<15 秒
- C、<30 秒
- D、<1 分钟
- E、<3 分钟

答案：B

27、烧伤休克补液治疗，第 1 个 8 小时输入 24 小时补液计划总量的（ ）
（ ）

- A、1/4
- B、1/3
- C、1/2
- D、2/3
- E、2/5

答案：C

28、输入血制品前不需要进行血型鉴定和交叉配血试验的是（ ）（ ）

- A、浓集红细胞
- B、红细胞悬液
- C、洗涤红细胞
- D、血浆
- E、全血

答案：D

29、下述哪项不属“五味”的内容（ ）

- A、酸
- B、苦
- C、甘
- D、辛
- E、甜

答案：E

30、急诊分诊护理体检不包括下列哪项内容（ ）

- A、观察病人的意识、精神状态
- B、查看双侧瞳孔
- C、测量生命体征
- D、实验室检查

答案：D

31、癫痫持续状态的首选药物是（ ）（ ）

- A、苯妥英钠，缓慢静脉注射
- B、异戊巴比妥钠，缓慢静脉注射
- C、副醛，缓慢静脉注射
- D、10%水合氯醛，保留灌肠
- E、地西泮，缓慢静脉注射

答案：E

32、护理白血病病人最重要的是（ ）（ ）

- A、注意出血
- B、高热处理
- C、预防感染
- D、观察病情变化
- E、记录药物反应

答案：C

33、病人由于呼吸道分泌物阻塞所致呼吸困难和烦躁不安，在处理上哪项不适当（ ）

- A、立即给病人氧气吸入
- B、将病人半卧位协助咳嗽排痰
- C、立即肌肉注射吗啡 10mg 镇静
- D、立即鼻导管吸痰
- E、给予雾化吸入，必要时纤维支气管镜下吸痰

答案：C

34、患儿，6岁，突然高热，发病 5h 后反复抽搐，四肢凉，血压下降，项强（士），血白细胞计数 $21 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断为（ ）（ ）

- A、流行性乙型脑炎
- B、恶性疟疾
- C、高热惊厥
- D、中毒性菌痢
- E、病毒性脑膜炎

答案：D

35、高压氧治疗的绝对禁忌证是（ ）

- A、肺结核
- B、有颅骨缺损者
- C、未经处理的气胸
- D、收缩压 $>150\text{mmHg}$
- E、体温 $>38^{\circ}\text{C}$

答案：C

36、患儿2岁，4d前发热，流涕、咳嗽，结膜充血，畏光，今晨发现耳后及颈部有淡红色斑丘疹，体温 38.9°C ，两颊黏膜充血。最可能的诊断是（ ）
（ ）

- A、风疹
- B、幼儿急疹
- C、猩红热
- D、肠道病毒感染
- E、麻疹

答案：E

37、舌后坠引起的呼吸困难主要的抢救措施是（ ）

- A、头低侧卧位
- B、清除口腔分泌物
- C、将舌牵向口外
- D、环甲膜穿刺
- E、气管切开

答案：C

38、体温骤降时，病人最易出现（ ）（ ）

- A、虚脱
- B、头痛
- C、谵妄
- D、昏迷
- E、寒战

答案：A

39、下列哪项不属于肾病综合征尿检查结果（ ）

- A、尿蛋白（+++）或更多
- B、选择性或非选择性蛋白尿
- C、不同程度血尿

- D、尿糖（+++）或更多
- E、尿纤维蛋白降解产物增多

答案：D

40、病人的出入水量除记录在护理记录单上以外，还应记录于（ ）（ ）

- A、入院评估单
- B、护理计划单
- C、护理措施实施单
- D、三测单
- E、医嘱记录单

答案：D

41、患儿，男，1岁5个月，因急性肺炎住院，肌内注射选择的最佳部位是（ ）（ ）

- A、上臂三角肌下缘
- B、臀大肌
- C、臀中肌、臀小肌
- D、股内侧肌
- E、三角肌

答案：C

42、前列腺摘除术后，停止膀胱冲洗的最佳时间为（ ）

- A、肉眼观察无血尿 10 日
- B、肉眼观察无血尿 7 日
- C、肉眼观察无血尿 5 日
- D、肉眼观察无血尿 2 日
- E、肉眼观察无血尿

答案：D

43、下列哪种情况属于急诊血液透析的禁忌证（ ）（ ）

- A、 $BUN > 30 \text{ mmol/L}$
- B、 $Cr > 908 \mu \text{ mol/L}$
- C、血钾 $> 6.5 \text{ mmol/L}$
- D、严重酸中毒
- E、休克

答案：E

44、高热患者应用冰袋降温时，冰袋不能放置在（ ）

- A、头顶
- B、前额

- C、腋下
- D、心前区
- E、腹股沟

答案：D

45、患者，女性，50岁，输血15min后感觉头胀、四肢麻木、腰背部剧痛，脉细弱，血压下降，下列护理措施不正确的是（ ）

- A、减慢输血速度
- B、立即通知医师
- C、热水袋敷腰部
- D、观察血压、尿量
- E、取血标本和余血送检血型鉴定和交叉试验

答案：A

46、尿毒症性高钾血症最有效的治疗方法是（ ）（ ）

- A、静脉滴注碳酸氢钠
- B、静脉滴注葡萄糖酸钙
- C、静脉滴注高渗葡萄糖和胰岛素
- D、血液透析
- E、口服钠型阳离子交换树脂

答案：D

47、8岁女孩，阵发性剑突下钻顶样痛4h，伴恶心呕吐，既往有类似发作史。查体：体温37.5℃，剑突下深压痛，无腹肌紧张。首先考虑为（ ）（ ）

- A、肝内胆管结石
- B、胆道蛔虫病
- C、胆总管结石
- D、急性胆管炎
- E、胆囊结石

答案：B

48、需要同时服用下列药物时，应最后服用的是（ ）（ ）

- A、维生素C
- B、维生素B1
- C、止咳糖浆
- D、头孢拉定
- E、复方阿司匹林

答案：C

49、铺备用床时下述哪项不必要（ ）（ ）

- A、评估同室病友有无进餐、治疗或换药
- B、按便于操作的原则折叠好各被单
- C、按使用先后摆放好各单
- D、核对床号、姓名
- E、扫净床上渣屑

答案：D

50、某病人今晨距小腿关节扭伤，局部青紫，为防止皮下出血与肿胀，早期应选用（ ）（ ）

- A、局部按摩
- B、红外线照射
- C、冷湿敷
- D、热湿敷
- E、热水袋热敷

答案：C

51、患者，女性，孕1产0，孕41周，胎儿估计3400g，骨盆测量：坐骨结节间径7cm，出口后矢状径6.5cm，耻骨弓角度小于90°，对其处理正确的是（ ）（ ）

- A、行会阴侧切术
- B、产钳术
- C、行剖宫产术
- D、等待自然分娩
- E、静脉滴注缩宫素

答案：C

52、急性亚硝酸盐类中毒的特效解毒药是（ ）（ ）

- A、亚甲蓝
- B、纳洛酮
- C、氟马西尼
- D、乙酰胺
- E、二巯丙磺酸钠

答案：A

53、患者，男，70岁。右侧腹股沟可复性肿块15年。患者有长期便秘史和吸烟史。肿块在站立位时明显，平卧位时消失，肿块可进入阴囊，可还纳。查体：右腹股沟区肿块，大小约6cm×8cm，质软，可还纳。外环口可容2指，压迫内环口后，肿块不再出现。透光试验阴性。该患者可能的诊断是（ ）（ ）

- A、右侧腹股沟斜疝

- B、右侧股疝
- C、右侧腹股沟直疝
- D、睾丸鞘膜积液
- E、精索静脉曲张

答案：A

54、关于阑尾的叙述，正确的是（ ）

- A、经阑尾孔开口于盲肠下端
- B、位于右髂窝，是腹膜间位器官
- C、阑尾附于结肠起始部
- D、阑尾根部是3条结肠带集中处
- E、动脉来自肠系膜下动脉

答案：D

55、患者，女性，34岁，肾移植手术后5d突然出现高热、精神萎靡、血尿、尿量减少，血压升高，要考虑（ ）（ ）

- A、超急排斥反应
- B、急性排斥反应
- C、慢性排斥反应
- D、继发性感染
- E、静脉血栓形成

答案：B

56、下列哪项不是白血病的临床表现（ ）

- A、发热
- B、出血
- C、血糖降低
- D、贫血
- E、器官浸润

答案：C

57、下列哪种胎位分娩最困难（ ）（ ）

- A、右枕前位
- B、右枕后位
- C、左骶后位
- D、左骶前位
- E、颏后位

答案：E

58、混合毒类毒蛇是（ ）（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/426041031030010050>