

2024 湖北省罗田县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库含答案 AB 卷

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列药物中，具有肝药酶诱导作用的是

- A: 咪康唑
- B: 异烟肼
- C: 克林霉素
- D: 利福平

答案：D

2. 某患者，男，25 岁，苯二氮

- A: 硫酸钠
- B: 间羟胺
- C: 氟马西尼
- D: 亚甲蓝

答案：C

3. 某女性，19 岁，2 年前因上呼吸道感染后逐渐出现甲状腺肿大，伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁，根据血 T

- A: 单纯性甲状腺肿
- B: 亚急性甲状腺炎
- C: 甲状腺功能亢进
- D: 甲状腺功能减退

答案：C

4. 孕妇用药应该格外谨慎，在不同孕期药物对胚胎和胎儿的影响不同，一般情况下，用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

A: 3 个月之后

B: 21 天之内

C: 18 天之内

D: 28 天之内

答案：C

5. (2018 年真题) 患者，女，21 岁，近半年来食欲亢进，多汗体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次/分，化验结果：血清促甲状腺素 (TSH) $<0.1\text{mU/L}$ ，FT3、FT4 明显升高，肝肾功能基本正常，白细胞计数正常，诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是 ()

A: 选用 ^{131}I 治疗

B: 甲状腺次全切除手术

C: 注意休息补充营养，使用甲巯咪唑治疗

D: 碘化钾治疗，定期复查

答案：C

6. 指本次不良反应经采取相应的医疗措施后的结果；如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，此栏应填"好转"

A: 不良反应 / 事件的结果

B: 用药起止时间

C: 用药原因

D: ADR/ADE 过程描述

答案：A

7. 药物相互作用使药物吸收增加的联合用药事例是

- A: 青蒿素联用乙胺嘧啶
- B: 铁剂联用维生素
- C: 阿托品联用普萘洛尔
- D: 硝苯地平联用普萘洛尔

答案：B

8. IV级临床研究的结论或II、III级临床研究的推论属于

- A: D级
- B: B级
- C: E级
- D: C级

答案：D

9. 在中成药活胃胶囊、神曲胃痛片、陈香白露片、复方陈香味片、复方田七胃痛片中，所含有的共同组分是

- A: 碳酸镁
- B: 氢氧化铝
- C: 氧化镁
- D: 碳酸氢钠

答案：D

10. (2018 年真题) 患者,男,46 岁,拟行肠道手术,术前 1 天使用导泻药的方法是 ()

- A: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射
- B: 50%硫酸镁溶液口服
- C: 5%氯化钙注射液静脉滴注

D: 50%葡萄糖注射液湿敷

答案：B

11. 以下治疗手足浅表性真菌感染的药物中，尤其适用于角化皲裂型足癣的处方药是

A: 依沙吡啶

B: 尿素

C: 苯甲酸

D: 特比萘芬

答案：D

12. 在药学信息服务中，三级信息源资料的最突出的优势是

A: 提供的信息丰富、详实

B: 能看到研究细节如试验设计、数据处理等

C: 内容广泛、使用方便

D: 内容全面、细致

答案：C

13. 痛风患者的尿液常见

A: 酪氨酸和亮氨酸结晶

B: 磷酸盐结晶

C: 尿酸盐结晶

D: 草酸盐结晶

答案：C

14. 患者，男，72 岁。体重 75kg，1 小时前出现右上肢体活动不利，半小时后自行缓解。查体：血压 210/90mmHg；检查结果示：糖化血红蛋白 9.3%，血肌酐 143.2 $\mu\text{mol/L}$ 。既往有高血压、糖尿病、心病病史。诊断为短暂性脑缺血发作。

- A: 阿替普酶
- B: 阿司匹林联合氯吡格雷
- C: 氯吡格雷
- D: 阿司匹林

答案：B

15. 患者，男，36 岁，因发热、咳嗽就诊，查血常规：白细胞计数 $6.28 \times 10^9/\text{L}$ ，中性粒细胞百分比 65.7%，淋巴细胞百分比 15.1%。诊断为感冒。医生处方：阿奇霉素片 0.5g qd po. 该处方属于()

- A: 用法、用量不适宜
- B: 有禁忌证用药
- C: 有配伍禁忌
- D: 无适应证用药

答案：D

16. 治疗腹痛较重或反复呕吐性腹泻宜选用的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 双歧杆菌
- C: 泛昔洛韦
- D: 山莨菪碱

答案：D

17. 在流行期间多见于小儿及老年体弱者

- A: 胃肠型

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

B: 肺炎型

C: 病毒型

D: 神经型

答案: B

18. 下列关于药物对孕妇的影响哪一项是错误的

- A: 孕妇不应过量服用含咖啡因的饮料
- B: 孕妇患有结核、糖尿病应绝对避免药物治疗以防胎儿畸形
- C: 受精后 3 周至 3 个月接触药物，最易发生先天畸形
- D: 受精后半月内，几乎见不到药物的致畸作用

答案: B

19. 服药期间饮茶可降低疗效的药品是

- A: 硫酸亚铁
- B: 西咪替丁
- C: 格列本脲
- D: 维生素

答案: A

20. 痛风缓解期在关节炎症控制 1~2 周开始使用

- A: 别嘌醇
- B: 阿司匹林
- C: 丙磺舒
- D: 秋水仙碱

答案: A

21. 出血性脑血管病患者的卧床休息时间，脑出血

- A: 2~4 周
- B: 2~3 周
- C: 1~2 周

D: 4~5 周

答案：A

22. 与两性霉素 B 合用需要严密监测血钾

A: 强心苷

B: 酮康唑

C: 链霉素

D: 碳酸氢钠

答案：A

23. 以下对“发热指标”的叙述中，不正确的是

A: 口腔温度超过 37.3℃

B: 直肠温度超过 37.6℃

C: 腋下温度超过 37.0℃

D: 腋下温度超过 36.6℃

答案：D

24. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

- A: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd，疗程 6 周
- B: 优先选择法莫替丁 20mgqn，疗程 8 周
- C: 优先选择法莫替丁 20mgbid，疗程 8 周
- D: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd，疗程 4 周

答案：D

25. 伴有心脏病、高血压者应慎用的药品是

- A: 含伪麻黄碱的抗感冒药
- B: 含咖啡因的抗感冒药
- C: 含氯苯那敏的抗感冒药
- D: 含右美沙芬的抗感冒药

答案：A

26. (2016 年真题) 患者，女，35 岁，在不知怀孕的情况下服用诺氟沙星胶囊。经询问，获知其服药时间距末次月经时间是 20 天。该用药行为对胎儿可能造成的影响是 ()。

- A: 牙齿色素沉着
- B: 流产或发育成正常胚胎
- C: 腭裂
- D: 骨骼发育异常

答案：B

27. 患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

- A: 甲硝唑餐后服用

- B: 甲硝唑餐前服用
- C: 质子泵抑制剂餐后服用
- D: 铋剂餐后服用

答案：A

28. 关于三酰甘油的临床意义说法不正确的是

- A: 血清三酰甘油增高可提示动脉硬化及高脂血症
- B: 大量饮酒可使三酰甘油出现假性升高
- C: 长期饥饿或食用高脂肪食品可导致三酰甘油升高
- D: 应用雌激素、避孕药可出现三酰甘油减少

答案：D

29. 稚嫩、柔弱，喹诺酮类药物可致关节痛及关节肿胀、软骨损害

- A: 血液系统
- B: 水盐代谢
- C: 内分泌系统
- D: 运动系统

答案：D

30. 将药物治疗成本和所产生的效益规划为以货币为单位的数字，进行药物经济学评价。这一评价方法属于()

- A: 成本-效用分析
- B: 成本-效果分析
- C: 成本-效益分析
- D: 最小成本分析

答案：C

31. 反复性偏头痛，推荐应用的药物是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 地西泮
- B: 谷维素
- C: 阿司匹林
- D: 罗通定

答案：D

32. 另有草药专辑、营养品专辑、眼药专辑、非处方药和食品补充剂专辑的是

- A: 《中国国家处方集（2010 年版）》
- B: 《医师案头参考》
- C: 《英国国家处方集》
- D: 《国家基本药物处方集（2012 年版）》

答案：B

33. 属于胃黏膜保护剂的是（）

- A: 埃索美拉唑
- B: 法莫替丁
- C: 铝碳酸镁
- D: 多潘立酮

答案：C

34. 在与患者进行沟通的过程中，切忌的事项是

- A: 尽量避免使用专业术语
- B: 认真聆听
- C: 可提供一些宣传资料
- D: 一次性尽量提供更多的信息

答案：D

35. 属于雄激素受体拮抗剂，使增生的前列腺体积缩小的药品

- A: 黄酮哌酯
- B: 非那雄胺
- C: 氟他胺
- D: 阿夫唑嗪

答案：C

36. 过敏性结膜炎者宜选用的滴眼液是

- A: 色甘酸钠
- B: 碘苷
- C: 维生素 B2
- D: 磺胺醋酰钠

答案：A

37. 用于颠茄类生物碱中毒的解救药物是

- A: 亚甲蓝
- B: 毛果芸香碱
- C: 阿托品
- D: 碘解磷定

答案：B

38. 以下所列药物中，有腹泻的 2 岁以下儿童不宜使用的是

- A: 洛哌丁胺
- B: 盐酸小檗碱
- C: 鞣酸蛋白
- D: 双歧三联活菌制剂

答案：A

39. 关于口服避孕药的使用，下列说法不正确的是（）

- A: 应用复方短效口服避孕药者，停药后即可妊娠
- B: 口服避孕药引起的类早孕反应，一般不需特殊处理，坚持服药数个周期后可自然消失
- C: 口服避孕药引起的不规则阴道出血，如流血偏多者，每晚在服用避孕药同时加服雌激素直至停药
- D: 口服避孕药中的雌激素可使 HDL-C 降低

答案：D

40. 用于消渴的中成药中可能添加的化学药成分是

- A: 吡嗪酰胺
- B: 格列本脲
- C: 苯巴比妥
- D: 阿卡波糖

答案：B

41. 男性，45 岁。反复发生夜间呼吸困难 1 个月，加重一天就诊，体格检查：血压 180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 支气管哮喘还是心源性哮喘
- B: 双肺炎症还是肺间质纤维化
- C: 肺心病还是冠心病
- D: 慢性支气管炎还是急性支气管炎

答案：A

42. 抗利尿药

- A: 硝酸甘油
- B: 去氨加压素

C: 胃黏膜保护剂

D: 甘草合剂

答案: B

43. 患者，男，35 岁，因支气管哮喘入院，经正规治疗后病情缓解，仅偶尔胸闷，出院时医嘱如下。

A: 酮替芬

B: 异丙托溴铵气雾剂

C: 氨茶碱

D: 丙酸倍氯米松气雾剂

答案: B

44. 可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

A: 形成答案并以口头形式提供给询问者

B: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

C: 对问题进行确定并归类

D: 随访了解效果，并建立档案

答案: D

45. 对中重度痤疮伴感染显著者推荐使用

A: 0.03%维 A 酸乳膏剂

B: 红霉素-过氧苯甲酰凝胶

C: 0.1%阿达帕林凝胶

D: 10%过氧苯甲酰凝胶

答案: C

46. 因耐药率高而很少单独使用的肺炎治疗药物是

A: 亚胺培南

- B: 青霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 克拉霉素

答案：D

47. 不能耐受胃肠反应的贫血患者，铁剂适宜服用的时间为

- A: 两餐间
- B: 睡前
- C: 餐后
- D: 餐前

答案：C

48. 药品不良反应的诱因主要是药物因素与患者因素。预防不良反应须采取多项措施

- A: 注意 ADR 症状，尤其是迟发反应
- B: 注意定期监测器官功能
- C: 注意特殊人群用药
- D: 了解患者及其家族的过敏史

答案：A

49. 铅中毒

- A: 1%氯化钠溶液
- B: 5%碳酸氢钠溶液
- C: 1%硫酸镁溶液
- D: 药用炭混悬液

答案：C

50. 提示有明确的风险，有必要采取措施以降低风险的信号属于

- A: 部分确认信号
- B: 确认的信号
- C: 驳倒的信号
- D: 尚不确定的信号

答案：B

51. 贫血患者常出现()
- A: 中性粒细胞增多
 - B: 血小板计数增多
 - C: 嗜酸性粒细胞增多
 - D: 血红蛋白减少

答案：D

52. 患者，女，22 岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛 1 天就诊。查体：体温 38.6℃，脉搏 90 次 / 分，呼吸 24 次 / 分，血压正常；双肺布满湿啰音。实验室检查：WBC $11 \times 10^9 / L$ ，胸片显示斑片状浸润性阴影。既往无过敏史。选用有效抗生素治疗后 2 天，体温恢复正常，咳痰减少。

- A: 慢性阻塞性肺病
- B: 支气管炎
- C: 医院获得性肺炎
- D: 社区获得性肺炎

答案：D

53. 适用于哺乳期女性避孕，推荐于正常月经周期的前 5 天给药的是
- A: 口服左炔诺孕酮(1.5mg)
 - B: 口服低剂量孕激素避孕药(炔诺酮 0.35mg)
 - C: 短效复方口服避孕药

D: 甲羟孕酮 150mg 肌内注射

答案: D

54. 可用红霉素的敏感性预测自身敏感性的药物是

A: 头孢洛林

B: 替考拉宁

C: 克拉霉素

D: 阿莫西林

答案: C

55. (抗癫痫药物的选择)，癫痫全身强直阵挛发作的一线用药是

A: 乙琥胺

B: 加巴喷丁

C: 卡马西平

D: 扑米酮

答案: C

56. 经检查，某患者 A/G（白蛋白/球蛋白） <1 ，提示患者可能患有

A: 胃肠炎

B: 慢性肝炎

C: 胆囊炎

D: 胰腺炎

答案: B

57. 患者向药师咨询停用口服避孕药后多久可备孕。下列答复中正确的是()

A: 复方短效口服避孕药停药后即可备孕

B: 长效避孕药停药后即可备孕

C: 复方短效口服避孕药停药 6 个月后方可备孕

D: 复方短效口服避孕药停药 3 个月后方可备孕

答案: A

58. 伴有过敏性鼻炎、阿司匹林哮喘可选用的药物是

A: 沙丁胺醇

B: 孟鲁司特

C: 异丙托溴铵

D: 沙美特罗

答案: B

59. 患者，女，35 岁，在不知怀孕的情况下服用诺氟沙星胶囊。经询问，获知其服药时间距末次月经时间是 20 天。该用药行为对胎儿可能造成的影响是()

A: 腭裂

B: 骨骼发育异常

C: 牙齿色素沉着

D: 流产或发育成正常胚胎

答案: D

60. 患者男 56 岁因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊查体舌面光滑,呈牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素 B12 水平下降, 下列药物中不会影响维生素 B12 吸收的是()

A: 奥美拉唑

B: 对氨基水杨酸

C: 二甲双胍

D: 氨氯地平

答案: D

61. 长期使用可降低血小板数量，可引起紫癜的药物是

- A: 文拉法辛
- B: 阿苯达唑
- C: 氟西汀
- D: 卡马西平

答案：B

62. 阿昔洛韦可导致药源性肾病的机制是

- A: 阻塞肾小管、肾小球
- B: 肾间质纤维化
- C: 前列腺素合成障碍
- D: 不可逆性肾小管坏死

答案：A

63. 吸烟后促使儿茶酚胺释放，降低其吸收的药物是

- A: 胰岛素
- B: 西咪替丁
- C: 氯丙嗪
- D: 呋塞米

答案：A

64. （2016 年真题）患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

- A: 每天用药最多不应超过 4 次，用药不超过 3 天
- B: 每天用药最多不应超过 5 次，用药不超过 3 天

C: 每天用药最多不应超过 3 次，用药不超过 3 天

D: 每天用药最多不应超过 6 次，用药不超过 3 天

答案：A

65. 甲状腺危象应选用的药物是

A: 胰岛素

B: 二甲双胍

C: 大剂量碘剂

D: 格列本脲

答案：C

66. 单核细胞正常参考区间是

A: 0.20~0.40

B: 0.03~0.08

C: 0.01~0.05

D: 0~0.01

答案：B

67. 适宜进餐时给药，可以减少脂肪吸收率的药物是

A: 多潘立酮

B: 氢氧化铝

C: 奥利司他

D: 甲氧氯普胺

答案：C

68. 可能影响儿童骨骼发育的药物是

A: 华法林

B: 头孢克洛

C: 诺氟沙星

D: 阿莫西林

答案: C

69. 患者，男，72 岁，患有阿尔茨海默病，给予卡巴拉汀每日 3mg 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是（）

A: 每日早晚空腹口服

B: 每日清晨空腹口服

C: 每日早晚与食物同服

D: 每晚睡前口服

答案: C

70. （2016 年真题）患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”，“慌张步态”及“小字症”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是（）。

A: 普拉克索

B: 司来吉兰

C: 左旋多巴

D: 多奈哌齐

答案: C

71. 1 个半衰期给药 1 次；如需要立即达到稳态，可首剂加倍针对

A: 半衰期小于 30 分钟

B: 半衰期大于 24 小时

C: 半衰期 8~24 小时

D: 半衰期大于 30 小时

答案: C

72. 患者，男，62 岁，糖尿病病史 7 年，长期使用胰岛素、二甲双胍治疗，近期为控制血压加服治疗药物，该患者不宜应用的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 普萘洛尔
- C: 洛伐他汀
- D: 卡托普利

答案：B

73. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L(正常参考范围 <7.8mmol / L)，甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考范围 0.56~1.70mmol / L)，总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考范围 <5.2mmol / L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.18mmol / L(正常参考范围 2.1~3.1mmol / L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L(正常参考范围 1.2~1.65mmol / L)，血肌酐 50 μmol / L(正常参考范围 45~84 μmol / L)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 不必限盐
- B: 控制体重
- C: 减少脂肪摄入
- D: 适当运动

答案：A

74. 急需查询输液剂的配伍禁忌，首选的书籍是

- A: 《注射药物手册》
- B: 《药物流行病学》
- C: 《药物治疗学：病理生理学的方法》
- D: 《新编药理学》

答案：A

75. 赵某，男性，60 岁，既往高血压病史 8 年。与邻居吵架后突然起病，言语不清、左侧肢体无力、意识不清。查体：BP210 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激阳性，左侧肢体无法活动，左侧巴宾斯基征阳性。

- A: 脑血栓形成
- B: 缺血性脑卒中
- C: 脑出血
- D: 短暂性脑缺血发作

答案：C

76. 患者，女，62 岁，医师处方如下：

- A: 阿卡波糖
- B: 氨氯地平
- C: 氯吡格雷
- D: 二甲双胍

答案：C

77. 某患者，男，65 岁，高血压病史 5 年，先后服用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日曾饮酒和饮用多种饮料，出现血压波动的情况，到医院就诊。

- A: 可降低心源性死亡的危险
- B: 有明显的肝肾毒性
- C: 为第一代短效钙通道阻滞剂
- D: 建议单独用于不稳定性心绞痛

答案：C

78. 药师应掌握处方中常用的外文缩写，“必要时”用药的缩写是()

- A: qd
- B: qid
- C: prn
- D: qn

答案：C

79. 属于胆酸螯合剂的调节血脂药是

- A: 依折麦布
- B: 考来替泊
- C: 氯贝丁酯
- D: 阿昔莫司

答案：B

80. 酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之对中枢神经出现抑制，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加发生不良反应的几率。

- A: 克林霉素
- B: 庆大霉素
- C: 呋喃唑酮
- D: 依替米星

答案：C

81. 含有马兜铃酸的中药，可引起的典型药源性疾病是

- A: 消化性溃疡
- B: 溶血性贫血
- C: 慢性肾衰竭
- D: 粒细胞减少症

答案：C

82. 用药期间粪便呈橘红至红色的药物是

- A: 利福平
- B: 硫酸钡
- C: 水杨酸钠
- D: 氢氧化铝制剂

答案：A

83. 妇女绝经后骨质疏松症的激素替代治疗方案为

- A: 钙剂+维生素 D+雌激素
- B: 钙剂+维生素 D+降钙素
- C: 钙剂+维生素 D+甲状旁腺激素
- D: 钙剂+维生素 D+双磷酸盐

答案：C

84. 对 A 组 β 溶血性链球菌有抗菌活性，但由于抗菌谱广，且过度使用可能延迟结核病的诊断，增加结核分枝杆菌对该类药物的耐药性，不建议用于常规治疗的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 阿奇霉素
- C: 克林霉素
- D: 莫西沙星

答案：D

85. 服用维生素 B1、维生素 B2、烟酸等应该禁用的饮食是

- A: 食盐

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

B: 食醋

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/426134142054011030>