静脉治疗理论考核试题

一、选择题

1.输注药物与生理盐水不相容时，应先使用（）冲洗，再使用生理盐水[单选题]*

A、5% 葡萄糖注射液 √

B、无菌注射用水

C、生理盐水肝素溶液

D、10% 葡萄糖

2.暂不使用的外周静脉导管，应间隔（）冲封管 1 次[单选题]*

A、12h

B、24h √

C、48h

D、72h

3.双腔及多腔导管的冲封管宜（）[单选题]*

A、单手同时冲封管 √

B、双手同时冲封管

C、未使用的腔无需冲封管

D、隔日进行冲封管

4.输液接头每次连接前应用机械法用力擦拭消毒输液接头的（）[单选题]*

A、横截面

B、外围

C、横截面和外围 √

D、内面

5.中心静脉导管拔除后应用无菌敷料密闭穿刺点至少（），（）后[单选题]*

A、12h，12h

B、24h，24h √

C、12h，24h

D、24h，48h

6.保持管路连接端口清洁，在输血和输入血制品（）h，或停止输液后，应及时更换输液管路，特殊药物输注时，应根据产品说期书要求更换。[单选题]*

A、2

B、4 √

C、24

D、48

7.紧急状态下置管，若不能保证有效的无菌原则，导管应在（）小时内尽快拔除。[单选题]*

A、24

B、48 √

C、72

D、96

8.输液接头包括（）、（）和（）。[单选题]*

A、无针接头、肝素帽和三通接头 √

B、有针接头、肝素帽和三通接头

C、无针接头、肝素接头和三通接头

D、无针接头、肝素帽和多通接头

9.无针接头按内部机制可分为（）接头和（）接头。[单选题]*

A、分隔膜接头和机械阀接头 √

B、分膜接头和机械阀接头

C、分隔膜接头和机械接头

D、分膜接头和阀接头

10.更换无针输液接头的频率不应过于频繁，一般（）天更换一次。[单选题]*

A、3-7

B、2-7

C、5-7 √

D、6-7

11.针接头应选用消毒棉片多方位用力擦拭（）s 并待干。[单选题]*

A、7-15

B、2-15

C、10-15

D、5-15 √

12.PICC，CVC，PORT 附加的肝素帽或无针接头应至少（）更换 1 次。[单选题]*

A、3d

B、5d

C、7d √

D、6d

13.如何决定输液接头功能类型冲管、关闭以及断开注射器的顺序（）[单选题]*

A、参照产品说明书 √

B、统一冲管→夹闭→断开

C、统一冲管→断开→夹闭

D、无需遵循任何顺序

14. 中心静脉导管拔管时宜将病人置于（）或仰卧位。[单选题]*

A、半卧位

B、头低仰卧位 √

C、头偏向一侧卧位

D、头低足高卧位

15. 留置针应留置多长时间拔除（）. [单选题]*

A、72 小时

B、96 小时

C、48 小时

D、不宜仅以留置时间长短作为导管拔除依据 √

16. 以下可以拔出外周静脉导管的人员是（）. [单选题]*

A、具有执业资质的医护人员 √

B、即将毕业的实习护士

C、实习护士

D、有经验的护士

17. 中心静脉导管拔出后应用无菌敷料密闭穿刺点至少（）小时。[单选题]*

A、4 小时

B、12 小时

C、24 小时 √

D、48 小时

18.静脉导管堵塞时哪一种须立即拔除（）。[单选题]*

A、PVC √

B、PICC

C、PORT

D、CVC

19.中心静脉导管拔出后患者护理措施（）[单选题]*

A、患者拔管后可立即活动

B、患者拔管后保持平卧 30 分钟 √

C、患者拔管后保持平卧 1 小时

D、患者拔管后保持平卧 10 分钟

20.评估穿刺局部皮肤完整性，上肢有无（）等炎症表现，臂围有无（），以判断是否存在感染、血栓、外渗渗出等并发症。[单选题]*

A、红、肿、痛，变化

B、肿、热、痛，变化

C、红、肿、热、痛，变化 √

D、红、肿、热，变化

21.对粘胶过敏，皮肤病变及皮肤完整性受损的患者，可选用（），必要时可选择（）等治疗性敷料。[单选题]*

A、油纱敷料，水胶体

B、IV3000，水胶体 √

C、纱布敷料，银离子

D、纱布敷料，水胶体

22.静脉导管纱布敷料至少每（）更换 1 次。[单选题]*

A、3d

B、2d √

C、1d

D、4d

23.静脉导管透明敷料至少每（）更换 1 次。若穿刺部位发生渗液渗血及敷料出现卷边、松动、潮湿、污染、完整性受损时应及时更换。[单选题]*

A、3-7d

B、2-7d

C、6-7d

D、5-7d √

24.穿刺操作前，使用任何消毒液时，均应（）[单选题]*

A、消毒后立即穿刺

B、消毒液自然待干 √

C、吹干

D、用手扇干

25.PICC 维护时选择的消毒液不包括（）[单选题]*

A、75% 酒精

B、安尔碘

C、葡萄醛酸氯已定

D、碘伏

E、双氧水 √

26.对于皮肤完整性受损的患者，应如何消毒（）.[单选题]*

A、直接碘伏消毒

B、先用无菌生理盐水清洗，再用 0.5% 碘伏消毒 √

C、先用无菌生理盐水清洗，再用 75% 酒精消毒

D、直接冲洗

27.PICC 出现穿刺口感染时处理哪项不正确（）。[单选题]*

A、顺穿刺口向下挤脓

B、穿刺口涂抗菌药膏 √

C、碘伏湿敷

D、使用银离子抗菌敷料外贴穿刺口

28.PICC 导管敷料出现松脱时，应（）.[单选题]*

A、及时回院更换 √

B、自行更换

C、剪掉松脱部分

D、自行贴回

29.PICC 导管固定采用（）.[单选题]*

A、纵向固定

B、S 或 U 型固定 √

C、J 型固定

D、不用摆型

30.PICC 维护导管时皮肤消毒范围（）.[单选题]*

A、10 ×10cm

B、8 ×8cm

C、15 ×15cm 两侧至臂缘 √

D、5 ×5cm

31.导管维护时应严格执行（）。[单选题]*

A、无菌操作 √

B、查对

C、有无置管史

D、经济状况

32.PICC 导管维护时先用 75% 酒精脱脂清洁皮肤方法（）[单选题]*

A、顺一逆一顺 √

B、顺一顺一逆

C、逆一顺一顺

D、逆一顺一逆

33.导管维护时，何时进行手消毒?（）[单选题]*

A、去除旧敷料后 √

B、贴无菌敷料后

C、洗手操作前

D、戴无菌手套后

34.专家共识发布于哪一年?C[单选题]*

A、2017 年

B、2018 年

C、2019 年 √

D、2020 年

35.PICC 导管封管液的选择（）。[单选题]*

A、0.9% 生理盐水

B、20u/ml 肝素盐水

C、肝素钠

D、0.9% 生理盐水或 10u/ml 肝素盐水 √

36.PICC 导管维护时使用何种注射器进行冲封管（）。[单选题]*

A、3ml 注射器

B、5ml 注射器

C、10ml 及以上注射器 √

D、50ml 注射器

37.输液(血)治疗过程中，输注（）等对血管刺激较大的液体后，宜进行（）。[单选题]*

A、黏稠、高渗、中药制剂、抗生素，冲管 √

B、黏稠、中药制剂、抗生素，冲管

C、高渗、中药制剂、抗生素，冲管

D、黏稠、高渗、抗生素，冲管

38.外周静脉导管，宜使用（）封管，尤其是对于凝血功能异常、血液系统疾病及肝功能异常的患者。[单选题]*

A、0.09%NS

B、5%GNS

、5%GS

D、0.9%NS

39.应采用脉冲式冲管，即（）方法冲洗导管。[单选题]*

A、停-停-推

B、推-停-推 √

C、停-推

D、推-推-推

40.双腔及多腔导管宜单手同时（）[单选题]*

A、滴注

B、冲封管 √

C、封管

D、冲管

41.中心静脉导管，PICC/CVC 可用（）的肝素溶液封管。[单选题]*

A、0-10u/ml √

B、>10u/ml

C、15u/ml

D、20u/ml

42.暂不使用的外周静脉短导管，应间隔（）冲封管 1 次。[单选题]*

A、12h

B、24h √

C、4h

D、48h

治疗间歇期的 PICC，至少（）冲封管 1 次。[单选题]*

A、1 天

B、2 天

C、1 周

D、2 周

44.封管液量应为导管及附加装置管腔容积的（）倍.[单选题]*

A、1 倍

B、1.2 倍 √

C、1.4 倍

D、2 倍

45.导管使用前首先应（）。[单选题]*

A、冲管

B、观察穿刺部位

C、评估导管功能 √

D、脉冲式冲管

46.保持管路连接端口清洁，在输血和输入血制品（）h，或停止输液后，应及时更换输液管路，特殊药物输注时，应根据产品说期书要求更换。[单选题]*

A、2

B、4 √

C、24

D、48

47.患者纱布换药的更换（）。[单选题]*

、48h

B、96h

C、7 天

D、每天更换

48.输液接头包括无针接头、肝素帽和?（）[单选题]*

A、头皮针

B、三通接头 √

C、留置针

D、输液器

49.导管更换敷料频率叙述正确的是?（）[单选题]*

A、纱布敷料至少每 2d 更换一次 √

B、透明敷料至少每 3 天更换一次

C、若穿刺部位发生渗液用棉签吸干不用及时更换敷料

D、PORT 敷料应每 3 周更换一次

50.以下哪些静脉导管使用前不需要回抽血（）[单选题]*

A、. 留置针 √

B、. PICC

C、. CVC

D、. 输液港

51.下列关于冲封管的说法错误的是（）[单选题]*

A、. 使用不含防腐剂的生理盐水进行冲管

B、. 冲封管液应严格一人一用一弃

、. 间断输液及每次输液前均应冲管

D、. 输液结束后无需冲管直接进行封管

52.冲管时，使导管内形成涡流的方式是（）[单选题]*

A、. 正压封管

B、. 脉冲式冲管 √

C、. 冲管时旋转头皮针翼

53.静脉导管敷贴更换时间正确的是（）[单选题]*

A、. 纱布辅料至少每 2 天更换一次

B、. 透明敷料至少 5-7 天更换一次

C、. 若卷边、潮湿、完整性受损应及时更换

D、. 以上都正确 √

54.关于冲封管以下说法错误的是（）[单选题]*

A、. 治疗间歇期 PICC 一般每周维护一次

B、. 暂不使用的外周静脉导管应间隔 24h 冲封管一次，并根据需求尽快拔除

C、. 治疗间歇期输液港一般 4 周维护一次

D、. 双腔导管冲管只需冲洗使用的那一侧 √

55.患者在使用输液港期间，多久换一次药?（）[单选题]*

A、7 天 √

B、14 天

C、30 天

56.输液港使用的穿刺针是什么针?（）[单选题]*

A、留置针

、头皮针

C、蝶翼针

D、采血针

57.下列关于输液港穿刺插针操作错误的是（）[单选题]*

A、针头必须垂直刺入，以免针尖刺入输液港侧壁

B、穿刺动作轻柔，感觉有阻力不可强行进针，以免针尖与注射座底部推磨，形成倒钩

C、注射、给药前无需抽回血，输液通畅即可√

D、穿刺成功后，应妥善固定穿刺针，不可任意摆动，防止穿刺针从穿刺隔中脱出

58.对于不同类型的无针接头，执行不同的夹闭程序，下列说法正确的是?（）[单选题]*

A、正压无针街头，分离注射器后再夹闭导管√

B、正压无针接头，分离注射器前夹闭导管

C、等压无针接头，要要依赖冲管技术，一定要在分离注射器前夹闭

59.中心静脉导管拔除时的体位及位置（）[单选题]*

A、拔管时应将导管出口部位（如颈部、手臂），高于患者心脏水平

B、拔管时宜将患者置于头低仰卧位或仰卧位√

C、拔管时宜将患者置于侧卧位

60.对于双腔及多腔导管如何封管（）[单选题]*

A、先封完一腔导管，再到另一腔导管

B、宜采用单手同时冲封管√

C、一般采用双手封管

61.导管冲洗液量原则上应为导管及附加装置内腔容积总和的（）以上。[单选题]*

A、1 倍

、2 倍

C、3 倍

D、1.2 倍

62.封管液量应为导管集附加装置容积的（）。[单选题]*

A、1 倍

B、2 倍

C、3 倍

D、1.2 倍 √

63.治疗间歇期的 PICC，至少（）冲管 1 次。[单选题]*

A、3 天

B、5 天

C、7 天 √

D、24 小时

64.暂不使用的外周静脉导管，应间隔（）冲管 1 次。[单选题]*

A、4 小时

B、6 小时

C、8 小时

D、24 小时 √

65.治疗间歇期的输液港（PORT)，至少（）冲管 1 次。[单选题]*

A、1 周

B、4 周 √

C、2 个月

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/427053015005006156