

2025 年执业药师考试《中药学专业知识一》真题及答案

一、最佳选择题(共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。)

1.表示药物有软坚散结、泻下通便作用的味是（ D ）

A.辛

B.苦

C.酸

D.咸

E.甘

2.根据方剂组方原则,下列关于使药作用的说法,正确的是（ A ）

A.引方中诸药直达病所

B.消除君臣药烈性

C.协助君臣要加强治疗作用

D.直接治疗次要兼证

E.与君药药性相反而又能在治疗中起想成作用

3.莪术药材的事宜采收期是（ A ）

A.秋冬季地上部分枯萎后

B.春末夏初时节

C.桓物光合作用旺盛期

D.花完全盛开时

E.花冠由黄变红时

4.宜用酸水提取,加碱调至碱性后可从水中沉淀析出的成分是（ C ）

A.香豆素类

B.黄酮类

C.生物碱类

D.蒽类

E.木质素类

5.川乌经炮制,其生物碱类成分结构改变,毒性降低。所发生的化学反应是（ C ）

A.氧化反应

B.还原反应

C.水解反应

D.聚合反应

E.加成反应

6.含有吡咯里希啉类生物碱,且有肝、肾毒性的中药是（ C ）

A.防己

B.延胡索

C.何首乌

D.千里光

E.王不留行

7.《中国药典》规定，以苦杏仁苷为含量测定指标成分的中药是（ C ）

A.益智

B.薏苡仁

C.郁李仁

D.酸枣仁

E.沙苑子

8.丹参中的脂溶性有效成分是(E)

A.丹参素

B.丹参酸甲

C.原儿茶酸 n 向

D.原杀醛

E.丹参酮 II A

9.《中国药典》规定顿含量指标成分是(A)

A.异秦皮啶

B.阿魏酸

C.莪术醇

D.柴胡

E.葛根素

10.《中国药典》规定，以总黄酮为含量测定成分的中药是（ B ）

A.三七

B.槐花

C.五味子

D.细辛

E.天仙子

11.具过氧桥结构,属倍半萜内酯类的化合物是(E)

A.青蒿素

B.天麻素

C.常山碱

D.小檗碱

E 青蒿素

12.含胆酸的中药是(B)

A.蟾酥

B.牛黄

C.水蛭

D.地龙

E.僵蚕

13.山药治疗脾虚久泻，宜选用的炮制方法是(C)

A.炒黄

B.砂炒

C.土炒

D.炒炭

E.炒焦

14.醋炙柴胡的目的是(C)

A.助其发散,增强解熟用

B.助其升浮,增强升阳作用

C.助其升散,增强疏肝作用

D.抑制浮阳,增强清肝作用

E.引药入肝,增强滋阴作用

15.水火共制时,采用焯煑制法法进行炮制的中药是(C)

A.白附子

B.槐花

C.苦杏仁

D.苍耳子

E.天南星

16.两弹形时,采用炒黄法的中药品(A)

A.芥子

B.蒲黄

C.大蓟

D.荆芥

E.枳壳

17.斑蝥具有毒为降低其性彩的炮制方法为(D)

A.土炒

B.砂炒

C.蛤粉炒

D.米炒

E.滑石

18.根头部具有横环纹,习称“蚯蚓头”的药材是(A)

A.防风

B.川芎

C.柴胡

D.太子参

E.白术

19.不经胃肠道给药的剂型是(C)

A.肛门栓

B.糖浆剂

C.舌下片

D.颗粒剂

E.胶囊剂

20.散剂性生产贮藏有关规定错误的是(E)

A.儿科围应为最细粉

B.局部用散剂应为最细粉

C.多剂量包装的散剂应附分剂量用具

D.含挥发油药物的散剂应密封贮藏

E.含易吸潮终码散剂应密闭贮藏

21.液体制剂质量要求错误的是(A)

A.口服混悬剂的沉降体积比应不超过 3.0%

B.干混悬剂按干燥失重法测定,减失重量不得过 2.0%

C.干混悬剂按品种项下规定的比加水振摇应均匀分散

D.凡检查含量均匀度的口服混悬剂一般不再进徊装量检查

E.凡检查含量均匀度的口服混悬剂,不再进行沉降体积比检查

22.注射剂中别亚硫酸钠的目的是(B)

- A.减轻疼痛
- B.防止药物氧化
- C.调解 ph 值
- D.防止药物冰解
- E.抑制微生物增殖

23.在体温下软化并可缓慢溶解于分泌液的栓剂基质是(B)

- A.半合成让苍子油脂四
- B.甘油明胶
- C.半合成椰子油脂
- D.可可豆脂
- E.半合成棕榈

24.除另有定外,不需要检查溶散时限的丸剂是(E)

- A.水来
- B.糊丸
- C.滴丸
- D.浓缩丸
- E.大蜜丸

25.除另有规定外,应检查溶出度的颗粒剂是(E)

- A.肠溶颗粒
- B.缓释颗粒
- C.控释颗粒
- D.泡腾颗粒
- E.混悬颗粒

26.除另有规量,应检查融变时限的别是(B)

- A.咀嚼片
- B.阴道片

C.泡腾片

D.口崩

E.分散片

27.既可内服又外用的剂型由(B)

A.钉剂

B.锭剂

C.条剂

D.棒剂

E.丹剂

28 用于比较药物不同制剂中吸收速度的药物动力学参数(D)

A.药物的总清除率

B.药物的生物半衰期

C.药物的表观分布容积

D.药物的血药浓度一时间曲线下面积更准确

E.药物血药浓度达峰时间

29.主要有效成份是绿原酸,异绿原酸的清热药是(D)

A.知母

B.黄芩

C.苦参

D.金银花

E.连翘

30.具有性激素样作用的补虚药是由(C)

A.麦冬


B.白术

C.鹿茸

D.龟甲

E.北沙参

31.试卷附图 1-5,图中所行师药为威灵仙的是(B)



32.切面淡棕色,略呈角质样而油润,中心维管束木质部较大,黄白色,其外围有多数黄白

色状维管束，断续排列成 2 轮~4 轮的饮片是（ C ）

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.

A.白薇

B.细辛

C.牛膝

D.白术

E.天麻

33.根呈圆柱形,略扭曲,长 10cm~20cm,直径 0.2cm~0.5cm,上部多有显著的横皱纹,

下部较细,有纵皱纹及支根痕,味甚苦的药材是（ C ）

A.泽泻


B.板蓝根

C.龙胆

D.南沙参

E.防风

34.试卷附图中，图示中药味桑白皮的是（ B ）





35.药用部位为干燥小叶的药材是

- A.艾叶
- B.枇杷叶
- C.番泻叶
- D.紫苏叶
- E.蓼大青叶

36.略呈研棒状长~2cm,花冠圆球形,花瓣 4,覆瓦状抱合圆柱形,略扁,红棕色， 气芳香浓

烈的药材是(C)

- A.辛夷

B.山银花

C.丁香

D.西红花

E.槐米

37.呈扁圆形或扁椭圆形,表面紫红色或紫褐色,平滑有光泽,一端凹陷,可见线形种脐,另一端微细突起,合点的药材是由(C)

A.郁李仁

B.桃仁

C.酸枣仁

D.砂仁

E.薏苡仁

38.肉苁蓉饮片可见(A)

A.淡棕色或棕黄色纤维状维管束,排列成波状环纹

B.棕色与白色纤维相间,排列成大理石样花纹

C.黄白色维管束小点,排列成环状

D.棕色形成层环,近方形或近圆形

E.黄白色维管束,排列成双卷状

39.以动物的病理产物入药的药材是(D)

A.鸡内金

B.万应蚕

C.五灵脂

D.马宝

E.桑螵蛸

40.矿物药的本色指的是(A)

A.由物的成分和内部结构所决定的颜色

B.有外来的带色杂质、气泡等包裹体所引起的颜色

C.矿物在白色瓷板上划过后留下的粉末痕迹的颜色

D.由解理面或断口引起的反射光与入射光的干涉作用而产生的颜色

E.由晶体内部裂缝及表面氧化膜的反射光引起与入射光的干涉作用而产生的颜色

二、配伍选择题(共 60 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用，也可不选用。每题只有 1 个备选项最符合题意。)

【41-43】

- A.能补、能缓
- B.能泄、能坚
- C.能软、能下
- D.能收、能涩
- E.能散、能行

41.酸味的作用特点是(D)

42.苦味的作用特点是(B)

43 甘味的作用特特点是(A)

【44-45】

- A.四川
- B.云南
- C.广东
- D.河南
- E.浙江

44.地黄的道地药材产地是 (D)

45.玄参的道地药材产地是 (E)

【46-47】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/427111134030010025>