

2024 年山西省《执业药师之西药学专业二》 资格考试必刷 200 题真题附答案（满分必刷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列药物可用于治疗小细胞肺癌首选的是

- A: 长春新碱
- B: 替尼泊昔
- C: 依托泊昔
- D: 奥沙利铂

答案：C

2. 抗真菌药与糖皮质激素合用于皮肤病，感染症状消失后，应

- A: 再持续使用 48h
- B: 再持续使用 1 个月
- C: 立即停药，不得再用
- D: 再持续 1~2 周

答案：D

3. 可引起眼睛疼痛不适的是

- A: 氨溴索
- B: 异丙托溴铵
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 茶碱

答案：B

4. (2019 年真题) 减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状，其所激动的受体是 ()

- A: N 受体
- B: α 受体
- C: H 受体
- D: M 受体

答案：B

5. 坦洛新与华法林合用，华法林游离药物浓度增加，这是因为二者竞争

- A: CYP3A4
- B: p 一糖蛋白
- C: 血浆蛋白
- D: UGT287

答案：C

6. 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时，适宜的服药时间是 ()

- A: 餐前即刻
- B: 清晨或睡前
- C: 餐中
- D: 餐后 2h

答案：C

7. 可与阿司匹林发生相互作用的是

- A: 丙酸萆酮
- B: 坎利酮
- C: 伐地那非
- D: 呋塞米

答案：B

8. (2018 年真题) 低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐, 宜选用的止吐治疗方案是 ()

A: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松, 化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

B: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

C: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦, 化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松

D: 化疗前使用昂丹司琼, 化疗后不需要继续使用止吐药

答案：D

9. (2018 年真题) 蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性, 临床应用的解毒方案是 ()

A: 在用柔红霉素同时, 使用柔红霉素等量的右雷佐生

B: 在用柔红霉素前 30min, 使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生

C: 在用柔红霉素后 30min, 使用柔红霉素 2 倍量的右雷佐生

D: 在用柔红霉素前 30min, 使用柔红霉素 2 倍量的氟马西尼

答案：B

10. 可用于单纯疱疹性角膜炎的药物是

A: 碘苷

B: 20% 甘露醇

C: 阿托品

D: 奥布卡因

答案：A

11. (2021 年真题) 关于美罗培南使用注意事项的说法, 错误的是 ()

- A: 有其他 β -内酰胺类药物过敏性休克史的患者禁用
- B: 可用于治疗妊娠期呼吸系统感染
- C: 肝功能不全者需调整剂量
- D: 与中枢神经系统 γ -氨基丁酸受体的亲和力较亚胺培南弱，故癫痫等中枢神经系统不良反应的发生率显著低于亚胺培南

答案：C

12. 匹维溴铵在使用中应注意

- A: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗
- B: 对食管有刺激性，需整片吞服
- C: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用
- D: 糖尿病患者避免使用

答案：B

13. (2016 年真题) 属于 α_1 受体阻断剂的抗良性前列腺增生症的药品是

- A: 普适秦
- B: 酚妥拉明
- C: 度他雄胺
- D: 特拉唑嗪

答案：D

14. 属于棘白菌素类的是

- A: 制霉菌素
- B: 卡泊芬净
- C: 特比萘芬
- D: 氟胞嘧啶

答案：B

15. 属于第二代 CCB 的是

- A: 左旋氨氯地平
- B: 硝苯地平控释片
- C: 乐卡地平
- D: 氨氯地平

答案：B

16. 用于各种原因引起的干咳，成人一次 10~15mg 的药物是

- A: 右美沙芬
- B: 可待因
- C: 地塞米松
- D: 苯丙哌林

答案：A

17. 因抑制 P-糖蛋白使地高辛浓度增加 70%~100%的是

- A: 硫酸镁
- B: 呋塞米
- C: 克拉霉素
- D: 胺碘酮

答案：D

18. 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺

- A: 甲硫咪唑
- B: 卡比马唑
- C: 碳酸锂
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

19. (2018 年真题) 阿哌沙班属于 ()

- A: 凝血因子 X 抑制剂
- B: 维生素 K 拮抗剂
- C: 直接凝血酶抑制剂
- D: 环氧酶抑制剂

答案：A

20. 治疗支原体肺炎、军团菌病、百日咳和白喉带菌者首选

- A: 庆大霉素
- B: 红霉素
- C: 氯霉素
- D: 链霉素

答案：B

21. 长期用药易发生低镁血症的药物是 ()

- A: 奥美拉唑
- B: 胶体果胶铋
- C: 替普瑞酮
- D: 复方碳酸钙

答案：A

22. (2020 年真题) 可引起心脏 Q-T 间期延长的药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 克林霉素
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 头孢呋辛

答案：A

23. 抗酸作用较强，有收敛、止血和引起便秘作用

A: 氢氧化铝

B: 氢氧化镁

C: 碳酸钙

D: 三硅酸镁

答案：A

24. （2020 年真题）关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

A: 能降低血清前列腺特异性抗原（PSA）水平

B: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮

C: 易引起直立性低血压

D: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发

答案：C

25. （2020 年真题）主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

A: 特比萘芬

B: 制霉菌素

C: 联苯苄唑

D: 阿莫罗芬

答案：A

26. 抗酸作用较强、较慢，有导泻作用的是

A: 碳酸钙

B: 三硅酸镁

C: 氢氧化铝

D: 氢氧化镁

答案: D

27. 应用雌激素时需要停药指征是

A: 性欲改变

B: 突破性出血

C: 乳房胀痛

D: 肝功异常

答案: B

28. 最常见不良反应为干咳，严重不良反应为血管神经性水肿的是

A: 氨氯地平

B: 地高辛

C: 卡托普利

D: 哌唑嗪

答案: C

29. 关于万古霉素，描述错误的是

A: 属于杀菌剂

B: 可用于对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染

C: 肾功能不全者无需调整剂量

D: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

答案: C

30. 可引起前庭功能失调（眩晕）的抗菌药物是

A: 哌拉西林

B: 米诺环素

C: 左氧氟沙星

D: 甲硝唑

答案: B

31. 对肾功能影响较小的抗高血压药是

A: 肼屈嗪

B: 卡托普利

C: 利血平

D: 胍乙啶

答案: A

32. 患者，男，5 岁，体重 25kg，有癫痫病史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗。查体和实验室检查：白细胞计数 $15.8 \times 10^9 / L$ ，体温 $39.5^\circ C$ ，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次 $20mg / kg$)

8×10⁹ / L，体温 39. 5℃，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次 20mg / kg)

A: 乙琥胺

B: 左乙拉西坦

C: 地西泮

D: 丙戊酸钠

答案: D

33. 依托泊苷注射液的溶媒选择要求是

A: 先用乳酸钠注射液溶解,再用氯化钠注射液或 5%葡萄糖注射液进一步稀释

B: 氯化钠注射液稀释

C: 先用氯化钠注射液溶解,再用 5%葡萄糖注射液进一步稀释

D: 5%葡萄糖注射液稀释

答案: B

34. 催产和引产不适用麦角新碱的原因是

- A: 抑制胎儿呼吸
- B: 维持时间短
- C: 孕妇血压升高
- D: 子宫强直性收缩

答案：D

35. 干扰核酸生物合成的抗恶性肿瘤药是

- A: 5-氟尿嘧啶
- B: 多柔比星
- C: 环磷酰胺
- D: 吉非替尼

答案：A

36. 组胺 H

- A: 雷尼替丁 > 法莫替丁 > 西咪替丁
- B: 雷尼替丁 > 西咪替丁 > 法莫替丁
- C: 法莫替丁 > 雷尼替丁 > 西咪替丁
- D: 西咪替丁 > 雷尼替丁 > 法莫替丁

答案：C

37. 抢救糖尿病合并酮症酸中毒患者

- A: 静脉用胰岛素
- B: 胰岛素皮下注射
- C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：A

38. 有明显的镇痛作用，可用于肿瘤骨转移所致的高钙血症和痛性骨质疏松症治疗的药物是

- A: 降钙素
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 雷洛昔芬
- D: 骨化三醇

答案：A

39. 可以与雌激素受体结合，但不具有雌激素对生殖系统的影响，能增加雌激素的活性对骨代谢产生激动效应，产生抗骨质疏松作用的药物是

- A: 降钙素
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 雷洛昔芬
- D: 骨化三醇

答案：C

40. 可以改善心肌缺血的是

- A: 维生素
- B: 果糖
- C: 葡萄糖
- D: 脂肪乳

答案：B

41. 替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

- A: 脑瘤
- B: 恶性淋巴瘤
- C: 慢性淋巴细胞白血病

D: 纤维瘤

答案：A

42. 洋地黄毒苷的半衰期是

A: 7 天以上

B: 48h

C: 72h

D: 5 天

答案：A

43. (2019 年真题) 某患儿因高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。

关于奥司他韦预防用药的说法，正确的是 ()

A: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日两次，每次 75mg

B: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg

C: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg

D: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg

答案：B

44. 小剂量就有抗焦虑作用的药物是

A: 苯妥英钠

B: 吗啡

C: 苯巴比妥

D: 地西泮

答案：D

45. 目前疗效最为肯定的一种保护肝细胞结构和功能的药物是

- A: 联苯双酯
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 复方甘草甜素
- D: 硫普罗宁

答案：B

46. 神经垂体功能不足引起的中枢性尿崩症具有良好抑制作用的药物是

- A: 促肾上腺皮质激素
- B: 催乳素
- C: 醋酸去氨加压素
- D: 促性腺激素

答案：C

47. 对服用双炔失碳酯后月经周期延长或闭经者，可加服

- A: 炔雌醇
- B: 维生素 B6
- C: 甲羟孕酮和炔雌醇
- D: 去氧孕烯

答案：C

48. 缺铁性贫血患者通常口服铁剂治疗，如有条件进行铁蛋白测定，停药应在血清铁蛋白上升到

- A: $20\sim30\mu\text{g/L}$
- B: $10\sim15\mu\text{g/L}$
- C: $30\sim50\mu\text{g/L}$
- D: $3\sim5\mu\text{g/L}$

答案：C

49. 关于氨基糖苷类和第三代头孢菌素类联合应用，错误的是

- A: 治疗急性感染通常疗程不宜超过 7~14 日
- B: 两类药不能混入同一容器内
- C: 可在身体同一部位给药
- D: 联合应用治疗败血症、肺炎等革兰阴性杆菌引起的严重感染

答案：C

50. 通过选择性抑制 5-HT 再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度，从而增强 5-HT 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 阿米替林
- B: 舍曲林
- C: 吗氯贝胺
- D: 度洛西汀

答案：B

51. 注射液含苯甲醇，新生儿和早产儿禁用的药物是

- A: 甘草酸二铵
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 甲氧氯普胺
- D: 雷尼替丁

答案：B

52. 长春碱使细胞有丝分裂停止于

- A: G
- B: G
- C: S 期
- D: M 期

答案：D

53. (2021 年真题) 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

- A: 替格瑞洛
- B: 氯吡格雷
- C: 利伐沙班
- D: 双嘧达莫

答案：C

54. 在动物骨髓造血组织中含量较多，有促进白细胞增生及抗放射线作用的是

- A: 小檗胺
- B: 丙酸诺龙
- C: 维生素 B₄
- D: 鲨肝醇

答案：D

55. 特比萘芬临床上作为()的首选药

- A: 曲霉病
- B: 着色芽生菌病
- C: 孢子丝菌病
- D: 皮肤癣菌病

答案：D

56. 关于地高辛的说法不正确的是

- A: 减慢心率

B: 激动 Na

C: 加强心肌收缩力

D: 减慢传导

答案：B

57. 司坦唑醇不具有的适应证为 ()

A: 遗传性血管神经性水肿

B: 骨质疏松症

C: 痤疮

D: 慢性消耗性疾病

答案：C

58. 患者，女，45 岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是

A: 双氯芬酸

B: 格列齐特

C: 硝苯地平

D: 雷尼替丁

答案：A

59. 抗酸作用较强、快而持久，可引起反跳性胃酸分泌增多

A: 三硅酸镁

B: 氢氧化铝

C: 碳酸钙

D: 氢氧化镁

答案：C

60. 以下关于非磺酰脲类促胰岛素分泌药使用的叙述，错误的是

- A: 瑞格列奈无肾脏功能不全者使用的禁忌，在体内无蓄积，适用于老年和糖尿病肾病患者
- B: 对磺酰脲类敏感性差或效果不佳者可换此类药物，也可与磺酰脲类联合应用
- C: 可以作为初始治疗，用于不能耐受二甲双胍或磺酰脲类药物或存在使用这些药物的禁忌证患者，尤其是有低血糖风险的慢性肾脏病患者
- D: 常见不良反应是低血糖和体重增加

答案：B

61. (2020 年真题) 长期使用可引起维生素 K 缺乏的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 头孢哌酮
- C: 华法林
- D: 二甲双胍

答案：B

62. 成人使用乙胺嘧啶用于疟疾的预防，服用的时间是

- A: 应于进入疫区前 1~2 周开始服用，一般宜服至离开疫区后 1~2 周
- B: 应于进入疫区前 6~8 天开始服用，一般宜服至离开疫区后 6~8 天
- C: 应于进入疫区前 1~2 周开始服用，一般宜服至离开疫区后 6~8 周
- D: 应于进入疫区前 1~2 天开始服用，一般宜服至离开疫区后 1~2 天

答案：C

63. 属于抗纤维蛋白溶解药的是

- A: 甲苯氢醌
- B: 氨甲环酸
- C: 艾曲泊帕乙醇胺
- D: 酚磺乙胺

答案：B

64. 有关纤维蛋白溶解药的叙述，错误的是

- A: 能使纤维蛋白溶酶原转变为纤维蛋白溶酶
- B: 主要代表药有链激酶、尿激酶
- C: 主要不良反应为凝血障碍
- D: 该药也称为血栓溶解药

答案：C

65. 吉非替尼、厄洛替尼、伊马替尼、舒尼替尼的主要代谢酶是

- A: CYP1A1
- B: CYP2C9
- C: CYP3A4
- D: CYP1A2

答案：C

66. (2017 年真题) 可杀灭疥虫的药物是 ()

- A: 甲苯达唑
- B: 维 A 酸
- C: 阿苯达唑
- D: 林旦

答案：D

67. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是 ()。

- A: 地衣芽孢杆菌胶囊
- B: 双歧三联活菌胶囊
- C: 双八面体蒙脱石散
- D: 洛哌丁胺片

答案：D

68. 通过产生一氧化氮(NO)松弛血管平滑肌，以扩张静脉为主的药物是

- A: 双嘧达莫
- B: 普萘洛尔
- C: 硝苯地平
- D: 硝酸甘油

答案：D

69. 具有成瘾性的中枢性镇咳药是()。

- A: 氯化铵
- B: 可待因
- C: 右美沙芬
- D: 苯丙哌林

答案：B

70. 患者男性，56岁。有糖尿病史15年，近日并发肺炎，呼吸35次/分，心率105次/分，血压160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

- A: 珠蛋白锌胰岛素
- B: 三碘甲状腺原氨酸
- C: 格列齐特
- D: 短效胰岛素

答案：D

71. 易在甲状腺功能减退患者体内蓄积的药物是()

- A: 洋地黄毒苷
- B: 哌替啶

C: 利多卡因

D: 阿托品

答案：A

72. 通过阻断血管紧张素 II 受体而治疗慢性心功能不全的药物是()

A: 氨力农

B: 氯沙坦

C: 地高辛

D: 美托洛尔

答案：B

73. 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内,宜使用的口服紧急避孕药物是 ()

A: 左炔诺孕酮 (1

B: 复方醋酸环丙孕酮 (35 μ g/2mg)

C: 炔雌醇去氧孕烯 (30g/150g)

D: 十一酸睾酮 (40mg)

答案：A

74. 对心肌梗死患者，若无禁忌，应尽快给予阿司匹林的初始剂量为每日

A: 25~50mg

B: 75~150mg

C: 150~300mg

D: 10~25mg

答案：C

75. 患者，女 52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片每日 1 次，每次 2mg。

- A: 血脂异常
- B: 血栓性静脉炎
- C: 骨质疏松症
- D: 泌尿系统感染四

答案：B

76. 与西地那非合同，可导致严重低血压的药品是()。

- A: 丙酸睾酮
- B: 非那雄胺
- C: 甲睾酮
- D: 硝酸甘油

答案：D

77. 很少单独缺乏，常伴其他维生素缺乏，大量服用可使尿液变黄，该物质是

- A: 维生素 B2
- B: 维生素 C
- C: 精氨酸
- D: 维生素 AD

答案：A

78. 利那洛肽为泻药的作用机制是

- A: 通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快

B: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便

C: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用

D: 选择性、高亲和力的 5-HT₄ 受体激动剂，可通过 5-HT₄ 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性

答案：A

79. 以下关于 PPI 用法用量的描述，错误的是

A: 泮托拉唑静脉给药用于急性上消化道出血时，一次 40mg~80mg，每日 1~2 次

B: 艾司奥美拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次

C: 泮托拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次

D: 奥美拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次

答案：D

80. (2015 年真题) 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是 ()。

A: 多柔比星

B: 多西他赛

C: 伊立替康

D: 氟尿嘧啶

答案：A

81. 下列关于奥沙利铂的描述，错误的是

A: 遇冷可加重奥沙利铂的神经毒性

B: 其神经系统毒性与剂量大小无关

C: 应给予预防性或治疗性的止吐用药

D: 与氯化钠和碱性溶液（特别是氟尿嘧啶）之间存在配伍禁忌

答案：B

82. 用于呼吸道合胞病毒引起的肺炎与支气管炎治疗的抗病毒药物是

A: 金刚烷胺

B: 碘苷

C: 利巴韦林

D: 阿昔洛韦

答案：C

83. （2017 年真题）降低同型半胱氨酸水平的是（）

A: 烟酸

B: 泛酸钙

C: 维生素 B2

D: 叶酸

答案：D

84. 老年人对苯二氮革类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟钝等症状，在临床上被称为

A: “宿醉”现象

B: 戒断综合征

C: 震颤麻痹综合征

D: 老年期痴呆

答案：A

85. 不属于氟喹诺酮类的药物是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 小檗碱

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/428021137123007022>