

2023年-2024年执业医师资格证之临床助理医师精选试题及答案一

单选题（共45题）

1、患者，24岁。人工流产术后1周，突然阴道流血增多，伴腹痛，无发热，查宫口有少量活动性出血，子宫稍大、稍软，压痛(±)，附件正常。

- A. 漏吸
- B. 吸宫不全
- C. 子宫内膜炎
- D. 子宫穿孔
- E. 羊水栓塞

【答案】 B

2、男性，36岁，间歇性水肿12年，1周来出现恶心、呕吐。血红蛋白80g/L，血压160/110mmHg，尿蛋白(+++)，颗粒管型2~3个/HP，尿比重1.011。

- A. 24小时尿蛋白定量
- B. 乙肝病毒全项
- C. 肝功能全项
- D. 血肌酐、尿素氮
- E. 血清钾浓度

【答案】 D

3、女，35岁。因下腹痛伴发热2天来急诊。查体：急性病容，体温38.9℃，下腹部有压痛反跳痛及肌紧张。妇科检查可见脓性阴道分泌物，宫颈有举痛，双侧附件区增厚，有压痛。最可能的诊断是

- A. 急性宫颈炎

- B. 急性盆腔炎
- C. 卵巢囊肿继发感染
- D. 卵巢囊肿破裂
- E. 卵巢囊肿蒂扭转

【答案】 B

4、男性，75岁。胃癌根治术后7天，剧烈咳嗽时，突然出现切口疼痛，并流出少量淡红色液体，患者最可能出现了

- A. 切口内癌细胞种植
- B. 切口感染
- C. 切口裂开
- D. 切口血肿
- E. 切口脂肪液化

【答案】 C

5、知识点：梅毒

- A. 皮肤粘膜损害
- B. 劳动力丧失
- C. 侵犯心血管
- D. 侵犯神经系统
- E. 死亡

【答案】 A

6、女，60岁。反复咳嗽、咳脓痰、咯血30年，再发伴发热3天。近3天来静脉滴注“头孢菌素”，仍有较多脓痰及痰中带血。查体：T37.5℃，左下肺可闻及湿啰音，杵状指。该患者最可能的诊断是

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管扩张
- C. 肺结核
- D. 肺脓肿
- E. 支气管肺癌

【答案】 B

7、目前认为对冠心病猝死有预防价值的药物为

- A. 利多卡因
- B. 阿司匹林
- C. 胺碘酮
- D. 美托洛尔
- E. 维拉帕米

【答案】 D

8、输卵管结扎术适应证中，下列哪项不正确

- A. 心脏病患者，心功能Ⅰ、Ⅱ级
- B. 行剖宫产时
- C. 神经官能症
- D. 只有一个孩子
- E. 中期引产行剖宫取胎时

【答案】 C

9、门静脉高压症的主要原因是

- A. 门静脉炎
- B. 肝静脉阻塞
- C. 肝硬化
- D. 门静脉干血栓
- E. 多囊肝

【答案】 C

10、下列乙类传染病应按甲类传染病处理的是

- A. 流行性出血热
- B. 流行性乙型脑炎
- C. 肺炭疽
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 布氏菌病

【答案】 C

11、女性，35岁，黄疸贫血伴关节酸痛3个月，体检巩膜黄染，脾肋下2cm，血红蛋白58g/L，白细胞 $5 \times 10^9 / L$ ，血小板 $105 \times 10^9 / L$ ，网织红细胞计数0.25，外周血涂片成熟红细胞形态正常，尿隐血试验阴性，无家族史。

- A. 脾切除
- B. 长春新碱
- C. 肾上腺糖皮质激素
- D. 环磷酰胺
- E. 大剂量丙种球蛋白

【答案】 C

12、知识点：厌恶疗法

- A. 家庭脱敏
- B. 冲击疗法
- C. 松弛疗法
- D. 厌恶疗法
- E. 自由联想

【答案】 D

13、某地农村产妇分娩一女婴。由于第三产程子宫收缩无力，产妇的胎盘迟迟未娩出。此时，无证个体医王某，在一不消毒，二不戴消毒手套的情况下，将手伸进子宫，误认为还有一胎儿未娩出而向外猛拉子宫，当场造成产妇大出血死亡。根据《执业医师法》的规定，应依法追究王某的法律责任。但其法律责任不包括

- A. 责令改正
- B. 予以取缔
- C. 没收违法所得及其药品、器械
- D. 赔偿责任
- E. 刑事责任

【答案】 A

14、感染性心内膜炎的抗生素治疗原则是（ ）。

- A. 在血培养结果回报之前避免使用抗生素
- B. 体温正常后需及时停药

- C. 连续使用足量敏感性抗生素
- D. 应尽量使用抗生素 4~8 周
- E. 需联合使用 2 种抗生素

【答案】 C

15、下列哪项属于非典型抗精神药物

- A. 氯氮平
- B. 氯丙嗪
- C. 卡马西平
- D. 氟西汀
- E. 阿扑吗啡

【答案】 A

16、高血压患者的健康教育，下列那些不妥

- A. 每人每日食盐量应不超过 6g
- B. 饮酒量每日不超过相当于 75g 乙醇的量
- C. 较好的运动方式是低或中等强度的等张运动
- D. 将体重指数(BMI)控制在 25
- E. 膳食中脂肪量控制在总量的 25%以下

【答案】 B

17、发热的类型，错误的是

- A. 急性肾炎见于间歇热
- B. 霍奇金病见于回归热

- C. 肺炎见于弛张热
- D. 伤寒呈稽留热
- E. 布氏杆菌病呈波状热

【答案】 C

18、 β

- A. 氨茶碱
- B. 酮替芬
- C. 溴化己胺醇
- D. 白三烯受体阻断剂
- E. 异丙托品

【答案】 B

19、可引起横纹肌溶解症的药物

- A. 辛伐他汀
- B. 氯贝丁酯
- C. 普罗布考
- D. 考来烯胺
- E. 烟酸

【答案】 A

20、门静脉高压症的主要原因是

- A. 门静脉炎
- B. 肝静脉阻塞

- C. 肝硬化
- D. 门静脉干血栓
- E. 多囊肝

【答案】 C

21、女性，30岁，慢粒病史1年，近1周高热脾大平脐，血红蛋白50g/L，白细胞 $20 \times 10^9 / L$ ，分类原粒占30%，中晚幼粒占40%，血小板 $50 \times 10^9 / L$ ，诊断慢粒白血病

- A. 急性变
- B. 合并感染
- C. 合并类白血病反应
- D. 合并骨髓纤维
- E. 慢性期

【答案】 A

22、女，39岁。痛经进行性加重5年，月经量增多2年。妇科检查：子宫后位，球形增大，如2个月妊娠大小，活动欠佳。子宫触痛阳性，双附件未触及异常，CA12587U/ml。最可能的诊断是

- A. 子宫肉瘤
- B. 子宫腺肌病
- C. 子宫内膜炎
- D. 子宫内膜异位症
- E. 子宫肌瘤

【答案】 B

23、男，36岁。呕血1小时，患肝硬化门静脉高压症多年。查体：巩膜黄染，中等量腹水，血清蛋白25g/L。首先应选择的治疗方法是

- A. 断流手术
- B. 选择性门体分流术
- C. 三腔二囊管压迫止血
- D. 非选择性门体分流术
- E. 经颈静脉肝内门体分流术

【答案】 C

24、为将每日代谢所产生的大约600mmol/L的溶质(废物)完全溶解排出，需要的尿量至少是

- A. 400mL
- B. 500mL
- C. 600mL
- D. 800mL
- E. 1000mL

【答案】 B

25、根据小儿动脉收缩压的推算公式，3岁小儿的收缩压是

- A. 58mmHg
- B. 64mmHg
- C. 77mmHg
- D. 86mmHg
- E. 95mmHg

【答案】 D

26、年轻女性，咽痛 3 天后出现肉水样尿，伴乏力，无水肿。

- A. 膀胱镜检查
- B. 尿找抗酸杆菌
- C. 尿红细胞位相
- D. 尿细胞培养
- E. 静脉肾盂造影

【答案】 C

27、初产妇，足月妊娠，宫口开全 1 小时 30 分尚未分娩。阴道检查：头先露，宫口开全，胎头位于坐骨棘水平下 3cm，枕左横位（LOT），胎膜已破，羊水清，胎心率 142 次 / 分，估计胎儿重 3200g，本例正确处理应是

- A. 行剖宫产术
- B. 缩宫素静脉滴注
- C. 行产钳助产术
- D. 徒手将胎头枕部转向前方，然后阴道分娩
- E. 等待阴道自然分娩

【答案】 D

28、鉴别非典型苯丙酮尿症，需进行

- A. Guthrie 细菌生长抑制试验
- B. 尿蝶呤分析
- C. 尿有机酸分析
- D. 尿三氯化铁试验
- E. 尿 2,4—二硝基苯肼试验

【答案】 B

29、7岁女性患儿，查体时发现胸骨左缘2~3肋间闻及3级喷射性收缩期杂音，同时可闻及不受呼吸影响的S

- A. 正常人
- B. 肺动脉瓣狭窄
- C. 房间隔缺损
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 肺动脉瓣关闭不全

【答案】 C

30、支气管哮喘发作时的呼吸功能检查，下列哪项结果是错误的

- A. FEV
- B. FEV
- C. MMER 上升
- D. MEF50%减少
- E. PEF 减少

【答案】 C

31、胃食管反流病的治疗措施不包括

- A. 应用促胃肠动力药
- B. 抗酸治疗
- C. 高脂肪饮食
- D. 减肥

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428037033142006134>