北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试试题》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：髌骨软骨软化症的病理改变是（　）。A. 最早发生于软骨深层

B. 最早发生于软骨表层

C. 最早发生于软骨边缘

D. 最早发生于滑膜

E. 最早发生于半月板

2、单项选择题：骨肉瘤可以有（　）。A. 血磷升高

B. 血总蛋白浓度升高

C. 血钙升高

D. 血碱性磷酸酶升高

E. 血酸性磷酸酶升高

3、单项选择题：有关成骨肉瘤特征下列哪项不准确（　）。A. 起源于原始间质细胞的成骨类，因而病变在 X 线片均显示以骨密度增高为主的破坏性改变

B. 多见于年轻人，早期转移，恶性程度极高

C. 多发于骨骺生长活跃的部位

D. E 答案都是正确的，只有 A 是错误的答案。

E. 确诊时，一半以上病人血液中已有瘤细胞

4、单项选择题：新生儿的正常髋臼角为（　）。A. 30～40

B. 23～28

C. 20～25

D. 小于 20

E. 大于 40

5、单项选择题：单纯滑膜结核的 X 线表现是（　）。A. 关节间隙狭窄，软组织肿胀

B. 关节间隙增宽，骨质破坏

C. 骨质疏松，软组织肿胀

D. 骨质密度增高

E. 骨膜反应性增生

6、单项选择题：石膏或夹板固定后，最应注意的是（　）。A. 松脱

B. 骨折再移位

C. 压迫性溃疡

D. 血循环受阻

E. 石膏变形

7、单项选择题：肌电图或诱发电位，主要是检查（　）。A. 肌肉损伤

B. 肌腱损伤

C. 骨关节损伤

D. 炎症

E. 周围神经损伤

8、单项选择题：一患者肱骨骨折术后 2 个月出现桡神经损伤症状，考虑为局部瘢痕形成压迫，欲行神经松解术，关于止血带的应用，正确的是（　）。A. 因神经受压后已存在血运不良，禁用止血带

B. 神经受压已有一段时间，对缺血有一定的耐受能力，止血带时间可较平时延长 20～30 分钟

C. 为获得清晰视野可使用止血带，但因神经受压后已存在血运不良，止血带的时间需减半

D. 正常应用止血带，首次不超过 1 小时，松 10 分钟，再用每次不超过 40 分钟

E. 以上均不正确

9、单项选择题：青年运动员，髌下痛，右膝无力 3 个月，屈伸膝痛，上下楼梯困难。查体：髌骨边缘压痛，髌骨研磨试验（+），股四头肌轻度萎缩。右膝平片未见异常，核素扫描见髌骨局限性放射性浓聚。临床诊断为（　）。A. 半月板损伤

B. 交叉韧带损伤

C. 副韧带损伤

D. 髌骨软骨软化症

E. 髌腱炎

10、单项选择题：病人下台阶时扭伤右足部，疼痛剧烈，尚能步行上班，第二天发现右踝肿胀，踝关节前外侧足背青紫。检查：外踝前下方压痛，被动内翻时疼痛。最可能的诊断是（　）。A. 踝关节外侧副韧带损伤

B. 外踝骨折

C. 第 5 跖骨基底部骨折

D. 腓骨肌腱脱位

E. 胫骨前唇骨折

11、单项选择题：10 岁男孩，摔伤 4 小时，体检：右肘呈半屈曲位畸形，肿胀严重，触痛明显。桡动脉搏动细弱。最佳处理方法为（　）。A. 血管造影

B. 肌电图检查

C. 手法复位，屈肘位石膏固定

D. 切开复位，探查神经血管

E. 以上都不是

12、单项选择题：骨骺分离，是属于（　）。A. 先天性发育不良

B. 骨折

C. 关节脱位

D. 骨肿瘤

E. 骨髓炎的一种类型

13、单项选择题：某青年由高处坠落时，右小腿胫骨中段骨折，局部明显肿胀，趾端麻木，剧痛，足背动脉搏动微弱。应最先采取哪种措施（　）。A. 应用止痛药

B. 骨折复位

C. 小夹板固定

D. 石膏固定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/428045115015006063