

耳鼻喉头颈外科试题库含参考答案

1、收缩时使声带松弛,同时兼有声带内收、关闭声门功能的是: ()

- A、环杓侧肌和杓肌
- B、甲杓肌
- C、环杓后肌
- D、环甲肌
- E、杓会厌肌

答案: B

2、人耳能感觉到的声波频率范围为 ()

- A、20~1000Hz
- B、20~2000Hz**
- C、20~20000Hz
- D、20~4000Hz
- E、20~8000Hz

答案: C

3、开放性喉外伤的处理原则最合适的是: ()

- A、气管切开术
- B、首先止血、抗休克和解除呼吸困难
- C、喉镜检查喉部情况
- D、清创缝合,修复损伤,抗感染和对症、支持治疗
- E、及早应用抗生素

答案: B

4、关于间接鼻咽镜检查的描述中,错误的是: ()

- A、鼻咽镜镜面向上,置于软腭与咽后壁之间
- B、受检者端坐,咽反射敏感者经口喷用1%丁卡因
- C、受检者张口用鼻呼吸
- D、受检者左手将舌牵出口外
- E、将鼻咽镜加温

答案: D

5、鼓室内侧壁有多个重要解剖结构,但不包括: ()

- A、鼓岬
- B、面神经管水平段
- C、锥隆起

- D、匙突
- E、前庭窗和圆窗

答案：c

6、局限于外耳道软骨段的病变是：（）

- A、外耳道霉菌病
- B、外耳道炎
- C、恶性外耳道炎
- D、外耳道疳
- E、上述都不是

答案：D

7、下列有关急性鼻窦炎的说法中，错误的是：（）

- A、常为多组感染
- B、头疼较重有时间规律
- C、及时做上颌窦穿刺最有意义
- D、治疗以全身用抗生素为主
- E、全身症状突出

答案：C

8、病史不明确时，诊断气管、支气管异物最可靠的方法是：（）

- A、胸部听诊
- B、支气管镜检查
- C、呼吸困难
- D、咳嗽、发热
- E、胸部正、侧位片

答案：B

9、声导抗检查中，提示咽鼓管功能障碍的鼓室压图曲线是：（）

- A、Ad 型
- B、C 型
- C、B 型
- D、A 型
- E、As 型

答案：B

10、下列关于扁桃体周围脓肿的描述，错误的是：（）

- A、咽痛较剧，常向同侧耳部放射

- B、患者都有张口困难
- C、多由细菌感染引起
- D、多见于青壮年
- E、前上型较常见

答案：B

11、检查扁桃体时，下列观察中错误的是：（）

- A、形态、大小
- B、双侧活动是否对称
- C、表面有无瘢痕
- D、隐窝口有无脓栓或干酪样物
- E、有无充血、水肿、溃疡

答案：B

12、42 岁的女性患者，间断性少量吐血，伴有右侧耳痛、耳聋，右侧眼球外展运动受限,可能是：（）

- A、鼻腔血管瘤
- B、鼻咽部恶性肿瘤
- C、上消化道出血
- D、鼻咽纤维血管瘤
- E、肺结核

答案：B

13、对喉角化症的描述中，错误的是：（）

- A、主要症状为声嘶及咽部不适
- B、诊断需取病理确诊
- C、不易发生恶变
- D、是一种以喉黏膜上皮增生异常角化过度为特征的病变
- E、检查见喉部呈白色点状隆起，质硬不易去除

答案：C

14、儿童单侧性鼻塞流脓涕且伴恶臭，首先应考虑：（）

- A、急性化脓性鼻窦炎
- B、鼻腔异物
- C、鼻腔恶性肿瘤
- D、萎缩性鼻炎
- E、牙源性上颌窦炎

答案：B

15、下列有关慢性扁桃体炎的描述，错误的是：（）

- A、多由急性扁桃体炎反复发作演变而来
- B、链球菌和葡萄球菌是本病的主要致病菌
- C、发病机制可能与自身变态反应有关
- D、常为全身感染的病灶之一
- E、均须手术摘除

答案：E

16、鼻腔毛细血管瘤最常见于：（）

- A、中鼻甲前端和鼻中隔后部
- B、上鼻甲前端和鼻中隔上部
- C、下鼻甲前端和鼻中隔前部
- D、下鼻甲后端和鼻中隔后部
- E、中鼻甲前端和鼻中隔上部

答案：C

17、周围性病变引起软腭瘫痪中最常见的病因是：（）

- A、肿瘤
- B、咽部炎症
- C、血栓形成
- D、出血
- E、多发性神经炎

答案：E

18、内耳免疫活性中心是：（）

- A、壶腹嵴
- B、基底膜
- C、椭圆囊
- D、盖膜
- E、内淋巴囊

答案：E

19、鼻窦炎中发病率最高的是：（）

- A、额窦炎
- B、蝶窦炎
- C、筛窦炎
- D、全组鼻窦炎

E、上颌窦炎

答案：E

20、喉癌颈淋巴结转移最常见的部位是：（）

A、颈动脉三角区淋巴结

B、舌骨下淋巴结

C、气管前淋巴结

D、颌下淋巴结

E、颈深上淋巴结

答案：A

21、声带松弛肌为：（）

A、杓肌

B、甲杓肌

C、环甲肌

D、环杓后肌

E、环杓侧肌

答案：B

22、患者扁桃体剥离术后3日，咽痛加剧，体温38.5℃，检查见扁桃体窝白膜生长不均，腭弓肿胀。应首先考虑：（）

A、创面感染

B、正常术后反应

C、败血症

D、咽旁脓肿

E、以上均不是

答案：A

23、扁桃体切除术后4h可进：（）

A、冷流质饮食

B、半流质饮食

C、冷半流质饮食

D、普通饮食

E、温流质饮食

答案：A

24、脑脊液鼻漏伴单侧视力障碍，提示瘘孔位于：（）

A、颅中窝

B、额窦后壁

- C、筛板
- D、鞍结节、蝶窦或后组筛窦
- E、鼻窦

答案：D

25、鼻部丹毒最常见的致病菌是：（）

- A、乙型溶血性链球菌
- B、大肠埃希菌
- C、绿脓杆菌
- D、肺炎双球菌
- E、甲型溶血性链球菌

答案：C

26、近年来研究认为恶性肉芽肿与下列病毒有关的是：（）

- A、EB 病毒
- B、腺病毒
- C、冠状病毒
- D、鼻病毒
- E、副黏液病毒

答案：A

27、下列不是原发部位不明转移癌诊治要点的是：（）

- A、肿块位于上颈部者，原发灶可能来自鼻腔、鼻窦、咽喉、舌等部位
- B、上颈部肿块,特别是低分化癌转移，应考虑为原发性鼻咽部的隐匿癌，按鼻咽癌进行治疗
- C、对原发部位不明的颈部转移癌，采用边积极治疗，边查找原发病灶的原则
- D、颈部肿块，针吸活检证明是转移癌,即行局部肿块切除术
- E、多见于中老年男性，一般缺乏原发灶所产生的症状和体征

答案：D

28、扁桃体周脓肿穿刺抽脓时，刺入过深最易导致的并发症是：（）

- A、局部组织损伤
- B、咽旁隙感染
- C、刺入扁桃体内
- D、脓液抽出困难
- E、误伤咽旁隙内大血管

答案：E

29、喉阻塞分度的主要根据是：（）

- A、病变范围
- B、声嘶程度
- C、呼吸困难程度
- D、病程长短
- E、患者喉腔大小

答案：C

30、左侧喉返神经易受损伤是因为：（）

- A、离主动脉太近
- B、位置较深
- C、径路较长
- D、离甲状腺较近
- E、径路较短

答案：C

31、半规管接受的适宜刺激是：（）

- A、变速旋转刺激
- B、匀速旋转刺激
- C、变速直线运动刺激
- D、匀速直线运动刺激
- E、以上都不是

答案：A

32、上颌骨骨髓炎最常见于：（）

- A、中年人
- B、老年人
- C、孕妇
- D、青年人
- E、婴幼儿

答案：E

33、喉弹性圆锥又称：（）

- A、环甲膜
- B、方形膜
- C、甲状舌骨膜
- D、喉弹性膜

E、三角膜

答案：E

34、以下疾病中，不属于喉癌前病变的是：（）

A、声带息肉

B、成人型喉乳头状瘤

C、声带白斑

D、声带不典型增生

E、肥厚性喉炎

答案：A

35、声导抗检查中，提示咽鼓管功能障碍的鼓室压图曲线是：（）

A、Ad 型

B、As 型

C、B 型

D、C 型

E、A 型

答案：D

36、异物被吸入气管后，最先表现的症状是：（）

A、心力衰竭

B、肺听诊啰音、哮鸣音

C、呼吸困难

D、剧烈呛咳、憋气、面色青紫

E、听诊声门下拍击音

答案：D

37、下列关于硬食管镜检查，错误的是：（）

A、食管腐蚀伤后的即刻检查

B、可应用于切除食管内小的良性肿瘤

C、对食管静脉曲张施行填塞止血或注射硬化剂治疗

D、可明确食管异物的诊断,取出食管异物

E、严重颈椎疾病或张口困难者为禁忌证

答案：A

38、喉阻塞分度的主要根据是：（）

A、病变范围

B、呼吸困难程度

- C、病程长短
- D、患者喉腔大小
- E、声嘶程度

答案：B

39、有关急性喉炎的各项中，错误的是：（）

- A、多由肺炎双球菌、流感杆菌感染引起
- B、通常用间接喉镜检查，易于诊断
- C、局部症状有咳嗽、喉痛等，多伴发热、食欲不振等全身症状
- D、应注意局部及全身的安静休息，使用抗生素和类固醇类药物治疗
- E、早期出现声嘶，多较重，可以失音

答案：A

40、鼻咽癌检查最有价值的是：（）

- A、气管镜
- B、鼻咽镜
- C、头颅X线片
- D、食管镜
- E、肺部X线片

答案：B

41、鼻窦黏膜囊肿最常见于：（）

- A、上颌窦
- B、额窦
- C、无差别
- D、蝶窦
- E、筛窦

答案：A

42、新生儿鼻不通气，哺乳困难，鼻咽部有表面光滑的肿物，搏动（+）。最可能的诊断是：（）

- A、先天性脑膜脑膨出鼻内型
- B、嗅沟脑膜瘤
- C、鼻部神经胶质瘤
- D、鼻腔鳞状细胞癌
- E、鼻息肉

答案：A

43、颞骨骨折后出现眩晕、感音性聋、自发性眼震和面瘫，其最可能的骨折类型是：（）

- A、凹陷型骨折
- B、上述都不是
- C、纵行骨折
- D、横行骨折
- E、粉碎型骨折

答案：D

44、下列关于人工耳蜗植入适应证的论述，正确的是：（）

- A、所有重度感音神经性聋者均可植入
- B、病人心理及情绪稳定，能配合治疗和术后康复
- C、鼓岬电刺激试验阴性者不宜植入
- D、佩戴大功率助听器有音感者不是植入适应证
- E、患者和或家属对植入后效果有很高期望值

答案：B

45、检查右支气管时，应将受检者的头：（）

- A、略抬局
- B、摆平直
- C、略向右偏
- D、略向左偏
- E、以上都不是

答案：D

46、食管异物最易停留在：（）

- A、食管憩室
- B、食管第4狭窄
- C、食管入口
- D、食管第2狭窄
- E、食管第3狭窄

答案：C

47、鼻中隔穿孔最常见的部位在：（）

- A、鼻中隔顶部
- B、鼻中隔前上部
- C、鼻中隔后上部

D、鼻中隔后下部

E、鼻中隔前下部

答案：E

48、不会引起声音嘶哑的是：（）

A、左侧喉返神经损伤

B、喉上神经外支损伤

C、右侧喉返神经损伤

D、喉上神经内支损伤

E、迷走神经损伤

答案：D

49、关于耳后骨膜下脓肿，说法错误的是：（）

A、除中耳炎症状外有头痛、高热及不适症状

B、乳突炎症经乳突外层骨板溃破入耳后骨膜下形成耳后骨膜下脓肿

C、诊断性穿刺可抽出脓液

D、应与外耳道疖、第一腮裂瘻管鉴别

E、治疗应切开引流、抗感染

答案：E

50、言语频率通常是指：（）

A、500 2000Hz

B、2000~4000Hz

C、125~8000Hz

D、1000~3000Hz

E、20~20000Hz

答案：A

51、上、下呼吸道的分界是：（）

A、声门

B、会厌下缘

C、舌骨下缘

D、环状软骨下缘

E、甲状软骨下缘

答案：D

52、下列不是原发部位不明转移癌诊治要点的是：（）

A、上颈部肿块,特别是低分化癌转移,应考虑为原发性鼻咽部的隐匿癌,

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428047063055006033>