

2024 甘肃省《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库及答案【典优】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 乙型肝炎病毒核心抗体为

- A: 不能抑制 HBV 的增殖，出现在 HBsAg 转阴之后，证明人体对 HBsAg 有一定的免疫清除率的指标
- B: 乙型肝炎病毒感染早期血清中出现的一种特异性血清标记物
- C: 不能抑制 HBV 的增殖，可反映肝细胞受到 HBV 侵害后的一项指标
- D: 为一种保护性抗体，表明人体具有一定免疫力的指标

答案：C

2. （2018 年真题）患者，女，21 岁，近半年来食欲亢进，多汗体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次/分，化验结果：血清促甲状腺素（TSH） $<0.1\text{mU/L}$ ，FT3、FT4 明显升高，肝肾功能基本正常，白细胞计数正常，诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是（）

- A: 碘化钾治疗，定期复查
- B: 选用 ^{131}I 治疗
- C: 注意休息补充营养，使用甲巯咪唑治疗
- D: 甲状腺次全切除手术

答案：C

3. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

- A: 医师处方和法定处方
- B: 专用处方和普通处方
- C: 门诊处方和住院处方
- D: 中药处方和西药处方

答案：A

4. 高血压患者的降压目标部分有糖尿病、蛋白尿等高危患者的高血压（）

- A: <150 / 90mmHg
- B: <140 / 90mmHg
- C: <130 / 80mmHg
- D: <120 / 80mmHg

答案：C

5. 在手术麻醉时给予患者阿托品抑制腺体分泌、减少呛咳以致误吸的发生，但易引起腹胀、尿潴留，此种不良反应属于

- A: 撤药反应
- B: 特异质反应
- C: 副作用
- D: 继发反应

答案：C

6. 隔日一次的外文缩写

- A: q4h

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

B: qod

C: qn

D: tid

答案：B

7. 应嘱咐患者避免冷饮冷食，避免暴露于低温或接触冰冷物体以防药物不良反应加重的是

A: 奥沙利铂

B: 顺铂

C: 卡铂

D: 卡培他滨

答案：A

8. (2019 年真题) 患者，男，73 岁，胃溃疡病史 2 年，半年前出现静止性震颤，搓丸样，运动迟缓，面具脸，慌张步态，该患者应使用的药物是

A: 多奈哌齐

B: 司来吉兰

C: 多巴丝肼（苄丝肼左旋多巴）

D: 甲基多巴

答案：C

9. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，既往有高血压、高脂血症病史，长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周，伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛，服用布洛芬，疼痛未缓解，自行加用萘普生。胃镜检查显示：胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡，幽门螺杆菌（Hp）阳性。肾功能未见异常。

A: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）、枸橼酸铋钾

B: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）、克拉霉素

C: 阿莫西林、克拉霉素

D: 枸橼酸铋钾、左氧氟沙星

答案：A

10. 有良好的促动力作用，无心脏不良反应的是

A: 奥美拉唑

B: 莫沙必利

C: 碳酸氢钠

D: 西沙必利

答案：B

11. 急性细菌性扁桃体炎患者常表现为()

A: 红细胞增多

B: 血红蛋白减少

C: 中性粒细胞增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：C

12. 美金刚的主要不良反应是

A: 呼吸抑制

B: 心律不齐

C: 幻觉

D: 血脂升高

答案：C

13. 饮茶可减少其吸收的药物是

A: 阿莫西林

B: 去氨加压素

C: 硫酸亚铁

D: 阿仑膦酸钠

答案: C

14. 在《中国药典临床用药须知》以外的权威性文献中记载的应该做皮肤敏感试验的品种是

A: 降纤酶

B: 肉毒抗毒素

C: 鱼肝油酸钠

D: 右旋糖酐

答案: D

15. 痛风慢性期应长期使用的促尿酸排泄药是

A: 阿司匹林

B: 丙磺舒

C: 别嘌醇

D: 秋水仙碱

答案: B

16. 与两性霉素 B 合用在体外有拮抗作用

A: 强心苷

B: 酮康唑

C: 链霉素

D: 碳酸氢钠

答案: B

17. (2021 年真题) 哺乳期妇女使用，易诱发新生儿胆红素脑病的药物是 ()

A: 复方磺胺甲噁唑

- B: 依那普利
- C: 复方炔诺酮
- D: 胰岛素

答案：A

18. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别卡托普利在妊娠中晚期使用属于药物妊娠毒性分级

- A: A 级
- B: D 级
- C: B 级
- D: C 级

答案：B

19. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 肝素
- B: 氯吡格雷
- C: 利伐沙班
- D: 华法林

答案：B

20. 依药品采购-验收-入库-出库-调配-使用过程，从发现问题的环节开始追踪即

- A: 药品召回
- B: 对可疑药品进行封存
- C: 查找供货方
- D: 反向追踪

答案：D

21. 患者，女，27 岁，妊娠 4 个月，因肺结核给予异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇联合治疗。为避免胎儿神经毒性，患者应补充

- A: 维生素 K1
- B: 维生素 D
- C: 维生素 B6
- D: 维生素 C

答案：C

22. 可以与多种金属离子结合发生沉淀，影响药物吸收的是

- A: 食醋中的醋酸
- B: 茶叶中的鞣酸
- C: 食盐中的氯化钠
- D: 酒中的乙醇

答案：B

23. 以下有关项目中，可作为药品外观质量检查的主要内容是

- A: 药品性状
- B: 药品中包装
- C: 药品外包装
- D: 药品内包装

答案：A

24. 以下所列药物中，适宜用于儿童患者的是()。

- A: 万古霉素
- B: 氟喹诺酮类
- C: 青霉素

D: 氨基糖苷类

答案：C

25. 患者，男，72 岁，患有阿尔茨海默病，给予卡巴拉汀每日 3mg 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是（）

A: 每日清晨空腹口服

B: 每晚睡前口服

C: 每日早晚空腹口服

D: 每日早晚与食物同服

答案：D

26. 下述“药物治疗慢性阻塞性肺疾病的目的”中，不正确的是

A: 缓解呼吸道症状

B: 预防疾病进展

C: 减少病死率

D: 排痰化痰

答案：D

27. 以下中毒后药物拮抗的叙述中，属于物理性拮抗的是

A: 药用炭吸附

B: 二巯丙醇解救汞中毒

C: 弱碱中和强酸

D: 依地酸钙钠解救铅中毒

答案：A

28. (用药与尿液检查异常) 甲氨蝶呤可能引起

A: 尿蛋白

B: 尿胆红素

C: 尿液 pH 增高

D: 尿液隐血

答案：A

29. 成本-效果分析

A: 成本和治疗结果均用货币表示

B: 是成本-效果分析的一种特例

C: 药物利用指数(DUI)

D: 治疗结果采用临床指标表示，如治愈率

答案：D

30. 餐前 30min 服用的药物是

A: 伊托必利

B: 阿托伐他汀

C: 奥美拉唑

D: 复方氢氧化铝

答案：D

31. 服药时饮茶可降低疗效的是

A: 维生素 A

B: 硫酸亚铁

C: 西咪替丁

D: 格列本脲

答案：B

32. 对流行性结膜炎可选用

A: 杆菌肽眼膏

B: 硫酸锌滴眼液

C: 1%泼尼松龙滴眼液

D: 碘苷滴眼液

答案：D

33. (2018 年真题) 患者, 女, 38 岁, 已婚, 妊娠 2 个月, 近日自觉心慌、多汗, 查 FT3, FT4 偏高 TSH0.01mU/L, 临床诊断为甲状腺功能亢进症适宜的治疗方案为 ()

A: 维持妊娠, 行甲状腺切除手术

B: 终止妊娠, 选用丙硫氧嘧啶治疗

C: 维持妊娠, 选用丙硫氧嘧啶治疗

D: 维持妊娠, 选用甲巯咪唑治疗

答案：C

34. “-沙星” 的药名词干缩写是

A: eef-

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案：D

35. 以下所列药物中, 有腹泻的 2 岁以下儿童不宜使用的是

A: 双歧三联活菌制剂

B: 洛哌丁胺

C: 鞣酸蛋白

D: 盐酸小檗碱

答案：B

36. 评价肾功能的可靠指标是

- A: 血清肌酐
- B: 尿素氮
- C: 尿液肌酐
- D: 尿液酸碱度

答案：A

37. 接种乙肝疫苗可产生哪种抗体()。

- A: HBsAb
- B: HBsAg
- C: HBeAb
- D: HBeAg

答案：A

38. S-1 索拉唑在体内代谢的主要肝药酶是

- A: CYP2C19
- B: CYP2C9
- C: CYP1A2
- D: CYP2C8

答案：A

39. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L、甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考区间 0.56~1.70mmol / L)、总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考区间 <5.2mmol / L)、低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L(正常参考区间 2.1~3.1mmol / L)、高密度脂蛋白胆固醇 1.2mmol / L(正常参考区间 1.2~1.65mmol / L)、血肌酐 50μmol / L(正常参考区间 45~84 μmol / L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 非诺贝特
- B: 阿托伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 普罗布考

答案：B

40. 关于丁螺环酮治疗焦虑症的优点，下列说法不正确的是为

- A: 镇静作用轻
- B: 无呼吸抑制
- C: 较少引起运动障碍
- D: 起效快

答案：D

41. （2017 年真题）患者，男，59 岁，哮喘病史 8 年，近日因急性脑梗死就诊住院治疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是（）

- A: 华法林
- B: 阿司匹林
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 氯吡格雷

答案：D

42. 最可能引起血小板计数减少的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 阿司匹林
- C: 乳酸钠
- D: 氯丙嗪

答案：B

43. 包括索引、文摘和题录等，查阅非常方便

- A: 药学网络
- B: 二级文献
- C: 研究论文
- D: 三级文献源

答案：B

44. 除胰岛素分泌过多外，主要引起血糖低于正常参考区间低限的疾患是

- A: 激素分泌功能亢进
- B: 颅内压增高、颅脑外伤
- C: 激素分泌功能衰退
- D: 肝功能亢进

答案：C

45. #NAME?

- A: #NAME?
- B: #NAME?
- C: #NAME?
- D: #NAME?

答案：D

46. 蛇胆川贝液不宜联用的是

- A: 阿托品
- B: 可待因
- C: 苯巴比妥
- D: 氢氧化铝

答案：B

47. 对氟乙酰胺中毒进行解毒的药物是()。

- A: 毒扁豆碱
- B: 阿托品
- C: 卡马西平
- D: 乙酰胺

答案：D

48. 患者，女，27 岁，妊娠 20 周，出现发热，体温最高达 38.5 度。体格检查：肾区叩击痛。经相关实验室检查，诊断为急性肾盂肾炎，宜选用的药物是

- A: 头孢曲松
- B: 甲硝唑
- C: 阿奇霉素
- D: 阿米卡星

答案：A

49. MHT 具体治疗方案，已切除子宫的妇女宜选用

- A: 单纯雌激素补充治疗
- B: 雌孕激素连续联合用药
- C: 雌孕激素间隔用药
- D: 单纯孕激素补充治疗

答案：A

50. 用于治疗溃疡性结肠炎，应多饮水，保持高尿流量，以防结晶尿的发生，必要时服用碳酸氢钠碱化尿液的药物是

- A: 阿卡波糖

B: 西格列汀

C: 格列吡嗪

D: 二甲双胍

答案: C

51. 应提示患者，该附带的胶囊需放到吸入装置内刺破吸入，而不能直接吞服胶囊

A: 利福平滴眼剂

B: 噻托溴铵粉吸入剂

C: 复方甲硝唑栓

D: 胰岛素笔

答案: B

52. 患者，女，28 岁，妊娠 27 周，头晕 3 天。入院查体：血压 160 / 100mmHg。诊断为：妊娠高血压。

A: 缬沙坦

B: 拉贝洛尔

C: 卡托普利

D: 福辛普利

答案: B

53. 脑梗死的治疗药物，溶栓治疗

A: 甘露醇

B: 阿司匹林

C: 普通肝素

D: 阿替普酶

答案: D

54. 服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

- A: 餐后
- B: 餐前
- C: 餐后 1h
- D: 餐前 0.5~1h

答案：D

55. 患者，女，20 岁，1 天前淋雨后受凉，初始感咽痒、咽干，随后感咽部疼痛，吞咽时更为明显，伴刺激性咳嗽，无发热、畏寒、寒战。

查体：T36.5℃，P70 次/分，R18 次/分，BP135/80mmHg。鼻咽黏膜光滑，咽隐窝无异常分泌物；双侧扁桃体 I 度肿大，表面光滑，未见脓性分泌物；颈部未及肿大淋巴结。采用改良 Centor 评分：患者，20 岁，无发热，伴咳嗽，无扁桃体渗出或肿胀，无颈前淋巴结肿痛；改良 Centor 评分为 0 分。药师对该患者的建议，错误的是

- A: 可服用布洛芬混悬液止痛
- B: 建议口服阿莫西林胶囊 500mgbid，疗程 10d
- C: 告知患者不要强行发声
- D: 避免环境温度突然变化

答案：B

56. 可用红霉素的敏感性预测自身敏感性的药物是

- A: 头孢洛林
- B: 替考拉宁
- C: 阿莫西林
- D: 克拉霉素

答案：D

57. 患者，男，46 岁，因类风湿性关节炎长期使用免疫抑制剂，近日因出现发热、咳嗽、咳痰入院经病原学检查，诊断为侵袭性肺曲霉病，临床欲使用伏立康唑治疗。患者同时合并肝功能不全 Child-TurcottePugh(CTP) 评分为 13 分(CTPC 级)。根据 CTP 评分结果，药师的用建议是()

- A: 该患者轻度肝功能不全，伏立康唑维持剂量不变
- B: 该患者轻度肝功能不全，伏立康唑维持剂量减少 25%
- C: 该患者重度肝功能不全，不建议使用伏立康唑
- D: 该患者中度肝功能不全，伏立康唑维持剂量减少 50%

答案：C

58. 雷洛昔芬能有效地抑制破骨细胞活性，降低骨转换至妇女绝经前水平，其正确的用法与用量是

- A: 60mg，qd
- B: 60mg，q4h
- C: 60mg，tid
- D: 60mg，bid

答案：A

59. 患者，女，54 岁，诊断为类风湿关节炎 2 年。目前服用甲氨蝶呤(15mg，qw)和塞来昔布(200mg，qd)。患者因担心药物不良反应，用药不规律，时断时续。近几日出现腕关节肿胀和疼痛加重，晨僵明显，加用泼尼松 10mg，qd。

- A: 早期治疗，遵医嘱规律用药
- B: 定期就诊，评估病情，调整治疗方案
- C: 预防骨质疏松
- D: 多晒太阳，适量补充钙剂、维生

答案：B

60. 患者，女，31 岁，产后 3 个月，哺乳期。因“尿路感染”需给予抗生素治疗，首选的药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 头孢曲松
- D: 阿米卡星

答案：C

61. 患者，女，18 岁，近半年来食欲亢进，多汗，体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次 / 分。化验结果：血清促甲状腺激素（TSH） $<0.1\text{mU/L}$ ，FT3、FT4 明显升高，肝、肾功能基本正常，白细胞计数正常。诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是

- A: 碘化钾治疗，定期复查
- B: 选用放射性 ^{131}I 治疗
- C: 注意休息与补充营养，使用甲巯咪唑治疗
- D: 甲状腺全切除手术

答案：C

62. 控制被经济利益驱动的过度药物治疗体现

- A: 规范性
- B: 安全性
- C: 有效性
- D: 经济性

答案：D

63. 核苷酸类逆转录酶抑制剂

- A: 利托那韦
- B: 依非韦伦
- C: 利巴韦林
- D: 齐多夫定

答案：D

64. 是否通过超链接指明其资料来源，是衡量互联网信息的

- A: 合理性
- B: 归因性
- C: 权威性
- D: 新颖性

答案：B

65. 患者，女性，46 岁。半年来食欲减退、易疲劳，查体发现多处淋巴结肿大，尤以颈部淋巴结为甚。骨髓抽取及切片、放射线检查（X 线、淋巴摄影）后诊断为恶性淋巴瘤。

- A: 干扰蛋白质合成
- B: 嵌入 DNA 干扰核酸合成
- C: 干扰核酸生物合成
- D: 破坏 DNA 结构和功能

答案：D

66. 肺炎药物治疗时应注意

- A: 肺炎的抗菌药物疗程大多数为 5 天，极少数需要 7~10 天或更长疗程
- B: 一旦怀疑为细菌性肺炎应给予首剂抗菌药物，病情稳定后可从静脉途径改为口服治疗
- C: 观察抗菌药物疗效应在药物治疗后 12~24 小时对病情进行评价

D: 抗菌药一般不良反应较少，不需要注意与预防

答案：B

67. 由服用利尿药所引起的尿失禁属于

A: 急迫性尿失禁

B: 压力性尿失禁

C: 真性尿失禁

D: 急性、可逆性/暂时性尿失禁

答案：D

68. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A: 高钾血症

B: 心动过缓

C: 直立性低血压

D: 快速性房性心律失常伴传导阻滞

答案：D

69. 老年人服用可能出现认知功能受损、谵妄、跌倒的药物是

A: 哌替啶

B: 甲氧氯普胺

C: 苯二氮䓬类药

D: 双嘧达莫

答案：C

70. 患者，男，70 岁，右手抖动和行走缓慢 3 个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大病史 3 年，临床上对该患者不宜选用（）

- A: 苯海索
- B: 多巴丝肼
- C: 左旋多巴
- D: 司来吉兰

答案：A

71. 消化性溃疡抗 H. pylori 的四联疗法正确的是（）

- A: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑
- B: 奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋
- C: 兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋
- D: 雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑

答案：C

72. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用
- B: 瑞格列奈片应于餐前服用
- C: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等
- D: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药

答案：A

73. 使血液黏度增加、血容量增多，引起高血压的药物是

- A: 糖皮质激素
- B: 咖啡因

C: 重组人促红细胞生成素

D: 伪麻黄碱

答案：C

74. 患者，男，48 岁，患有青光眼 3 年。近日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗应告知该患者用药后需漱口的药物是

A: 孟鲁司特钠咀嚼片

B: 布地奈德混悬液

C: 沙丁胺醇气雾剂

D: 多索茶碱注射液

答案：B

75. 关于胃黏膜保护剂胃舒平的服药方式，正确的是

A: 餐后服用

B: 直接吞咽

C: 餐前服用，充分咀嚼后咽下

D: 宜多饮水，减轻刺激

答案：C

76. 在夏季，用前宜其置入冰水或冰箱中 10~20 分钟；给药后 1~2 小时内尽量不排尿

A: 膜剂

B: 阴道栓剂

C: 气雾剂

D: 泡腾片

答案：B

77. 血管扩张剂、 α 受体阻滞剂、抗抑郁药等可能会诱发或加重的反应是

- A: 对异丙肾上腺素的敏感性降低
- B: β 受体阻滞剂普萘洛尔等减慢心率的作用亦钝化
- C: 肝脏合成凝血因子能力下降，对肝素及华法林非常敏感
- D: 心血管系统与维持水电解质平衡的内环境稳定功能减弱，易发生体位性低血压

答案：D

78. 归属于药历“患者基本情况”内容的是

- A: 联合用药
- B: 临床诊断
- C: 医保和费用支付情况
- D: 主要实验室检查数据

答案：C

79. 抗抑郁药物的合理使用既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

- A: 丙米嗪
- B: 阿米替林
- C: 氟伏沙明
- D: 帕罗西汀

答案：C

80. 患者，男，70 岁，2 周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

- A: 利伐沙班

B: 氯吡格雷

C: 肝素

D: 阿司匹林

答案: D

81. 通常开封启用 4 周后, 不宜再继续使用的剂型是 ()

A: 直肠栓剂

B: 滴眼剂

C: 软膏剂

D: 含漱剂

答案: B

82. 肝功能不全患者宜选用的药物是

A: 肝毒性小、经肾代谢的药物

B: 经肝肠循环消除的药物

C: 肾毒性小、经肝代谢的药物

D: 经肝肾双途径消除的药物

答案: A

83. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者, 必须迅速做出准确判断, 及时果断地采取有效的救治措施, 以挽救生命、减轻损害程度。

A: 药用炭吸附中毒物质

B: 弱碱中和强酸

C: 二巯丙醇“驱汞”治疗

D: 毛果芸香碱拮抗颠茄碱类中毒

答案: A

84. 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 右美沙芬
- B: 溴己新
- C: 可待因
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：A

85. 以下毒物中，误服中毒、须用碳酸氢钠溶液洗胃的是

- A: 瘦肉精
- B: 苯二氮
- C: 有机磷杀虫药
- D: 苯丙胺

答案：C

86. 归属公共网络资源的是

- A: www.merck.com
- B: www.ashp.org
- C: [www.google](http://www.google.com)
- D: www.cmt.com.cn

答案：C

87. 心血管疾病患者感冒时退热建议选用的药物是

- A: 奥司他韦
- B: 金刚烷胺

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

C: 对乙酰氨基酚

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/428061136042007022>